

ISSN 1000-0933

CN 11-2031/Q

生态学报

Acta Ecologica Sinica



第33卷 第9期 Vol.33 No.9 2013

中国生态学学会

中国科学院生态环境研究中心

科学出版社

主办

出版



中国科学院科学出版基金资助出版

生态学报 (SHENTAI XUEBAO)

第33卷 第9期 2013年5月 (半月刊)

目 次

前沿理论与学科综述

- 可持续发展研究的学科动向 茶 娜, 邬建国, 于润冰 (2637)
代谢异速生长理论及其在微生物生态学领域的应用 贺纪正, 曹 鹏, 郑袁明 (2645)
植物内生菌促进宿主氮吸收与代谢研究进展 杨 波, 陈 晏, 李 霞, 等 (2656)
中国园林生态学发展综述 于艺婧, 马锦义, 袁韵珏 (2665)

个体与基础生态

- 基于最小限制水分范围评价不同耕作方式对土壤有机碳的影响 陈学文, 王 农, 时秀焕, 等 (2676)
草原土壤有机碳含量的控制因素 陶 贞, 次旦朗杰, 张胜华, 等 (2684)
外源钙离子与南方菟丝子寄生对喜旱莲子草茎形态结构的影响 车秀霞, 陈惠萍, 严巧娣, 等 (2695)
毛竹出笋后快速生长期茎秆色素含量与反射光谱的相关性 刘 琳, 王玉魁, 王星星, 等 (2703)
巴郎山异型柳叶片功能性状及性状间关系对海拔的响应 冯秋红, 程瑞梅, 史作民, 等 (2712)
外源磷或有机质对板蓝根吸收转运砷的影响 高宁大, 耿丽平, 赵全利, 等 (2719)
不同猎物饲喂对南方小花蝽捕食量和喜好性的影响 张昌容, 郅军锐, 莫利锋 (2728)
捕食风险对东方田鼠功能反应格局的作用 陶双伦, 杨锡福, 姚小燕, 等 (2734)
基于线粒体细胞色素 c 氧化酶亚基 I 基因序列的帘蛤科贝类分子系统发育研究
..... 程汉良, 彭永兴, 董志国, 等 (2744)

不同实验生态环境对海刺猬遮蔽行为的影响

常亚青, 李云霞, 罗世滨, 等 (2754)

种群、群落和生态系统

- 基于 RS 与 GIS 的赣江上游流域生态系统服务价值变化 陈美球, 赵宝萍, 罗志军, 等 (2761)
长江口及邻近海域富营养化指标响应变量参照状态的确定 郑丙辉, 朱延忠, 刘录三, 等 (2768)
长江口及邻近海域富营养化指标原因变量参照状态的确定 郑丙辉, 周 娟, 刘录三, 等 (2780)
鸭绿江口及邻近海域生物群落的胁迫响应 宋 伦, 王年斌, 杨国军, 等 (2790)
杭州西溪湿地大型底栖动物群落特征及与环境因子的关系 陆 强, 陈慧丽, 邵晓阳, 等 (2803)
生物土壤结皮对荒漠土壤线虫群落的影响 刘艳梅, 李新荣, 赵 昕, 等 (2816)
大棚模拟条件下角倍蚜春季迁飞数量动态及其与气象因子的关系 李 杨, 杨子祥, 陈晓鸣, 等 (2825)
宁南山区植被恢复对土壤团聚体水稳定及有机碳粒径分布的影响 程 曼, 朱秋莲, 刘 雷, 等 (2835)
1958—2008 年太白山太白红杉林碳循环模拟 李 亮, 何晓军, 胡理乐, 等 (2845)
不同干扰对黄土区典型草原物种多样性和生物量的影响 陈芙蓉, 程积民, 刘 伟, 等 (2856)
乌拉山自然保护区白桦种群的年龄结构和点格局分析 胡尔查, 王晓江, 张文军, 等 (2867)
西南干旱对哀牢山常绿阔叶林凋落物及叶面积指数的影响 杞金华, 章永江, 张一平, 等 (2877)
阿尔泰山小东沟林区乔木物种丰富度空间分布规律 井学辉, 曹 磊, 藏润国 (2886)

景观、区域和全球生态

太湖流域生态风险评价 许 妍,高俊峰,郭建科 (2896)

基于 GIS 的关中-天水经济区土地生态系统固碳释氧价值评价 周自翔,李 璞,冯雪铭 (2907)

资源与产业生态

淹水条件下控释氮肥对污染红壤中重金属有效性的影响 梁佩筠,许 超,吴启堂,等 (2919)

研究简报

高温强光对小麦叶绿体 Deg1 蛋白酶和 D1 蛋白的影响及水杨酸的调节作用 郑静静,赵会杰,胡巍巍,等 (2930)

不同 CO₂ 浓度变化下干旱对冬小麦叶面积指数的影响差异 李小涵,武建军,吕爱锋,等 (2936)

期刊基本参数:CN 11-2031/Q * 1981 * m * 16 * 308 * zh * P * ¥ 90.00 * 1510 * 32 * 2013-05



封面图说: 肥美的当雄草原——高寒草甸是在寒冷的环境条件下,发育在高原和高山的一种草地类型。其植被组成主要是多年生草本植物,冬季往往有冰雪覆盖,土壤主要为高山草甸土。当雄草原位于藏北高原,藏南与藏北的交界地带,海拔高度为 5200—4300m,受海洋性气候影响,呈现高原亚干旱气候,年平均降水量 293—430mm。主要有小嵩草草甸、藏北嵩草草甸和沼泽草甸等,覆盖度为 60%—90%,其中小嵩草草甸分布面积最大,连片分布于广阔的高原面上。高寒草甸草层低,草质良好,是畜牧业优良的夏季牧场。

彩图及图说提供: 陈建伟教授 北京林业大学 E-mail: cites.chenjw@163.com

DOI: 10.5846/stxb201201140085

陈芙蓉,程积民,刘伟,朱仁斌,杨晓梅,赵新宇,苏纪帅.不同干扰对黄土区典型草原物种多样性和生物量的影响.生态学报,2013,33(9):2856-2866.

Chen F R, Cheng J M, Liu W, Zhu R B, Yang X M, Zhao X Y, Su J S. Effects of different disturbances on diversity and biomass of communities in the typical steppe of loess region. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(9): 2856-2866.

不同干扰对黄土区典型草原物种多样性 和生物量的影响

陈芙蓉^{1,2},程积民^{1,*},刘伟³,朱仁斌⁴,杨晓梅¹,赵新宇^{1,2},苏纪帅⁴

(1. 中国科学院水利部水土保持研究所,杨凌 712100; 2. 中国科学院研究生院,北京 100049;

3. 国家林业局中南林业调查规划设计院,长沙 410014; 4. 西北农林科技大学,杨凌 712100)

摘要:对黄土区典型草原进行封育+施肥(EF)、封育+火烧(EB)、封育(E)和放牧(G)处理,实地调查分析群落盖度、高度、密度、地上现存量和物种多样性,以研究不同干扰对黄土区典型草原群落物种多样性和生物量的影响。结果表明:在4种干扰类型中,施肥+封育草地群落盖度和地上生物量最高,且优势度指数最高,这与禾本科草占优势地位有关,群落均匀度指数和多样性指数最低,符合“生态位理论”;放牧地群落高度、盖度、密度和地上现存量最低,群落丰富度指数和多样性指数最高,支持“中度干扰理论”;封育地密度和均匀度指数最高;具体表现为:4种干扰类型地上生物量的变化趋势为封育+施肥>封育+火烧>封育>放牧;说明长时间的封育对草地是一种严重干扰。群落丰富度指数(R 和 Ma)的排列顺序为放牧>封育+施肥>封育+火烧>封育,群落物种多样性指数(H' 和 D)的排列顺序为放牧>封育>封育+火烧>封育+施肥,优势度指数与多样性指数相反,群落均匀度指数(J_{sw} 和 Ea)的排列顺序为封育>放牧>封育+火烧>封育+施肥。不同干扰样地群落生产力与Shannon-Wiener和Simpson多样性指数间呈负相关关系,这个结论可以用地上/地下竞争的相互作用来解释。

关键词:黄土区;典型草原;干扰类型;群落多样性;生物量

Effects of different disturbances on diversity and biomass of communities in the typical steppe of loess region

CHEN Furong^{1,2}, CHENG Jimin^{1,*}, LIU Wei³, ZHU Renbin⁴, YANG Xiaomei¹, ZHAO Xinyu^{1,2}, SU Jishuai⁴

1 Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Yangling 712100, China

2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

3 Central South Forest Inventory and Planning Institute of State Forestry Administration, Changsha 410014, China

4 Northwest Agricultural & Forestry University, Yangling 712100, China

Abstract: Typical steppe is a type of grassland which forms in inland temperate semi-arid climatic conditions, where xerophytic perennial bush grasses, especially *Stipa* spp., dominate. Grassland ecosystems are one of the largest terrestrial ecosystems affected by human activities. It is important to study the impact of different types of disturbance on the biodiversity and biomass of grasslands ecosystems during restoration and reconstruction work. Exclosures, grazing, fertilization and burning are four major types of anthropogenic disturbance occurring in grassland ecosystems, and have very important impacts on them. To provide a scientific basis for the protection of grassland biodiversity and the sustainable use of grasslands, the influences of different disturbances on the characteristics of above-ground vegetation were studied in a typical steppe in the loess region of China based on the field investigation and monitoring. We established plots representing

基金项目:国家自然科学基金重点项目(41230852);中国科学院战略性先导科技专项项目(XDA05050202);农业部“现代农业产业技术体系建设专项资金”资助(CARS-35-40)

收稿日期:2012-01-14; 修订日期:2012-08-20

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: gyzcjm@ms.iswc.ac.cn

four different types of treatments: enclosure (E), enclosure plus fertilization (EF), enclosure plus burning (EB) and grazing (G). All plots had the same soil type, topography and hydrological conditions. During the entire experiment, we determined total coverage, vegetation height, individual density, aboveground biomass and diversity of the plant community in each plot. Our results show the dominant vegetation community type of G plots is *Agropyron cristatum*+*Potentilla acaulis*+*Artemisia sacrorum*, a community which is the result of long-term grazing. The dominant vegetation community type of the E plots is *Stipa grandis*+*Poa sphondyloides*+*Medicago ruthenica*, a result of fencing. The dominant vegetation community type of the EF plots is *Carex duriuscula*+*Stipa bungeana*+*Stipa grandis*. The dominant vegetation community type of the EB plots is *Artemisia sacrorum*+*Stipa bungeana*+*Stipa grandis*. The different disturbance regimes strongly influenced community diversity and biomass. To be more specific, total coverage, above-ground biomass and the dominance indices were all at the highest level in the EF treatments in four types of treatments. This may attributed to grass species which play a dominant role in this community. Also, with low evenness and diversity indices, this result was consistent with niche theory which states differences among species in their environmental tolerances, niche requirements, and competitive abilities determine coexistence. Total coverage, height and aboveground biomass were all lowest for the G treatment, while community richness and diversity indices were higher for G than other three treatments. This result supports the intermediate disturbance hypothesis which states that biodiversity will be greatest in communities subjected to moderate levels of disturbance. Only the individual density and evenness index was higher with the E treatment than with the other treatments. Thus we can document the trend for biomass as EF > EB > E > G. These demonstrate long-term enclosure is a severe type of disturbance in grassland ecosystems. Also, the community richness indices (*R* and *Ma*) showed a certain tendency within these four treatments: G > EF > EB > E and community evenness indices (*J_{sw}* and *E_a*) could be sequenced in the order of E > G > EB > EF. Meanwhile, the order of diversity indices (*H'* and *D*) was as follows: G > E > EB > EF, while the dominance index was opposite the order of diversity index. Finally, there was negative correlation between community productivity and Shannon-Wiener and Simpson indices, which can be explained by interactions between root and shoot competition.

Key Words: loess region; typical steppe; disturbance; species diversity; biomass

典型草原是在温带内陆半干旱气候条件下形成的草原类型,以旱生的多年生丛生禾草占优势的草原植被,并以针茅属的物种为其主要的物种成分^[1]。云雾山自然保护区是我国黄土高原半干旱地区干草原生态系统的典型地段,同时也是以本氏针茅(*Stipa bungeana*)为建群种的干草原生态系统保留较完整、面积最大、原生性最强的典型地区,代表着黄土高原半干旱草原的自然特征^[2]。草地是受人类活动影响最大的陆地生态系统之一,研究不同干扰对其生物多样性和生物量的影响是草地生态系统恢复与重建工作中的重要内容^[3]。近些年来针对黄土区半干旱典型草地退化的问题,云雾山自然保护区主要采取围栏封育措施来恢复重建,因此已有很多关于封育对草地植被恢复方面的研究,提出封育可以显著影响草地群落特征,提高退化草地的生产力^[4-5]。此外,放牧、施肥和火烧是人类在草地生态系统管理实践中施加于草地的主要干扰类型,对生态系统过程会产生重要的影响。如施肥使高寒草甸植物群落物种组成贫乏,群落结构趋于简单,物种多样性降低^[6-8]。放牧通过改变植被结构和土壤理化性质,增加了生境的异质性,从而造成草地群落植物组分、结构和多样性格局发生变化,进而对整个生态系统的结构和功能产生影响^[6, 9]。国外对草原火烧的研究比较广泛,不仅关注草原火对不同植物种类的生长发育和群落生产力的影响,而且还把火烧作为一种草原管理工具进行研究,探讨火烧对抑制和消除草原灌木、提高草场的利用价值等方面的作用^[10-11]。本文主要通过野外调查研究施肥、封育、火烧和放牧4种不同的干扰类型对黄土区典型草原植被群落物种组成、多样性和地上生物量变化的影响,以期为草原生物多样性的保护和草原的可持续利用管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于宁夏云雾山国家级草原自然保护区,它是我国黄土高原半干旱区最完整、面积最大的典型草

原生态系统,代表了黄土高原半干旱区的自然特征。地理位置 $106^{\circ}24'—106^{\circ}28' E, 36^{\circ}13'—36^{\circ}19' N$, 面积 6700 hm^2 , 海拔 $1800—2100 \text{ m}$, 年平均气温 5°C , 最热月为7月, 气温在 $22—25^{\circ}\text{C}$, 最冷月为1月, 平均最低气温 -14°C , $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 积温 $2370—2882^{\circ}\text{C}$, 年日照 2500 h , 无霜期 $112—140 \text{ d}$ 。年降水量 $400—450 \text{ mm}$, 降水季节分配不均, 全年 $65\%—75\%$ 的降水集中在7—9月, 年蒸发量 $1330—1640 \text{ mm}$ 。地势南低北高, 阳坡平缓, 阴坡较陡, 属长梁缓坡丘陵区, 土层深厚, 土壤类型为淡黑垆土和山地灰褐土两类。该区自1982年开始封育, 植被主要是温带典型草原, 主要草本植物有本氏针茅、百里香(*Thymus mongolicus*)、铁杆蒿(*Artemisia sacrorum*)、大针茅(*S. grandis*)、白颖苔草(*Carex rigesaens*)、星毛委陵菜(*Comarum acaulis*)、赖草(*Leymus secalinus*)等, 群落自然恢复演替序列为冰草—百里香+杂类草—本氏针茅+百里香—本氏针茅+铁杆蒿—本氏针茅+大针茅^[12], 目前丛生禾本科植物本氏针茅在该区分布范围最广^[2]。

1.2 实验设计

在云雾山草原自然保护区内天然草地上设置不同干扰类型的样地。2011年5月共设置4个地形一致、水热条件相同的阳坡样地:施肥样地、火烧样地、放牧样地和封育样地,由于施肥样地和火烧样地都设置在封育区内,所以按不同干扰方式设置4个处理,分别为封育+施肥、封育+火烧、封育和放牧,样地具体情况如表1。

表1 调查样地的基本信息

Table 1 Basic information of sampled plots

干扰类型 Disturbances types	土壤类型 Soil types	地理位置 Location	海拔/m Altitude	利用与管理方式 Utilization and management method
封育(E) Exclosure	淡黑垆土、山地灰 褐土	E $106^{\circ}23'6''$ N $36^{\circ}15'7''$	2 085—2 103	封禁年限为20a,采用铁丝网围栏,完全排除牲畜的踩食和人为刈割
封育+施肥(EF) Exclosure plus Fertilization	淡黑垆土、山地灰 褐土	E $106^{\circ}23'9''$ N $36^{\circ}15'13''$	2 050—2 059	连续20a封禁,于2010年7月和2011年5月施肥,施氮磷钾复合肥(N-P-K)(其中总氮(N)含量20.2%,有效磷(P_2O_5)含量9.5%,钾(K_2O)含量10.5%),施肥量为600 kg/ hm^2
封育+火烧(EB) Exclosure plus Burning	淡黑垆土、山地灰 褐土	E $106^{\circ}23'6''$ N $36^{\circ}15'6''$	2 099—2 112	连续20a封禁,在2011年4月初人为原因致草地火烧,火烧比例<30%,属于轻度火烧
放牧(G) Grazing	淡黑垆土、山地灰 褐土	E $106^{\circ}22'13''$ N $36^{\circ}15'13''$	2 032—2 059	连续多年放牧利用,放牧试验于2010年5月初开始,10月末结束,采取轮牧方式,放牧期3个月,每隔1个月进行1次放牧,每次10 d,每天从6:00将家畜赶入放牧区让其自由采食,到6:00赶回畜圈休息。根据草地产草量4 500 kg· $\text{hm}^{-2} \cdot \text{a}^{-1}$,每只羊每天需要3 kg草,设置载畜率水平2.07 羊单位/ $\text{hm}^2 \cdot \text{半年}$,属中度放牧,放牧绵羊数为4只

1.3 研究方法

调查方法:调查时间为2011年9月份,考虑到地形因素的影响,在每个样地选取坡底、坡中和坡上3个坡位,在每个坡位随机选取5个样方($50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$),调查每个样方中出现的物种并测量高度、盖度、多度等,记录优势种。

环境因子测定:用GPS测定每个样地的高程和地理坐标,用温湿表测定气温和空气湿度。

植物样调查:采用针刺法测定样方总盖度和每种植物的分盖度;每种植物随机选5株,直尺测量其伸长高度;对样方中出现的植物进行分类,记录同一种植物出现的个数,并将其地上部分分种齐地面刈割,除去黏附的土壤、砾石、杂物后装袋,然后收集样方中所有凋落物,带回实验室然在(65 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 条件下烘干至恒重,称其干重,地上生物量和凋落物量均采用干重计算。

1.4 计算方法

(1)群落内各物种重要值的计算^[13]

重要值(IV) = (相对高度+相对多度+相对盖度+相对频度+相对生物量)/5

(2) 地上现存量

$$\text{地上现存量} = \text{地上生物量} + \text{凋落物量}。$$

(3) 物种多样性分析

1) 丰富度指数

Patrick 指数(R)

$$R = S$$

Margalef 指数(Ma)

$$Ma = (S - 1) / \ln N$$

2) 多样性指数

Simpson 指数(D)

$$D = 1 - \sum pi^2$$

Shannon-wiener 指数(H')

$$H' = - \sum PilnPi$$

3) 均匀度指数

Pielou 指数(J_{sw})

$$J_{sw} = H' / \ln S$$

Alatalo 指数(Ea)

$$Ea = [(\sum pi^2)^{-1} - 1] / [\exp(H') - 1]$$

4) 优势度指数

$$\text{Berger-Parker}(I) = N_{\max} / N$$

式中, S 为样地中的物种数, Pi 为样地中第 i 种的生物量占全部生物量的比例, N_{\max} 为群落中最大种的生物量, N 为群落的总生物量^[8]。

1.5 数据分析

采用 Excel 软件对数据进行预处理, 采用 SAS V8 统计软件对数据进行统计分析。由 Shapiro-Wilk 检验发现数据符合正态分布, 采用 ANOVA 分析方法检验各处理在 $P=0.05$ 显著水平上的差异。如差异显著, 采用 Duncan 法在 $P=0.05$ 显著水平上进行多重比较。采用 Pearson 法分析多样性和生产力的相关性。

2 结果

2.1 不同干扰对群落物种组成和结构的影响

不同干扰样地的优势种不同, 反映出不同的群落外貌特征。如表 2 所示, 4 种不同干扰样地共出现 45 种植物, 分属 23 个科, 优势种主要出现在禾本科、莎草科、豆科和菊科。其中, 施肥地有 30 种, 重要值最高的是草甸草原的指示植物莎草科白颖苔草, 其次是本氏针茅和大针茅; 火烧地出现植物 28 种, 重要值最高的是铁杆蒿, 因其抗旱能力和根蘖性强, 火烧后成为群落的优势种, 其次为本氏针茅和大针茅; 封育地有植物 26 种, 大针茅、硬质早熟禾和花苜蓿占优势地位; 放牧地出现的植物种类最多, 有 33 种, 优势种为耐干旱的扁穗冰草和耐践踏的星毛委陵菜。

植物群落结构可以通过其高度、总盖度和密度加以反映^[14]。不同干扰的 4 个样地的群落盖度为封育+施肥>封育+火烧>封育>放牧地, 分别为 89%, 76%, 72% 和 53%, 其中封育+施肥样地的群落盖度显著高于其他 3 种干扰样地 ($P<0.05$), 放牧地的群落盖度显著低于其他 3 种干扰样地 ($P<0.05$) (图 1)。封育+施肥、封育+火烧、封育和放牧样地的群落高度分别为 23.57, 22.60, 22.41 和 15.58 cm, 其中放牧地的群落高度显著低于其他 3 种干扰样地 ($P<0.05$), 封育+施肥、封育+火烧和封育 3 种干扰样地之间没有明显差异 (图 1)。不同干扰样地的群落密度为封育 (1 111.7 株/ m^2)>封育+施肥 (1 019.7 株/ m^2)>封育+火烧 (889.1 株/ m^2)>放牧 (693.9 株/ m^2), 其中, 封育与封育+施肥样地显著大于放牧地 ($P<0.05$) (图 1)。4 种干扰类型中, 封育地的密度最大, 主要是群落中豆科花苜蓿和杂类草阿尔泰狗娃花的贡献所致。

2.2 不同干扰对群地上现存量的影响

如图 2, 不同干扰的样地地上生物量为封育+施肥>封育+火烧>封育>放牧地, 分别为 367.78, 312.31, 255.46 和 172.82 g/ m^2 , 其中封育+施肥草地的地上生物量最高, 显著高于其他 3 种干扰方式 ($P<0.05$), 放牧

地地上生物量最低,显著低于其他3种干扰方式($P<0.05$),且不同干扰方式之间均有显著差异($P<0.05$),可见施肥显著提高了群落的初级生产力。从枯落物量来看,封育+施肥和封育样地显著高于放牧样地($P<0.05$),由于火烧使样地枯落物为0,所以显著低于其他3种干扰方式($P<0.05$)。从地上现存量(地上生物量+枯落物量)来看,封育+施肥样地的地上现存量最高,为 545.71 g/m^2 ,显著高于其他3种干扰方式($P<0.05$);封育+火烧与封育样地没有明显差异;放牧地的地上现存量最低,为 212.29 g/m^2 ,显著低于其他3种干扰方式($P<0.05$),可见放牧限制群落生产力的发挥。

表2 不同干扰下典型草原群落物种组成和重要值

Table 2 Species composition and important values of the community under different disturbances in typical steppe

功能群 Functional groups	植物种名 Plant species	EF	EB	E	G
禾本科类(GG) Grass species group	本氏针茅 <i>Stipa bungeana</i>	0.135	0.112	0.097	0.080
	大针茅 <i>Stipa grandis</i>	0.124	0.111	0.136	0.038
	硬质早熟禾 <i>Poa sphondyloides</i>	0.062	0.081	0.118	—
	扁穗冰草 <i>Agropyron cristatum</i>	—	—	—	0.113
	赖草 <i>Leymus secalinus</i>	0.040	0.068	0.074	0.097
	茅香 <i>Anthoxanthum nitens</i>	0.044		0.003	0.008
莎草科类(SG) Sedge species group	白颖苔草 <i>Carex rigesaens</i>	0.144	0.106	0.103	0.057
豆科类(LG) Leguminous species group	花苜蓿 <i>Medicago ruthenica</i>	0.079	0.029	0.116	0.053
杂类草(FG) Forbs species group	糙叶黄耆 <i>Astragalus scaberrimus</i>	0.018	0.011	0.009	0.008
	黄毛棘豆 <i>Oxytropis ochrantha</i>	—	—	0.004	0.006
杂类草(FG) Forbs species group	甘菊 <i>Dendranthema lavandulifolium</i>	0.056	0.085	0.028	0.039
	铁杆蒿 <i>Artemisia sacrorum</i>	0.071	0.161	0.054	0.099
	茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i>	0.003	0.020	0.002	0.035
	阿尔泰狗娃花 <i>Heteropappus altaicus</i>	0.008	0.036	0.082	0.028
	香青 <i>Anaphalis sinica</i>	0.013	0.005	—	0.006
	火绒草 <i>Leontopodium leontopodioides</i>	0.010	0.041	0.015	0.011
	中华小苦荬 <i>Ixeridium chinense</i>	0.002	—	0.001	0.029
	风毛菊 <i>Saussurea japonica</i>	—	0.023	—	—
	蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i>	0.006	—	0.003	—
	小红菊 <i>Dendranthema chonetii</i>	—	0.003	—	—
	星毛委陵菜 <i>Potentilla acaulis</i>	0.006	0.002	0.022	0.106
	二裂委陵菜 <i>Potentilla bifurca</i>	0.031	0.024	0.047	0.021
	掌叶多裂委陵菜 <i>Potentilla multifida</i>	—	—	—	0.020
	翻白草 <i>Potentilla discolor</i>	—	0.002	—	0.003
	香薷 <i>Elsholtzia ciliata</i>	0.004	0.016	0.016	0.025
	百里香 <i>Thymus mongolicus</i>	0.025	0.003	0.028	0.028
	紫花地丁 <i>Viola philippica</i>	0.024	0.017	—	0.014
	裂叶堇菜 <i>Viola dissecta</i>	0.013	0.010	0.010	0.024
	蓬子菜 <i>Galium verum</i>	0.045	0.006	—	0.004
	猪殃殃 <i>Galium aparine</i>	—	—	0.006	—
	北柴胡 <i>Bupleurum chinense</i>	0.010	0.009	0.004	0.002
	泡沙参 <i>Adenophora potaninii</i>	0.010	0.005	—	—
	狼毒 <i>Stellera chamaejasme</i>	0.007	—	—	0.005
	斑种草 <i>Bothriospermum chinense</i>	0.003	—	0.002	—
	远志 <i>Polygala tenuifolia</i>	0.004	—	—	—
	石竹 <i>Dianthus chinensis</i>	0.002	—	—	—
	蝴蝶芥 <i>Torularia humilis</i>	—	—	0.008	—
	瓣蕊唐松草 <i>Thalictrum petaloideum</i>	0.001	0.002	—	—
	野韭 <i>Allium ramosum</i>	—	0.011	0.009	—
	马蔺 <i>Iris lactea var. chinensis</i>	—	—	—	0.005
	二色补血草 <i>Limonium bicolor</i>	—	—	—	0.009
	平车前 <i>Plantago depressa</i>	—	—	—	0.018
	西藏点地梅 <i>Androsace mariae</i>	—	—	—	0.002
	椭圆叶花锚 <i>Halenia elliptica</i>	—	—	—	0.002
	急折百蕊草 <i>Thesium refractum</i>	—	0.004	—	—




图 1 不同干扰下典型草原群落的外貌特征

Fig. 1 Community features of different disturbances in typical steppe

不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)；E：封育 Exclosure；EF：封育+施肥 Exclosure plus Fertilization；EB：封育+火烧 Exclosure plus Burning；G：放牧 Grazing

从生活型功能群来看(图2)，不同干扰样地各功能群类型基本一致，均由禾本科类、莎草类、豆科类和杂类草组成，但各功能群生物量在群落中所占的比例则大不相同，禾本科草与杂类草约占85%—94%。在封育+施肥样地与封育样地，禾本科草生物量显著高于杂类草，占60%左右，处于优势地位。而封育+火烧与放牧地，禾本科草与杂类草所占整个群落的比例大致相同，在45%左右。在4种干扰类型中，封育+施肥地的地上生物量最高，主要是禾本科草类与莎草类显著高于其他3种干扰类型所致($P<0.05$)。4种干扰类型的豆科类与杂类草生物量没有显著差异。




图 2 不同干扰对典型草原群落地上生物量的影响

Fig. 2 Effects of different disturbances on above-ground biomass in typical steppe

2.3 不同干扰对群落物种多样性的影响

在不同干扰条件下群落物种多样性的变化不同(图3)。物种丰富度指数是表明群落中物种多寡的参数,丰富度指数 Ma 指标表明放牧地群落物种丰富度最高,为4.943,封育地物种丰富度最低,为3.642;不同干扰群落丰富度指数(R 和 Ma)为放牧>封育+施肥>封育+火烧>封育。均匀度反映各群落中物种个体数分布的均匀程度,均匀度指数(J_{sw} 和 Ea)指标都反映出封育样地群落均匀度指数最高,封育+施肥样地群落均匀度指数最低,封育+火烧与放牧样地居中。多样性指数是物种水平上多样性和异质性程度的度量,综合反映群落物种丰富度和均匀度。所以它与物种丰富度和均匀度的结果有一定差异。不同干扰样地群落多样性指数(D 和 H')为放牧>封育>封育+火烧>封育+施肥。优势度指数(D_B)所表达的信息与多样性指数和均匀度指数相反,反映了各物种种群数量的变化情况,不同干扰群落优势度指数(D_B)为封育+施肥>封育+火烧>封育>放牧,封育+施肥样地优势度指数最大,为0.263,说明群落内物种数量分布最不均匀,优势种大针茅的地位突出;封育+火烧地次之,这与铁杆蒿在群落中分布多而集中占优势有关(图3)。




图3 不同干扰对典型草原群落物种多样性的影响

Fig. 3 Effects of the different disturbances on the diversity index of community in typical steppe

2.4 群落生产力与多样性指数的关系

群落物种多样性是丰富度和均匀度的综合,它又是判断生物群落结构变化或生态系统稳定性的指标,本文通过对多样性(Shannon-Wiener 和 Simpson)指数和地上生物量的相关分析表明:地上生物量与多样性之间呈显著负相关(图4)。

3 讨论与结论

放牧是草地常见的干扰方式,也是一种高度复杂的干扰方式,它对植物群落既有消极作用,也有积极作用^[15]。本研究结果表明,放牧与其他干扰方式相比,样地群落高度、盖度、密度和地上生物量显著降低,这与前人研究结果一致^[16-17]。因为牲畜的采食具有选择性,加上采食过程中的踩踏,使得牲畜喜食牧草和不耐践踏牧草数量急剧减少,进而改变草地群落结构,影响草地生产力的积累。另一方面放牧也是草地生态系统生物多样性变化的重要原因之一^[18-19]。不同的放牧强度对植物多样性的影响程度不同,研究表明^[9]适度放牧




图4 典型草原地上生物量与物种多样性的关系

Fig. 4 The relationships between above-ground biomass and diversity index in typical steppe

能显著提高草地群落的物种多样性,本实验放牧样地属于中度放牧,丰富度指数和多样性指数都高于其他干扰方式,符合中度干扰理论^[3, 20];即中等干扰条件下,物种多样性最大。优势度指数最小,均匀度指数低于封育样地,说明放牧增加了群落的空间异质性。因为首先牲畜的啃食抑制了优势种本氏针茅的生长,一些耐牧草种(扁穗冰草、铁杆蒿等)、耐践踏草种(星毛委陵菜)和牲畜不喜食的杂类草明显增加,即降低了优势种的竞争优势,所以优势度指数低于其他3种干扰样地,这样为竞争力较弱物种的生存拓宽了空间,提高了资源利用率,使物种在种类和数量配置上发生变化,增加了群落结构的复杂性,导致生物多样性发生变化^[8]。其次家畜在采食过程中可以帮助某些植物传播种子,扩大了一些植物的分布面积^[21]。

相对于放牧干扰,围栏封育是退化草地恢复与重建的重要措施之一,对云雾山草地实施封育后,草地植被盖度、平均高度以及地上、地下生物量,均有不同程度的提高^[22-23]。本研究结果表明:封育和放牧样地的植被盖度、高度和地上现存量的差异均达到显著水平($P<0.05$)。王炜^[24]认为草原退化群落在自然封育条件下迅速恢复的原因是植物在消除放牧干扰后种群拓殖与对群落剩余资源利用的能力增加了。但封育对群落多样性影响的研究结果较复杂^[7, 25],贾晓妮^[4]研究得出围栏封育在一定时间范围内可以显著改善群落的特征,增加群落的生产力,但围封年限不同会显著影响物种多样性,指出了封育最佳年限为10—15a。本实验封育样地年限为20a,群落水平结构均一,垂直结构从高到低依次为大针茅、硬质早熟禾和多年生牧草花苜蓿,而且其重要值都高于其他3种干扰样地,这与邹厚远等^[10]对黄土高原典型草原的自然恢复演替推断的第5个阶段相似,说明退化草地经过内因生态演替达到与当地气候相对稳定的群落。封育样地物种丰富度指数低于其他3种干扰样地,物种多样性指数低于放牧地,可见长时间的封育会减少植物物种多样性,与前人研究结果一致^[26-27],但物种均匀度指数高于其他3种样地,群落空间匀质性高。根据草地生态系统的可持续性原理,草地围封不应是无限期的。围栏封育时间的长短应根据草地退化程度和草地恢复状况而定,封育期过长,枯落物积累太多会抑制植物的再生和幼苗的形成,不利于草地的繁殖更新,而且会降低草地物种多样性,影响草地生态系统的能量流动和物质循环,对草地健康会产生严重干扰。

对封育20a的样地进行火烧后,群落盖度、高度和密度没有显著变化,但地上生物量显著增加($P<0.05$),所以火烧能显著增加群落生产力^[28]。首先本研究样地在生长季初期遭火烧,消除了地上立枯物和凋落物,为竞争力较弱的物种的进入提供了生存空间,多年生植物和杂类草种类(急折百蕊草、瓣蕊唐松草、翻白草等)增加;其次由于地表覆盖度减小,地表接受到的光照强度和土壤温度的增加可刺激种子萌发^[29],所以物种丰富度指数高于封育样地,这与Collins^[30]研究早春火烧使北美混合草原物种丰富度增加的结果一致。但地表长时间的裸露,使土壤水分损失较多,对植物个体发育和群落发展有不利影响,所以封育+火烧样地群落密度与放牧地相近,且多样性指数和均匀度指数低于封育样地。这与李晓波^[31]、贺郝钰^[32]等研究结果一致。此外针茅属于根茎型禾草,耐火能力强^[33],在草地返青季,他们能很快生长,成为群落优势种,可见火烧后本氏针茅和大针茅的优势种地位没有变化,不同的是铁杆蒿是一种半灌木,根蘖性强,生命力也极强,在火烧后迅速分蘖出枝条,而且铁杆蒿还能分泌出一种化感物质,抑制其他物种的生长^[34],成为群落的建群种,因此封

育20a的草地火烧后,群落有向铁杆蒿+本氏针茅+大针茅阶段逆向演替的迹象,但这个结论还有待进一步研究。

对封育20a的草地进行施肥后,群落盖度和地上现存量显著高于其他3种干扰方式($P<0.05$),因为施肥增加了土壤中的养分资源,一些喜肥的物种(本氏针茅和大针茅)具有比其它物种更快的生长率,促进自身地上生物量和盖度的增加,最终引起群落生产力的增加^[35]。而物种丰富度指数高于封育和封育+火烧地,这与前人研究结果不同^[36],原因可能是施肥年限少,植物种类影响还不明显。但群落物种多样性指数和均匀度指数都低于其他干扰样地,这与前人研究结果一致^[7-8]。李伟^[37]认为光竞争假说和根竞争假说都不能全面解释施肥后多样性降低,地上/地下竞争的相互作用可能是施肥后多样性降低的最合理的解释。因为随着群落中优势种的旺盛生长,群落的密闭度增加,自身光资源截取和光竞争的强度增加,使群落下层不耐荫物种或个体较小物种在群落中减少或死亡。同时,资源的增加改变了群落内物种的相对竞争能力,使草地中优势种(针茅类)地下、地上竞争能力增强,从而排除了杂草和豆科物种,使多样性降低^[38]。可见封育草地施肥后多样性下降符合生态位理论^[37],即生态位相同的物种因竞争相同的资源而不能稳定共存。另外,由于施肥后白颖苔草的相对密度增加导致其重要值最高,可推测为这是黄土高原典型草原在外因作用下的演替结果,即白颖苔草取代了本氏针茅和大针茅的优势地位,使群落发展成为更加典型的草甸群落。

本实验中,地上生物量与物种多样性呈负相关关系,不支持多样性-生产力假说(即建立在不同物种利用不同资源的基础上,复杂多样的植物群落能利用更多的有限资源从而获得更高的生产力^[39]),而更倾向于竞争假说(根竞争和光竞争),Rajaniemi^[40]认为,在生产力低且资源斑块化的植物群落中,根竞争成为个体大小不对称竞争,导致物种多样性下降。在高生产力条件下,物种间竞争由地下转为地上,随着生产力的提高,长得高的物种将遮住矮的物种,这种对光的大小不对称竞争将导致更多的物种被排除。在不平衡的扰动状态中,根竞争的作用可能特别重要;但在平衡的生产力很高的群落中,光竞争会对物种多样性与生产力的关系起重要作用,所以地上/地下竞争的相互作用共同导致了生产力与多样性的负相关关系。

References:

- [1] Chen Z Z, Wang S P. Typical Grassland Ecosystem in China. Beijing: Science Press, 2000: 1-6.
- [2] Management office of Yunwu Mountain natural conservation area in Ningxia. Collected works of scientific investigation and management in Yunwu Mountain natural conservation area in Ningxia. Yinchuan: Ningxia People's Press, 2001. 1-131.
- [3] Wen L, Dong S K, Zhu L, Shi J J, Liu D M, Wang Y L, Ma Y S. The effect of natural factors and disturbance intensity on spacial heterogeneity of plant diversity in alpine meadow. *Acta Ecologica Sinica*, 2011, 31(7): 1844-1854.
- [4] Jia X N, Cheng J M, Wan H E. Change of species diversity on typical *Stipa bungeana* community restoration and succession in the Yunwu Mountain. *Acta Prataculturae Sinica*, 2008, 17(4): 12-18.
- [5] Cheng J M, Wan H E, Hu X M. Study of vegetation restoration and rebuilding pattern and the process of succession in the loess hilly regions. *Acta Agrestia Sinica*, 2005, 13(4): 324-327.
- [6] Proulx M, Mazumder A. Reversal of grazing impact on plant species richness in nutrient-poor vs. nutrient-rich ecosystems. *Ecology*, 1998, 79(8): 2581-2592.
- [7] Zhou G Y, Chen G C, Zhao Y L, Wang S Z, Li W, Peng M. Comparative research on the influence of chemical fertilizer application and enclosure on alpine steppes in the Qinghai Lake area I. Structure and species diversity of the plant community. *Acta Pratacultural Science*, 2004, 13(1): 26-31.
- [8] Jiang X L, Zhang W G, Yang Z Y, Wang G. The influence of disturbance on community structure and plant diversity of alpine meadow. *Acta Botanica Boreali-occidentalia Sinica*, 2003, 23(9): 1479-1485.
- [9] Yang L M, Han M, Li J D. Plant diversity change in grassland communities along a grazing disturbance gradient in the northeast China transect. *Acta Phytoecologica Sinica*, 2001, 25(1): 110-114.
- [10] Hensel R L. Recent studies on the effect of burning on grassland vegetation. *Ecology*, 1923, 4(2): 183-188.
- [11] Anderson H G, Bailey A W. Effects of annual burning on grassland in the aspen parkland of east-central Alberta. *Canadian Journal of Botany*, 1980, 58(8): 985-996.
- [12] Zou H Y, Cheng J M, Zhou L, Hongo A. Natural recoverage succession and regulation of the prairie vegetation on the loess plateau. *Research of*

- Soil and Water Conservation, 1998, 5(1): 127-138.
- [13] Li R, Zhang K B, Liu Y F, Wang B T, Yang X H, Hou R P. Plant community spatial distribution pattern of wetland ecosystem in a semi-arid region of northwestern China. Journal of Beijing Forestry University, 2008, 30(1): 6-13.
- [14] Ren J Z. Research methods for pratacultural science. Beijing: China Agriculture Press, 1998: 1-30.
- [15] McIntyre S, Lavorel S, Landsberg J, Forbes T D A. Disturbance response in vegetation-towards a global perspective on functional traits. Journal of Vegetation Science, 1999, 10(5): 621-630.
- [16] Belsky A J. Effects of grazing, competition, disturbance and fire on species composition and diversity in grassland communities. Journal of Vegetation Science, 1992, 3(2): 187-200.
- [17] Pettit N E, Froend R H, Ladd P G. Grazing in remnant woodland vegetation: changes in species composition and life form groups. Journal of Vegetation Science, 1995, 6(1): 121-130.
- [18] Sala O E, Oesterheld M, León R J C, Soriano A. Grazing effects upon plant community structure in subhumid grasslands of Argentina. Vegetatio, 1986, 67(1): 27-32.
- [19] Austin M P, Williams O B, Belbin L. Grassland dynamics under sheep grazing in an Australian Mediterranean type climate. Vegetatio, 1981, 46-47(1): 201-212.
- [20] Ram J, Singh J S, Singh S P. Plant biomass, species diversity and net primary production in a central Himalayan high altitude grassland. Journal of Ecology, 1989, 77(2): 456-468.
- [21] Wang R Z. Effects of disturbances on species diversity in grassland ecosystems. Journal of Northeast Normal University: Natural Science Edition, 1996, (3): 112-116.
- [22] Jia X N, Cheng J M, Wan H E. Effects of enclosure on the community characteristics of *stipa bungeana* grassland in Yunwu Mountain. Acta Agrestia Sinica, 2008, 16(3): 272-277.
- [23] Chen F R, Cheng J M, Yu L N, Li Y, Wu Y Q. Effects of fencing and grazing on the biomass of typical steppe in the Loess Plateau. Pratacultural Science, 2011, 28(6): 1079-1084.
- [24] Wang W, Liu Z L, Hao D Y, Liang C Z. Research on the restoring succession of the degenerated grassland in Inner Mongolia—I. Basic characteristics and driving force for restoration of the degenerated grassland. Acta Phytoecologica Sinica, 1996, 20(5): 449-459.
- [25] Qi B, Zhang D G, Ding L L, Zhang L, Wang X, Yang Y H. Properties of plant community diversity of degraded alpine arid grasslands. Journal of Gansu Agricultural University, 2005, 40(5): 626-631.
- [26] Fan Y G, Hu Y K, Li K H, Yu J M, Wang X. Effects of different disturbances on the diversity and biomass of the phytobiocoenoses in alpine steppes. Arid Zone Research, 2008, 25(4): 531-536.
- [27] Hobbs R J, Huenneke L F. Disturbance, diversity, and invasion: implications for conservation. Conservation Biology, 1992, 6(3): 324-337.
- [28] Pei C F, Jiao J S. The Influence of grassland fire on *Stipa krylovii* and *Agropyron cristatum*. Grassland of China, 1998, (3): 39-40, 46-46.
- [29] Knapp A K, Seastedt T R. Detritus accumulation limits productivity of tallgrass prairie. Bioscience, 1986, 36(10): 662-668.
- [30] Collins S L. Interaction of disturbances in tallgrass prairie: a field experiment. Ecology, 1987, 68(5): 1243-1250.
- [31] Li X B, Zhou D W, Jiang S C. Effects of fire factors on plant diversity of Songnen *Aneurolepidium Chinensis* grassland. Pratacultural Science, 1997, 14(4): 61-64.
- [32] He H Y, Su J Q, Huang L, Jia X L, Li X R. Effects of fire on the structure of herbage synusia vegetation in desertified steppe, North China. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(2): 364-370.
- [33] Zhou D W, Jiang S C, Hu Y J. Changes in plant height growth, moisture and chlorophyll content following a grassland burning. Journal of Northeast Normal University: Natural Science Edition, 1999, (4): 91-95.
- [34] Wang H, Xie Y S, Yang Y L, Chuai J F. Allelopathic effect of extracts from *Artemisia sacrorum* leaf and stem on four dominant plants of enclosed grassland on Yunwu Mountain. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(20): 6013-6021.
- [35] Tilman D, Pacala S. The Maintenance of Species Richness in Plant Communities. Chicago: University of Chicago Press, 1993: 557-569.
- [36] Niu K C, Luo Y J, Choler P, Du G Z. The role of biomass allocation strategy on diversity loss due to fertilization. Basic and Applied Ecology, 2008, 9(5): 485-493.
- [37] Li W. Research on the Mechanism of Species Diversity Loss Due to Fertilization of Alpine Meadow on the Tibetan Plateau[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2011.
- [38] Gilliam F S. Response of the herbaceous layer of forest ecosystems to excess nitrogen deposition. Journal of Ecology, 2006, 94: 1176-1191.
- [39] McCann K S. The diversity-stability debate. Nature, 2000, 405(6783): 228-233.
- [40] Rajaniemi T K. Why does fertilization reduce plant species diversity? Testing three competition-based hypotheses. Journal of Ecology, 2002, 90(2): 316-324.

参考文献：

- [1] 陈佐忠, 汪诗平. 中国典型草原生态系统. 北京: 科学出版社, 2000; 1-6.
- [2] 宁夏云雾山草原自然保护区管理处. 宁夏云雾山自然保护区科学考察与管理文集. 银川: 宁夏人民出版社, 2001.
- [3] 温璐, 董世魁, 朱磊, 施建军, 刘德梅, 王彦龙, 马玉寿. 环境因子和干扰强度对高寒草甸植物多样性空间分异的影响. 生态学报, 2011, 31(7): 1844-1854.
- [4] 贾晓妮, 程积民, 万惠娥. 云雾山本氏针茅草地群落恢复演替过程中的物种多样性变化动态. 草业学报, 2008, 17(4): 12-18.
- [5] 程积民, 万惠娥, 胡相明. 黄土丘陵区植被恢复重建模式与演替过程研究. 草地学报, 2005, 13(4): 324-327.
- [7] 周国英, 陈桂琛, 赵以莲, 王顺忠, 李伟, 彭敏. 施肥和围栏封育对青海湖地区高寒草原影响的比较研究 I 群落结构及其物种多样性. 草业学报, 2004, 13(1): 26-31.
- [8] 江小蕾, 张卫国, 杨振宇, 王刚. 不同干扰类型对高寒草甸群落结构和植物多样性的影响. 西北植物学报, 2003, 23(9): 1479-1485.
- [9] 杨利民, 韩梅, 李建东. 中国东北样带草地群落放牧干扰植物多样性的变化. 植物生态学报, 2001, 25(1): 110-114.
- [12] 邹厚远, 程积民, 周麟, Hongo A. 黄土高原草原植被的自然恢复演替及调节. 水土保持研究, 1998, 5(1): 127-138.
- [13] 李瑞, 张克斌, 刘云芳, 王百田, 杨晓晖, 侯瑞萍. 西北半干旱区湿地生态系统植物群落空间分布特征研究. 北京林业大学学报, 2008, 30(1): 6-13.
- [14] 任继周. 草业科学研究方法. 北京: 中国农业出版社, 1998; 1-30.
- [21] 王仁忠. 干扰对草地生态系统生物多样性的影响. 东北师范大学学报: 自然科学版, 1996, (3): 112-116.
- [22] 贾晓妮, 程积民, 万惠娥. 封育对云雾山本氏针茅草地群落的影响. 草地学报, 2008, 16(3): 272-277.
- [23] 陈芙蓉, 程积民, 于鲁宁, 李媛, 吴艳芹. 封育和放牧对黄土高原典型草原生物量的影响. 草业科学, 2011, 28(6): 1079-1084.
- [24] 王炜, 刘钟龄, 郝敦元, 梁存柱. 内蒙古草原退化群落恢复演替的研究——I. 退化草原的基本特征与恢复演替动力. 植物生态学报, 1996, 20(5): 449-459.
- [25] 祁彪, 张德罡, 丁玲玲, 张力, 汪玺, 杨予海. 退化高寒干旱草地植物群落多样性特征. 甘肃农业大学学报, 2005, 40(5): 626-631.
- [26] 范永刚, 胡玉昆, 李凯辉, 于建梅, 王鑫. 不同干扰对高寒草原群落物种多样性和生物量的影响. 干旱区研究, 2008, 25(4): 531-536.
- [28] 裴成芳, 焦金寿. 草原火对克氏针茅和扁穗冰草的影响试验. 中国草地学报, 1998, (3): 39-40, 46-46.
- [31] 李晓波, 周道玮, 姜世成. 火因子对松嫩羊草草原植物多样性的影响. 草业科学, 1997, 14(4): 61-64.
- [32] 贺郝钰, 苏洁琼, 黄磊, 贾荣亮, 李新荣. 火因子对荒漠化草原草本层片植物群落组成的影响. 生态学报, 2011, 31(2): 364-370.
- [33] 周道玮, 姜世成, 胡勇军. 草原植物高生长、体内水分和叶绿素含量对火烧的反应. 东北师范大学学报: 自然科学版, 1999, (4): 91-95.
- [34] 王辉, 谢永生, 杨亚利, 端峻峰. 云雾山铁杆蒿茎叶浸提液对封育草地四种优势植物的化感效应. 生态学报, 2011, 31(20): 6013-6021.
- [37] 李伟. 施肥导致高寒草甸物种多样性丧失机制研究 [D]. 兰州: 兰州大学, 2011.

ACTA ECOLOGICA SINICA Vol. 33, No. 9 May, 2013 (Semimonthly)

CONTENTS

Frontiers and Comprehensive Review

- Analysis of subject trends in research on sustainable development CHA Na, WU Jianguo, YU Runbing (2637)
Metabolic scaling theory and its application in microbial ecology HE Jizheng, CAO Peng, ZHENG Yuanming (2645)
Research progress on endophyte-promoted plant nitrogen assimilation and metabolism YANG Bo, CHEN Yan, LI Xia, et al (2656)

Review on the development of landscape architecture ecology in China YU Yijing, MA Jinyi, YUAN Yunjue (2665)

Autecology & Fundamentals

- Evaluating tillage practices impacts on soil organic carbon based on least limiting water range CHEN Xuewen, WANG Nong, SHI Xiuhuan, et al (2676)
Controls over soil organic carbon content in grasslands TAO Zhen, CI Dan Langjie, ZHANG Shenghua, et al (2684)
Antagonistic interactive effects of exogenous calcium ions and parasitic *Cuscuta australis* on the morphology and structure of *Alternanthera philoxeroides* stems CHE Xiuxia, CHEN Huijing, YAN Qiaodi, et al (2695)
Correlation between pigment content and reflectance spectrum of *Phyllostachys pubescens* stems during its rapid growth stage LIU Lin, WANG Yukui, WANG Xingxing, et al (2703)
Response of leaf functional traits and the relationships among them to altitude of *Salix dissa* in Balang Mountain FENG Qiuhong, CHENG Ruimei, SHI Zuomin, et al (2712)
Effects of phosphate and organic matter applications on arsenic uptake by and translocation in *Isatis indigotica* GAO Ningda, GENG Liping, ZHAO Quanli, et al (2719)
Effect of different preys on the predation and prey preference of *Orius similis* ZHANG Changrong, ZHI Junrui, MO Lifeng (2728)
Effects of predation risk on the patterns of functional responses in reed vole foraging TAO Shuanglun, YANG Xifu, YAO Xiaoyan, et al (2734)
Phylogenetic analysis of Veneridae (Mollusca: Bivalvia) based on the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene fragment CHENG Hanliang, PENG Yongxing, DONG Zhiguo, et al (2744)
Effects of different ecological environments in the laboratory on the covering behavior of the sea urchin *Glyptocidaris crenularis* CHANG Yaqing, LI Yunxia, LUO Shabin, et al (2754)

Population, Community and Ecosystem

- The ecosystem services value change in the upper reaches of Ganjiang River Based on RS and GIS CHEN Meiqiu, ZHAO Baoping, LUO Zhijun, et al (2761)
The reference condition for Eutrophication Indicator in the Yangtze River Estuary and adjacent waters — response variables ZHENG Binghui, ZHU Yanzhong, LIU Lusan, et al (2768)
The reference condition for eutrophication Indicator in the Yangtze River Estuary and adjacent waters — Causal Variables ZHENG Binghui, ZHOU Juan, LIU Lusan, et al (2780)
The stress response of biological communities in China's Yalu River Estuary and neighboring waters SONG Lun, WANG Nianbin, YANG Guojun, et al (2790)
Ecological characteristics of macrobenthic communities and its relationships with environmental factors in Hangzhou Xixi Wetland LU Qiang, CHEN Huili, SHAO Xiaoyang, et al (2803)
Effects of biological soil crusts on desert soil nematode communities LIU Yanmei, LI Xinrong, ZHAO Xin, et al (2816)
Associations between weather factors and the spring migration of the horned gall aphid, *Schlechtendalia chinensis* LI Yang, YANG Zixiang, CHEN Xiaoming, et al (2825)
Effects of vegetation on soil aggregate stability and organic carbon sequestration in the Ningxia Loess Hilly Region of northwest China CHENG Man, ZHU Qulian, LIU Lei, et al (2835)

Simulation of the carbon cycle of <i>Larix chinensis</i> forest during 1958 and 2008 at Taibai Mountain, China	LI Liang, HE Xiaojun, HU Lile, et al (2845)
Effects of different disturbances on diversity and biomass of communities in the typical steppe of loess region	CHEN Furong, CHENG Jimin, LIU Wei, et al (2856)
Age structure and point pattern of <i>Butula platyphylla</i> in Wulashan Natural Reserve of Inner Mongolia	HU Ercha, WANG Xiaojiang, ZHANG Wenjun, et al (2867)
The impacts of the Southwest China drought on the litterfall and leaf area index of an evergreen broadleaf forest on Ailao Mountain	QI Jinhua, ZHANG Yongjiang, ZHANG Yiping, et al (2877)
Spatial distribution of tree species richness in Xiaodonggou forest region of the Altai Mountains, Northwest China	JING Xuehui, CAO Lei, ZANG Runguo (2886)
Landscape, Regional and Global Ecology	
The ecological risk assessment of Taihu Lake watershed	XU Yan, GAO Junfeng, GUO Jianke (2896)
The value of fixing carbon and releasing oxygen in the Guanzhong-Tianshui economic region using GIS	ZHOU Zixiang, LI Jing, FENG Xueming (2907)
Resource and Industrial Ecology	
Effect of different controlled-release nitrogen fertilizers on availability of heavy metals in contaminated red soils under waterlogged conditions	LIANG Peijun, XU Chao, WU Qitang, et al (2919)
Research Notes	
Effect of heat and high irradiation stress on Deg1 protease and D1 protein in wheat chloroplasts and the regulating role of salicylic acid	ZHENG Jingjing, ZHAO Huijie, HU Weiwei, et al (2930)
The difference of drought impacts on winter wheat leaf area index under different CO ₂ concentration	LI Xiaohan, WU Jianjun, LÜ Aifeng, et al (2936)

《生态学报》2013 年征订启事

《生态学报》是由中国科学技术协会主管,中国生态学学会、中国科学院生态环境研究中心主办的生态学高级专业学术期刊,创刊于1981年,报道生态学领域前沿理论和原始创新性研究成果。坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,依靠和团结广大生态学科研工作者,探索自然奥秘,为生态学基础理论研究搭建交流平台,促进生态学研究深入发展,为我国培养和造就生态学科研人才和知识创新服务、为国民经济建设和发展服务。

《生态学报》主要报道生态学及各分支学科的重要基础理论和应用研究的原始创新性科研成果。特别欢迎能反映现代生态学发展方向的优秀综述性文章;研究简报;生态学新理论、新方法、新技术介绍;新书评价和学术、科研动态及开放实验室介绍等。

《生态学报》为半月刊,大16开本,300页,国内定价90元/册,全年定价2160元。

国内邮发代号:82-7,国外邮发代号:M670

标准刊号:ISSN 1000-0933 CN 11-2031/Q

全国各地邮局均可订阅,也可直接与编辑部联系购买。欢迎广大科技工作者、科研单位、高等院校、图书馆等订阅。

通讯地址:100085 北京海淀区双清路18号 电 话:(010)62941099; 62843362

E-mail: shengtaixuebao@rcees.ac.cn 网 址: www.ecologica.cn

本期责任编辑 欧阳志云

编辑部主任 孔红梅

执行编辑 刘天星 段 靖

生态学报

(SHENTAI XUEBAO)

(半月刊 1981年3月创刊)

第33卷 第9期 (2013年5月)

ACTA ECOLOGICA SINICA

(Semimonthly, Started in 1981)

Vol. 33 No. 9 (May, 2013)

编 辑 《生态学报》编辑部
地址:北京海淀区双清路18号
邮政编码:100085
电话:(010)62941099
www.ecologica.cn
shengtaixuebao@rcees.ac.cn

主 编 王如松
主 管 中国科学技术协会
主 办 中国生态学学会
中国科学院生态环境研究中心
地址:北京海淀区双清路18号
邮政编码:100085

出 版 科 学 出 版 社
地址:北京东黄城根北街16号
邮政编码:100717

印 刷 北京北林印刷厂
行 书 学 出 版 社
地址:东黄城根北街16号
邮政编码:100717
电话:(010)64034563

订 购 国外发行
E-mail:journal@cspg.net
全国各地邮局
中国国际图书贸易总公司
地址:北京399信箱
邮政编码:100044

广 告 经 营 许 可 证
京海工商广字第8013号

Edited by Editorial board of
ACTA ECOLOGICA SINICA
Add:18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China
Tel:(010)62941099
www.ecologica.cn
shengtaixuebao@rcees.ac.cn


Editor-in-chief WANG Rusong
Supervised by China Association for Science and Technology
Sponsored by Ecological Society of China
Research Center for Eco-environmental Sciences, CAS
Add:18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China

Published by Science Press
Add:16 Donghuangchenggen North Street,
Beijing 100717, China

Printed by Beijing Bei Lin Printing House,
Beijing 100083, China

Distributed by Science Press
Add:16 Donghuangchenggen North
Street, Beijing 100717, China
Tel:(010)64034563
E-mail:journal@cspg.net

Domestic All Local Post Offices in China
Foreign China International Book Trading
Corporation
Add:P. O. Box 399 Beijing 100044, China



ISSN 1000-0933
CN 11-2031/Q

国内外公开发行

国内邮发代号 82-7

国外发行代号 M670

定价 90.00 元