

ISSN 1000-0933
CN 11-2031/Q

生态学报

Acta Ecologica Sinica



第 33 卷 第 21 期 Vol.33 No.21 **2013**

中国生态学学会
中国科学院生态环境研究中心
科学出版社

主办
出版



中国科学院科学出版基金资助出版

生态学报

(SHENGTAI XUEBAO)

第 33 卷 第 21 期 2013 年 11 月 (半月刊)

目 次

前沿理论与学科综述

- 生态系统生产总值核算:概念、核算方法与案例研究..... 欧阳志云,朱春全,杨广斌,等 (6747)
- 气候变化对传染病爆发流行的影响研究进展..... 李国栋,张俊华,焦耿军,等 (6762)
- 好氧甲烷氧化菌生态学研究进展 负娟莉,王艳芬,张洪勋 (6774)
- 氮沉降强度和频率对羊草叶绿素含量的影响..... 张云海,何念鹏,张光明,等 (6786)
- 世界蜘蛛的分布格局及其多元相似性聚类分析..... 申效诚,张保石,张 锋,等 (6795)
- 风向因素对转基因抗虫棉花基因漂移效率的影响..... 朱家林,贺 娟,牛建群,等 (6803)

个体与基础生态

- 长江口及东海春季底栖硅藻、原生动物和小型底栖生物的生态特点 孟昭翠,徐奎栋 (6813)
- 长江口横沙东滩围垦潮滩内外大型底栖动物功能群研究..... 吕巍巍,马长安,余 骥,等 (6825)
- 沔河沿岸土壤和优势植物重金属富集特征和潜在生态风险..... 杨 阳,周正朝,王欢欢,等 (6834)
- 盐分和底物对黄河三角洲区土壤有机碳分解与转化的影响..... 李 玲,仇少君,檀菲菲,等 (6844)
- 短期夜间低温胁迫对秋茄幼苗碳氮代谢及其相关酶活性的影响..... 郑春芳,刘伟成,陈少波,等 (6853)
- 32 个切花菊品种的耐低磷特性 刘 鹏,陈素梅,房伟民,等 (6863)
- 年龄和环境条件对泥蚶富集重金属镉和铜的影响..... 王召根,吴洪喜,陈肖肖,等 (6869)
- 角倍蚜虫瘿对盐肤木光合特性和总氮含量的影响..... 李 杨,杨子祥,陈晓鸣,等 (6876)
- 多噬伯克霍尔德氏菌 WS-FJ9 对草甘膦的降解特性 李冠喜,吴小芹,叶建仁 (6885)
- 金龟甲对蓖麻叶挥发物的触角电位和行为反应..... 李为争,杨 雷,申小卫,等 (6895)

种群、群落和生态系统

- 白洋淀生态系统健康评价..... 徐 菲,赵彦伟,杨志峰,等 (6904)
- 珠海鹤洲水道沿岸红树林湿地大型底栖动物群落特征 王 卉,钟 山,方展强 (6913)
- 典型森林和草地生态系统呼吸各组分间的相互关系..... 朱先进,于贵瑞,王秋凤,等 (6925)
- 抚育间伐对油松人工林下大型真菌的影响..... 陈 晓,白淑兰,刘 勇,等 (6935)
- 百山祖自然保护区植物群落 beta 多样性 谭珊珊,叶珍林,袁留斌,等 (6944)
- 土霉素对堆肥过程中酶活性和微生物群落代谢的影响..... 陈智学,谷 洁,高 华,等 (6957)

景观、区域和全球生态

- 兴安落叶松针叶解剖结构变化及其光合能力对气候变化的适应性 季子敬,全先奎,王传宽 (6967)
- 盐城海滨湿地景观演变关键土壤生态因子与阈值研究..... 张华兵,刘红玉,李玉凤,等 (6975)

半干旱区沙地芦苇对浅水位变化的生理生态响应 马赞花,张铜会,刘新平 (6984)

SWAT 模型融雪模块的改进 余文君,南卓铜,赵彦博,等 (6992)

科尔沁沙地湖泊消涨对气候变化的响应..... 常学礼,赵学勇,王 玮,等 (7002)

贝壳堤岛 3 种植被类型的土壤颗粒分形及水分生态特征..... 夏江宝,张淑勇,王荣荣,等 (7013)

三峡库区古夫河着生藻类叶绿素 a 的时空分布特征及其影响因素..... 吴述园,葛继稳,苗文杰,等 (7023)

资源与产业生态

煤炭开发对矿区植被扰动时空效应的图谱分析——以大同矿区为例..... 黄 翌,汪云甲,李效顺,等 (7035)

学术信息与动态

《中国当代生态学研究》新书推介 刘某承 (7044)

期刊基本参数:CN 11-2031/Q * 1981 * m * 16 * 300 * zh * P * ¥90.00 * 1510 * 30 * 2013-11



封面图说: 百山祖保护区森林植物群落——百山祖国家级自然保护区位于浙西南闽浙交界处,由福建武夷山向东北伸展而成,主峰海拔 1856.7m,为浙江省第二高峰。其独特的地形和水文地理环境形成了中亚热带气候区中一个特殊的区域,保存着十分丰富的植物种质资源以及国家重点保护野生动植物种,尤其是 1987 年由国际物种保护委员会列为世界最濒危的 12 种植物之一的百山祖冷杉,是第四纪冰川的孑遗植物,素有“活化石”之称。随着海拔的升高,其植被为常绿阔叶林、常绿-落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林、山地矮林和山地灌草丛。

彩图及图说提供: 陈建伟教授 北京林业大学 E-mail: cites.chenjw@ 163.com

DOI: 10.5846/stxb201207130988

朱先进, 于贵瑞, 王秋风, 高艳妮, 赵新全, 韩士杰, 闫俊华. 典型森林和草地生态系统呼吸各组分间的相互关系. 生态学报, 2013, 33(21): 6925-6934.

Zhu X J, Yu G R, Wang Q F, Gao Y N, Zhao X Q, Han S J, Yan J H. The interaction between components of ecosystem respiration in typical forest and grassland ecosystems. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(21): 6925-6934.

典型森林和草地生态系统呼吸各组分间的相互关系

朱先进^{1,2}, 于贵瑞^{1,*}, 王秋风¹, 高艳妮^{1,2}, 赵新全³, 韩士杰⁴, 闫俊华⁵

(1. 中国科学院地理科学与资源研究所生态网络观测与模拟重点实验室 CERN 综合研究中心, 北京 100101;

2. 中国科学院大学, 北京 100049; 3. 中国科学院西北高原生物研究所, 西宁 810001;

4. 中国科学院沈阳应用生态研究所, 沈阳 110016; 5. 中国科学院华南植物园, 广州 510650)

摘要: 生态系统呼吸是陆地生态系统碳收支的重要组成部分, 分析其组分间的相互关系对理解生态系统呼吸过程和精确评价生态系统碳收支具有重要意义, 也是当前碳循环研究工作的一大难点。利用 ChinaFLUX 的长白山温带针阔混交林 (CBS), 鼎湖山亚热带常绿阔叶林 (DHS) 和海北灌丛草甸 (HBGC) 3 个典型生态系统的通量观测数据, 分析了经验统计方法在中国典型生态系统中的适用性及敏感性, 揭示了生态系统呼吸各组分的动态变化特征及相互关系。结果表明: 采用呼吸组分拆分方法所获结果与理论推测及实测数据大致相同, 拆分结果对净初级生产力与总初级生产力比值 (NPP/GPP) 的变化较为敏感, NPP/GPP 变化 0.1 时, 自养呼吸在生态系统呼吸中的比例 (R_a/RE) 改变 0.05。各生态系统中, 生态系统呼吸及其组分在年内均表现出明显的单峰型变化特征, 在夏季生长旺盛的时节达到最大值。异养呼吸与生态系统呼吸的比值 (R_h/RE) 也具有明显的季节变化, 但在生态系统间表现出明显差异, CBS 和 HBGC 分别表现出先增大后减小和先减小后增大的变化趋势, DHS 则相对稳定, 在 0.5 附近波动, R_a/RE 的季节动态与 R_h/RE 相反。在年总量上, HBGC 主要通过异养呼吸向大气排放 CO_2 , 异养呼吸占生态系统呼吸的 60%, 而 CBS 和 DHS 的自养呼吸和异养呼吸所占比重大致相似, 异养呼吸占生态系统呼吸的 49%。这说明, 经验统计学模型可以用来进行生态系统呼吸组分的拆分, 进而可以为生态系统碳循环过程的精细研究提供参考数据, 但今后应加强 NPP/GPP 的测定, 以提高生态系统呼吸拆分的精度。

关键词: 陆地生态系统; 生态系统呼吸; 涡度相关; 碳通量; 自养呼吸; 异养呼吸

The interaction between components of ecosystem respiration in typical forest and grassland ecosystems

ZHU Xianjin^{1,2}, YU Guirui^{1,*}, WANG Qiufeng¹, GAO Yanni^{1,2}, ZHAO Xinquan³, HAN Shijie⁴, YAN Junhua⁵

1 Synthesis Research Center of CERN, Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

3 Northwest Plateau Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810001, China

4 Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China

5 South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China

Abstract: Ecosystem respiration (RE), the release of carbon from an ecosystem into the atmosphere, is a key component of the terrestrial ecosystem carbon budget and plays an important role in the global carbon balance. Analyzing the interaction between RE components is essential to understand RE and to accurately evaluate the ecosystem carbon budget. There are

基金项目: 国家重点基础研究发展规划资助项目 (2010CB833504); 国家自然科学基金资助项目 (31061140359, 30590380); 中国科学院战略性先导科技专项资助项目 (XDA05050601)

收稿日期: 2012-07-13; 修订日期: 2013-06-21

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: yugr@igsnrr.ac.cn

many methods for separating RE into autotrophic respiration (R_a) and heterotrophic respiration (R_h), but each approach has disadvantages. Large RE data have obtained through long-term eddy covariance measurements, while the interaction between R_a and R_h is poorly documented, which inhibits the accurate assessment of global carbon budget. In this study, we used an empirical statistical method to separate RE into its two components and to examine component relationships and seasonal dynamics at three ChinaFLUX sites: 1) Changbaishan temperate mixed forest (CBS); 2) Dinghushan subtropical evergreen broad-leaf forest (DHS); and 3) Haibei shrub meadow (HBGC). The applicability and sensitivity of this method in typical ecosystems of China were also evaluated. The method used in this study was based on the ratio of R_a to RE (R_a/RE). The range of R_a/RE was obtained by calculating two ratios: the ratio of RE to net ecosystem productivity (NEP) (RE/NEP) and that of net primary productivity (NPP) to gross primary productivity (GPP) (NPP/GPP). Within the range of R_a/RE , 1000 R_a/RE s were randomly selected and the value of R_a/RE used in this study was set as the mean of the 1000 random R_a/RE s. R_a and R_h were then calculated using R_a/RE and RE.

Our study showed that the RE separating method produced consistent results with those obtained through static chamber/gas chromatographic techniques at the same sites, as well as with biomass surveys and theoretical speculation. The interaction of RE components was sensitive to the variation of NPP/GPP : a ten-percent increase of NPP/GPP led to a five-percent decrease of R_a/RE . In all three ecosystems, RE and its components showed similar seasonal dynamics, with a single-peak pattern achieving its maximum midway through the growing season. The ratio of R_h to RE (R_h/RE) also showed different seasonal dynamic among the three ecosystems. In CBS, R_h/RE increased during the first half of the year, reached its peak during the growing season then decreased. However, R_h/RE in HBGC decreased during the first half of the year and increased again later in growing-season. In DHS, R_h/RE was relatively stable at approximately 0.5. Seasonal dynamics of R_a/RE were opposite to those in R_h/RE . The annual total R_h accounted for 60% of the RE in HBGC, suggesting that a large proportion of emitted carbon was released by R_h in this ecosystem. In CBS and DHS, R_h was only 49% of RE, indicating that the release of carbon through R_a and R_h was nearly the same in these two forest ecosystems. Results indicate that this statistical method, which requires detailed observations of NPP/GPP , can successfully separate RE into R_h and R_a and can provide necessary data for the detailed analysis of the ecosystem carbon cycle.

Key Words: terrestrial ecosystem; ecosystem respiration; eddy covariance; carbon fluxes; autotrophic respiration; heterotrophic respiration

生态系统呼吸(RE)是碳循环的重要分量^[1],与气候变化间存在着正反馈效应^[2-3],不仅在当前全球碳收支中占有较大的比重,而且在未来还会呈现不断增大的趋势^[4]。已有研究表明,全球的 RE 约为 103 PgC a⁻¹^[5],占全球总初级生产力(GPP)总量(123 PgC a⁻¹^[6])的 83.74%。

按照呼吸底物的不同,RE 可分为自养呼吸(R_a)和异养呼吸(R_h)。其中, R_a 是植物维持自身生命活动所必需的新陈代谢过程,又分为维持呼吸和生长呼吸。维持呼吸与温度相关,随着温度的增加呈指数增加^[7];生长呼吸与温度没有直接关系,但与 GPP 呈一定的比例^[8]。 R_h 是残存有机质分解并向大气释放 CO_2 的过程^[9],主要受土壤温湿度和有机质含量的影响^[10]。因而,影响 RE 组分的因素存在差异,拆分 RE 的各个组分、分析各组分间的相互关系有助于深入认识生态系统碳循环的过程机理,也可为陆地生态系统碳收支的精确评估提供理论依据。同时, R_a 的变化对大气 CO_2 浓度具有重要影响^[11],科学界迫切需要拆分和评估 RE 的各组分,为评价 R_a 对大气 CO_2 浓度变化的贡献提供数据。

目前,拆分 RE 组分的方法有许多种。第 1 种是将箱式法与涡度相关系统观测相结合,分别获取土壤呼吸(R_s)和 RE,实现 RE 组分的拆分^[12-14]。然而,基于箱式法获取的 R_s 包含了 R_a 和 R_h ,对 R_s 进行拆分也是一项艰巨的工作。第 2 种是利用生物量调查法获取生态系统净初级生产力(NPP),结合涡度相关观测结果估算 R_a 和 R_h ^[15-17],但生物量调查和涡度相关观测的时间尺度不一致,并且生物量调查法耗费大量的人力物

力,难以获得持续的、高质量观测数据。第3种是基于过程机理模型模拟 R_a 和 R_h ,但该方法所需参数较多,结果也受到模型设计者对 RE 过程理解程度的限制^[10]。基于同位素分馏比也可以实现对 RE 组分的拆分^[18-19],但所需仪器设备非常昂贵。Schwalm 等^[20]提出了基于通量观测数据的统计学拆分方法,并对其不确定性进行了分析。结果表明,该方法具有很好的稳定性,不同参数方案间没有明显差异,这为利用通量观测数据分析 RE 组分提供了新的技术途径。

中国陆地生态系统通量观测网络(ChinaFLUX)自2002年建立以来,已积累了大量的观测数据,构建了学术界普遍认可的通量数据处理流程^[21]。然而,现有通量数据处理仅将生态系统碳通量分解为 GPP 和 RE,尚没有拆分 RE 的组分。因此,本研究利用 Schwalm 等^[20]分析方法,拆分并评价我国典型森林和草地生态系统的 RE 组分及其相互关系,进而阐明:(1)不同生态系统 R_a 和 R_h 的动态特征,(2) R_h/RE 的年内动态变化特征,(3)不同生态系统间 R_a 和 R_h 年总量的差异。该研究可以为生态系统碳循环过程研究提供基础数据,也为通量数据处理过程中 RE 拆分方法的确定提供依据。

1 研究地点与研究方法

1.1 站点介绍

本研究选择 ChinaFLUX 中3个陆地生态系统为研究对象,分别为:长白山温带针阔混交林(CBS)、鼎湖山亚热带常绿阔叶林(DHS)和海拔高寒灌丛草甸(HBGC),各生态系统的基本信息如表1所示。

表1 研究站点基本信息

Table 1 Basic information of the studied sites

站点 Sites	纬度 Latitude	经度 Longitude	海拔 Elevation/m	年均温度 Mean annual temperature/℃	年总降水量 Mean annual precipitation/mm	观测高度 Height of observation/m
CBS	42.40°N	128.09°E	738	3.6	695	40
HBGC	37.67°N	101.33°E	3293	-1.7	570	2
DHS	23.17°N	112.53°E	300	21.0	1956	27

CBS:长白山温带针阔混交林 Changbai Mountains temperate conifer and broadleaf mixed forest; HBGC:海拔高寒灌丛草甸 Haibei alpine Shrub; DHS:鼎湖山亚热带常绿阔叶林 Dinghu Mountains subtropical evergreen broadleaf forest

3个生态系统均利用开路式涡度相关系统(OPEC)进行生态系统碳水通量观测,原始采样频率为10 Hz,通过数据采集器计算并储存30 min的通量数据。同时观测温度、湿度、降水、辐射等气象要素并计算30 min平均值储存^[21-24]。此外,辅以静态箱-气相色谱法测定土壤呼吸,每隔7—10 d测定1次^[25-27]。

1.2 数据处理

1.2.1 通量数据处理

采用 ChinaFLUX 通用数据处理流程对30 min通量数据进行处理^[21],包括三次坐标旋转、WPL校正、储存项计算及降水剔除、阈值剔除和方差别除等,并根据 Reichstein 等^[28]的方法确定夜间 u^* 临界值、实现夜间数据剔除、完成数据质量控制。利用非线性回归方法对碳通量数据进行插补,并将碳通量拆分为 GPP 和 RE。

1.2.2 自养呼吸和异养呼吸的拆分

本研究根据自养呼吸与生态系统呼吸的比值(R_a/RE)对 RE 进行拆分^[20]。具体做法为:假设净生态系统生产力(NPP)与 RE 的比值为 θ , R_a/RE 为 β ,则:

$$NPP = GPP - R_a = GPP \left(1 - \frac{R_a/RE}{1 + NPP/RE}\right) = GPP \left(1 - \frac{\beta}{1 + \theta}\right) \quad (1)$$

因而,根据式(1)可以得到 β ,即:

$$\beta = \left(1 - \frac{NPP}{GPP}\right) (1 + \theta) \quad (2)$$

已有研究表明, NPP/GPP 介于0.47—0.60之间^[20],因而, β 的范围可以表示为:

$$\begin{aligned}\beta_{\text{upper}} &= 0.53(1 + \theta) \\ \beta_{\text{lower}} &= 0.40(1 + \theta)\end{aligned}\quad (3)$$

在生态学研究, Schwalm 等^[20]将 Ra/RE 或 Rh/RE 的最小值 Ω 设为 0.10, 并分析了 Ω 上下浮动 0.05 后的结果, 他发现基于不同 Ω 得到的 β 没有明显差异, 因而此处 Ω 设为 0.10。

当 β 取最小值(0.10)时, $\theta = -0.75$; 当 β 取最大值(0.90)即 Rh/RE 取最小值(0.10)时, $\theta = 0.70$ 。因而, $\theta < -0.75$ 或者 $\theta > 0.70$ 时, 公式(3)不再适用。当 $\theta = -0.75$ 时, β_{lower} 为 0.10, β_{upper} 为 0.13; 当 $\theta = 0.70$ 时, β_{lower} 为 0.68, β_{upper} 为 0.90。针对不同的 θ 值, 设定不同的 β 范围, 具体范围如表 2 所示。

根据 θ 值, 在 β 给定的范围内随机选取 1000 个数据, 取其平均值为 β 。夜间时, $\theta = -1$, 利用公式(3)无法获取 β 值, 因而将当日白天最后一个有效的 β 和次日最早一个有效的 β 进行线性内插的方法获取夜间 β 。

最后, 根据 β 值和 RE 计算 Ra 和 Rh, 即:

$$\begin{aligned}\text{Ra} &= \beta \times \text{RE} \\ \text{Rh} &= (1 - \beta) \times \text{RE}\end{aligned}\quad (4)$$

1.3 生态系统呼吸拆分结果的验证

为了验证该方法的合理性, 利用静态箱-气相色谱法观测的土壤呼吸(Rs)数据与本研究获取的 Rh 进行对比。由于静态箱-气相色谱法的观测时间是 9:00—11:00, 因此, Rh 选用 9:00—11:30 的平均值。

1.4 数据统计

采用单因素方差分析法评价不同生态系统间 RE 组分的差异, 采用线性回归分析拆分结果与静态箱-气相色谱法所获结果的差异。所有数据统计分析过程均在 matlab7.7 中进行。

2 结果与分析

2.1 生态系统呼吸及其组分的季节动态

生态系统碳通量具有明显的季节变化特征^[29-31]。由于年际间生态系统的季节动态特征相似^[32-34], 本文以 2003 年数据为例分析中国典型森林和草地生态系统碳通量的季节动态(图 1)。

气温(T_a) 在 3 个典型生态系统均表现出单峰型变化(图 1), 最大值出现在 7 月份前后, 但不同生态系统, 其年内气温的变化幅度存在明显差异, DHS 常年保持较高的气温, 北方两个生态系统(CBS 和 HBGC)年内气温变幅较大。不同生态系统, GPP 的季节动态有所差异(图 1), 北方生态系统(CBS 和 HBGC)表现出明显的单峰型特点, 但 DHS 的 GPP 在秋冬季节较高, 在 6—8 月因温度过高而略低, 这与已有结果^[23]相一致。NEP 的季节动态与 GPP 相似(图 1), 但峰值出现时间较 GPP 略有提前。

3 个生态系统的 RE 均表现出明显的单峰型变化, 峰值均出现在 7—8 月份(图 1), 与气温的季节动态(图 1)相似, 这是因为, 生态系统尺度上, 气温的波动决定了 RE 的季节动态^[35]。生态系统间, 最大呼吸速率存在差异, CBS 可以达到 $9.20 \text{ gC m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, DHS 和 HBGC 明显小于 CBS, 均不足 $4 \text{ gC m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 。这主要是生产力的差异引起的, 生产力与 RE 存在着密切的耦合关系^[35-37]。

与 RE 的动态特征相似, Ra 和 Rh 也表现出单峰型的季节动态(图 1), 峰值出现的时间也与 RE 相似, 峰值大小约为 RE 峰值的一半。

2.2 生态系统呼吸组分与生态系统呼吸比值(Rh/RE 和 Ra/RE)的季节动态

异养呼吸与生态系统呼吸的比值(Rh/RE)表现出明显的季节波动, 但在生态系统间表现出不同的变化特征(图 2)。

Rh/RE 在 CBS 表现为年初和年末略低、生长季开始和结束时略有增加的趋势, 在生长旺盛时节大致维持在 0.5 左右, DHS 全年均在 0.5 附近波动。与两个森林生态系统的变化趋势不同, Rh/RE 在 HBGC 表现出明

表 2 不同 θ 值下的 β 范围

Table 2 β range under different θ

分组 Group	范围 Range	
	θ	β
I	(-1, -0.75)	(0.1, 0.13)
II	(-0.75, 0.7)	公式(3)
III	[0.7, +∞)	(0.68, 0.9)





图1 2003年典型生态系统气温及碳通量的季节变化特征

Fig.1 Seasonal dynamics of air temperature and carbon fluxes in typical ecosystems in 2003

显的单峰型动态,非生长季可以达到0.9,随着生长季的开始, R_h/RE 逐渐降低,并在生长旺季达到0.5左右的最小值,随着生长季的结束,异养呼吸占据主导, R_h/RE 又开始增大。

自养呼吸与生态系统呼吸的比值(R_a/RE)表现出与 R_h/RE 相反的季节变化趋势。

图2 2003年三个典型生态系统的生态系统呼吸组分在生态系统呼吸中所占比例(R_h/RE , R_a/RE)的季节动态特征Fig.2 Seasonal dynamics of the ratio of autotrophic respiration and heterotrophic respiration to ecosystem respiration (R_a/RE , R_h/RE) in typical ecosystems in 2003

2.3 生态系统呼吸及其组分的年总量

生态系统呼吸的组分反映了生态系统消耗碳量的不同途径。中国3个典型生态系统的RE及其组分的

年总量如表 3 所示。

生态系统间,RE、Ra 和 Rh 均存在显著差异,均表现为 CBS 最高,DHS 居中,HBGC 最低。生态系统间 Rh/RE 的差异表现为:两个森林生态系统(CBS 和 DHS)间没有明显差别,约为 0.49,但显著小于 HBGC 的 0.60。Ra/RE 表现出相反的特征,即 HBGC 的数值为 0.40,明显小于 CBS 和 DHS 的 0.51。

表 3 典型生态系统的生态系统呼吸及其组分的年总量

Table 3 Annual total ecosystems respiration and its components in typical ecosystems					
站点 Sites	生态系统呼吸 RE /(gC m ⁻² a ⁻¹)	自养呼吸 Ra /(gC m ⁻² a ⁻¹)	异养呼吸 Rh /(gC m ⁻² a ⁻¹)	自养呼吸与生态系统 呼吸的比值 Ra/RE	异养呼吸与生态系统 呼吸的比值 Rh/RE
CBS	1098.70(74.24) a	563.26(41.42) a	535.40(35.02) a	0.51(0.01) a	0.49(0.01) b
DHS	859.40(85.80) b	434.54(34.69) b	424.86(52.19) b	0.51(0.01) a	0.49(0.01) b
HBGC	415.74(58.84) c	167.00(23.90) c	248.74(35.02) c	0.40(0.00) b	0.60(0.01) a

表中数据为 2003—2005 年的平均值,括号内数值为 2003—2005 年的标准差

3 讨论

3.1 生态系统呼吸拆分结果的不确定性

本研究采用的方法是 Schwalm 等^[20]对加拿大森林 RE 进行研究时提出的,目前尚没有在其他生态系统中应用。但相对于其他研究方法,本方法结构简单、可操作性强并具有一定的生态学理论基础。

理论上来说,当 NPP/GPP 保持恒定的比值时,Ra/RE 随着 NEP/RE 的增加而增大,即随着 NEP/RE 的增加,RE 中的 Rh 组分降低,从图 2 可知,Ra/RE 的变化与 NEP 的变化有相似的规律,这证实了该方法在理论上是可行的。

在理论分析的基础上,用静态箱-气相色谱法观测的 Rs 与本研究拆分得到的 Rh 作对比(图 3),以验证该方法的拆分效果。




图 3 生态系统呼吸及异养呼吸与土壤呼吸的关系

Fig.3 The relationship between ecosystem respiration, heterotrophic respiration and soil respiration

从图 3 可以看出,在 CBS,Rh 与 Rs 的比值为 0.34(图 3),这在之前研究结果^[38-39]的范围内,并与东北林

区其他研究^[40]相似。在 DHS 和 HBGC, R_h 与 R_s 间没有明显的关系。这是因为,在 CBS,利用箱式法观测的 R_s 是生态系统呼吸的一部分(图 3),可以反映 RE 的动态,但在 DHS 和 HBGC,箱式法观测到的 R_s 几乎与该时段的 RE 相一致,这可能是由箱式法本身观测的误差引起的。

进一步整理了已发表文献的 NPP 数据,结合涡度相关观测的碳通量结果,估算 RE 及其组分年总量间的相互关系。在 CBS,张娜等^[41]模拟发现,1995 年该生态系统 R_a/RE 高达 0.82,高于本研究结果(表 3),这可能是他们估算的 NEP 过高及 NPP 偏小导致的,NEP 值高达 $392 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ ^[41],比涡度相关观测结果^[34]高 54%。在 DHS,2003—2004 年的 NPP 为 $970 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ ^[42],结合 Yu 等^[34]的结果可以看到,这两年该生态系统的 R_a/RE 为 52.33%,与本研究结果(表 3)相似。

虽然 Piao 等^[11]总结已有研究结果^[1, 43-44]发现, R_a 与 GPP 的比值虽然表现出随着温度的增加先降低后增大,但具有较大的变异性,基于本研究的方法,CBS、DHS、HBGC 的 R_a/GPP 分别为 0.40、0.31、0.35,也在 Piao 等^[11]的范围之内。

因而,本研究所用方法具有简便易行、无需额外测定即可准确拆分 RE,这为分析碳收支组分及其影响因素提供了可能,可以在生态系统碳循环研究中应用。

3.2 生态系统呼吸拆分结果对 NPP/GPP 的敏感性

本研究将 NPP/GPP 的值设为 0.47—0.60,但 Litton 等^[43]整理文献数据发现,NPP/GPP 变异很大,最小甚至可能低于 0.20。因而有必要进一步分析 NPP/GPP 的变化对 RE 组分拆分的影响。

此处设定两个方案,即将 NPP/GPP(θ)的上下限(0.47—0.60)分别下调 0.10(方案 I)和上调 0.10(方案 II),相应的 $RE/NEP(\beta)$ 的临界比值发生改变(表 4)。

基于不同数据处理方案获得了生态系统呼吸组分相互关系的季节动态(图 4), R_a/RE 及 R_h/RE 的季节动态与图 2 没有明显差异,说明不同 NPP/GPP 的变化不会对 R_a/RE 及 R_h/RE 的季节动态产生明显影响。

不同数据处理方案下,生态系统呼吸组分在生态系统呼吸中所占的比例发生一定的波动(表 5),NPP/GPP 每改变 0.1, R_a/RE 变化 0.05, R_a/RE 随着 NPP/GPP 的增加而降低。

表 4 不同处理方案下 θ 值下的 β 范围

Table 4 β range under different θ in different treatments

方案 Treatment	θ 范围 θ Range	β 范围 β Range
I	(-1, -0.8)	(0.1, 0.126)
	(-0.8, 0.43)	(0.5(1+ θ), 0.63(1+ θ))
	[0.43, + ∞)	(0.715, 0.9)
II	(-1, -0.67)	(0.1, 0.14)
	(-0.67, 1.09)	(0.3(1+ θ), 0.43(1+ θ))
	[1.09, + ∞)	(0.627, 0.9)

表 5 不同数据处理方案生态系统呼吸组分在生态系统呼吸中所占比例

Table 5 The ratio of autotrophic respiration and heterotrophic respiration to ecosystem respiration (R_a/RE , R_h/RE) under different data treatments

处理 Treatment	自养呼吸与生态系统呼吸的比值 R_a/RE			异养呼吸与生态系统呼吸的比值 R_h/RE		
	长白山 CBS	鼎湖山 DHS	海北灌丛 HBGC	长白山 CBS	鼎湖山 DHS	海北灌丛 HBGC
本研究 This study	0.51(0.01)	0.51(0.01)	0.40(0.00)	0.49(0.01)	0.49(0.01)	0.60(0.01)
方案 I Treatment I	0.56(0.01)	0.55(0.01)	0.43(0.01)	0.44(0.01)	0.45(0.02)	0.57(0.01)
方案 II Treatment II	0.46(0.01)	0.45(0.01)	0.36(0.00)	0.54(0.01)	0.55(0.02)	0.64(0.00)

表中数据为 2003—2005 年的平均值,括号内数值为观测期间的标准差

生态系统间,不管 NPP/GPP 发生何种变化,HBGC 的 R_a/RE 均小于 CBS 和 DHS,并且该值始终小于 0.5,因而 HBGC 的生态系统呼吸以异养呼吸为主。随着 NPP/GPP 的变化,CBS 和 DHS 中 R_a/RE 在 0.5 上下浮动,表明森林生态系统中自养和异养呼吸所占的比例大致相似。

可见,NPP/GPP 影响着 RE 组分拆分,生物量调查获取的 NPP 将为生态系统碳通量组分的拆分提供重要基础数据。




图4 2003年不同NPP/GPP的典型生态系统的生态系统呼吸组分在生态系统呼吸中所占比例(R_h/RE , R_a/RE)的季节动态特征

Fig.4 Seasonal dynamics of the ratio of autotrophic respiration and heterotrophic respiration to ecosystem respiration (R_a/RE , R_h/RE) in typical ecosystems in 2003 with different NPP/GPP

3.3 生态系统呼吸各组分间的相互关系

在季节动态上, R_a/RE 随着 NEP 的增加有增大的趋势^[20], 表明随着植物生长的开始, 生态系统在不断固碳的基础上通过自养呼吸向外排放的碳量也在增加。这是因为 R_a 中的维持呼吸与温度相关, 随着温度的增加呈指数增加^[7]; 生长呼吸与温度没有直接关系, 但与 GPP 呈一定的比例关系^[8]; 而 R_h 受土壤温湿度和有机质含量的影响。因此, 在生长季开始后, 随着 GPP 和气温的增大, R_a 增加速度快于 R_h , 导致 R_a/RE 开始增加。

生态系统之间, R_a 年总量与 RE 年总量的比值也明显不同, 森林生态系统明显高于草地生态系统, 表明森林生态系统 R_a 所占比例高于草地生态系统, 与 Schwalm 等^[20]的结果相同。这是因为, 森林生态系统具有较高的 NEP, NEP/RE 也较高, 导致 R_a/RE 高。比较中国与加拿大森林生态系统间^[20]的 R_a/RE 的差异可以发现, 中国森林生态系统的 R_a/RE 明显高于加拿大森林生态系统, 这也是由中国森林生态系统中 NEP/RE 高于加拿大所决定的。

4 结论

基于 ChinaFLUX3 个陆地生态系统(CBS: 长白山温带混交林, DHS: 鼎湖山亚热带常绿阔叶林, HBGC: 海北高寒灌丛草甸)的涡度相关观测数据, 利用统计分析方法拆分了 RE 组分, 分析了该方法在中国陆地生态系统的适用性及对 NPP/GPP 的敏感性, 阐明了 RE 组分的动态特征及其相互关系。结果表明: 基于涡度相关观测数据及 NPP/GPP 的比值, 可以准确拆分中国典型生态系统的 RE, 但该方法对 NPP/GPP 较为敏感。3 个生态系统中, RE 及其组分年内均表现出单峰型的变化, 在生长旺盛时节(7 月份)达到最大值。异养呼吸在生态系统呼吸中所占的比例(R_h/RE)表现出明显的季节变化, CBS 表现出先增大后减小的季节特征, DHS 则常年维持为 0.5 左右, HBGC 表现出先降低后增大的特点。年总量上, R_h/RE 因生态系统的不同而不同, CBS 和

DHS 两个森林生态系统的自养和异养呼吸大致相当,HBGC 的碳排放则主要通过异养呼吸来实现。该方法可以拆分 RE 组分,进而为生态系统碳循环的过程研究提供参考数据,但今后应加强 NPP/GPP 的测定,以提高生态系统呼吸拆分的精度。

References:

- [1] Luyssaert S, Inglis I, Jung M, Richardson A D, Reichsteins M, Papale D, Piao S L, Schulzes E D, Wingate L, Matteucci G, Aragao L, Aubinet M, Beers C, Bernhofer C, Black K G, Bonal D, Bonnefond J M, Chambers J, Ciais P, Cook B, Davis K J, Dolman A J, Gielen B, Goulden M, Grace J, Granier A, Grelle A, Griffis T, Grunwald T, Guidolotti G, Hanson P J, Harding R, Hollinger D Y, Hutya L R, Kolar P, Kruijt B, Kutsch W, Lagergren F, Laurila T, Law B E, Le Maire G, Lindroth A, Loustau D, Malhi Y, Mateus J, Migliavacca M, Misson L, Montagnani L, Moncrieff J, Moors E, Munger J W, Nikinmaa E, Ollinger S V, Pita G, Rebmann C, Rouspard O, Saigusa N, Sanz M J, Seufert G, Sierra C, Smith M L, Tang J, Valentini R, Vesala T, Janssens I A. CO₂ balance of boreal, temperate, and tropical forests derived from a global database. *Global Change Biology*, 2007, 13(12): 2509-2537.
- [2] Davidson E A, Janssens I A, Luo Y Q. On the variability of respiration in terrestrial ecosystems: moving beyond Q₁₀. *Global Change Biology*, 2006, 12(2): 154-164.
- [3] Houghton R A, Davidson E A, Woodwell G M. Missing sinks, feedbacks, and understanding the role of terrestrial ecosystems in the global carbon balance. *Global Biogeochemical Cycles*, 1998, 12(1): 25-34.
- [4] Cox P M, Betts R A, Jones C D, Spall S A, Totterdell I J. Acceleration of global warming due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate model. *Nature*, 2000, 408(6809): 184-187.
- [5] Yuan W P, Luo Y Q, Li X L, Liu S G, Yu G R, Zhou T, Bahn M, Black A, Desai A R, Cescatti A, Marcolla B, Jacobs C, Chen J Q, Aurela M, Bernhofer C, Gielen B, Bohrer G, Cook D R, Dragoni D, Dunn A L, Gianelle D, Grünwald T, Ibrom A, Leclerc M Y, Lindroth A, Liu H P, Marchesini L B, Montagnani L, Pita G, Rodeghiero M, Rodrigues A, Starr G, Stoy P C. Redefinition and global estimation of basal ecosystem respiration rate. *Global Biogeochemical Cycles*, 2011, 25: GB4002, doi: 10.1029/2011gb004150.
- [6] Beer C, Reichstein M, Tomelleri E, Ciais P, Jung M, Carvalhais N, Rodenbeck C, Arain M A, Baldocchi D, Bonan G B, Bondeau A, Cescatti A, Lasslop G, Lindroth A, Lomas M, Luyssaert S, Margolis H, Oleson K W, Rouspard O, Veenendaal E, Viovy N, Williams C, Woodward F I, Papale D. Terrestrial gross carbon dioxide uptake: global distribution and covariation with climate. *Science*, 2010, 329(5993): 834-838.
- [7] Ryan M G. A simple method for estimating gross carbon budgets for vegetation in forest ecosystems. *Tree Physiology*, 1991, 9(1/2): 255-266.
- [8] Chen J M, Liu J, Cihlar J, Goulden M L. Daily canopy photosynthesis model through temporal and spatial scaling for remote sensing applications. *Ecological Modelling*, 1999, 124(2/3): 99-119.
- [9] Trumbore S. Carbon respired by terrestrial ecosystems-recent progress and challenges. *Global Change Biology*, 2006, 12(2): 141-153.
- [10] Yu G R. Scientific Frontier on Human Activities and Ecosystem Changes. Beijing: Higher Education Press, 2009.
- [11] Piao S L, Luyssaert S, Ciais P, Janssens I A, Chen A P, Cao C, Fang J Y, Friedlingstein P, Luo Y Q, Wang S P. Forest annual carbon cost: a global-scale analysis of autotrophic respiration. *Ecology*, 2010, 91(3): 652-661.
- [12] Irvine J, Law B E, Martin J G, Vickers D. Interannual variation in soil CO₂ efflux and the response of root respiration to climate and canopy gas exchange in mature ponderosa pine. *Global Change Biology*, 2008, 14(12): 2848-2859.
- [13] Nagy Z, Pintér K, Pavelka M, Darenová E, Balogh J. Carbon fluxes of surfaces vs. ecosystems: advantages of measuring eddy covariance and soil respiration simultaneously in dry grassland ecosystems. *Biogeosciences*, 2011, 8(9): 2523-2534.
- [14] Griffis T J, Black T A, Gaumont-Guay D, Drewitt G B, Nesic Z, Barr A G, Morgenstern K, Kljun N. Seasonal variation and partitioning of ecosystem respiration in a southern boreal aspen forest. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2004, 125(3/4): 207-223.
- [15] Law B E, Thornton P E, Irvine J, Anthoni P M, Van Tuyl S. Carbon storage and fluxes in ponderosa pine forests at different developmental stages. *Global Change Biology*, 2001, 7(7): 755-777.
- [16] Luyssaert S, Reichstein M, Schulze E D, Janssens I A, Law B E, Papale D, Dragoni D, Goulden M L, Granier A, Kutsch W L, Linder S, Matteucci G, Moors E, Munger J W, Pilegaard K, Saunders M, Falge E M. Toward a consistency cross-check of eddy covariance flux-based and biometric estimates of ecosystem carbon balance. *Global Biogeochemical Cycles*, 2009, 23: GB3009, doi: 10.1029/2008gb003377.
- [17] Tan Z H, Zhang Y P, Yu G R, Sha L Q, Tang J W, Deng X B, Song Q H. Carbon balance of a primary tropical seasonal rain forest. *Journal of Geophysical Research*, 2010, 115: D00H26, doi: 10.1029/2009jd012913.
- [18] Riveros-Iregui D A, Hu J, Burns S P, Bowling D R, Monson R K. An interannual assessment of the relationship between the stable carbon isotopic composition of ecosystem respiration and climate in a high-elevation subalpine forest. *Journal of Geophysical Research*, 2011, 116: G02005, doi: 10.1029/2010jg001556.
- [19] Schuur E A G, Trumbore S E. Partitioning sources of soil respiration in boreal black spruce forest using radiocarbon. *Global Change Biology*, 2006, 12(2): 165-176.
- [20] Schwalm C R, Black T A, Morgenstern K, Humphreys E R. A method for deriving net primary productivity and component respiratory fluxes from tower-based eddy covariance data: a case study using a 17-year data record from a Douglas-fir chronosequence. *Global Change Biology*, 2007, 13(2): 370-385.
- [21] Yu G R, Fu Y L, Sun X M, Wen X F, Zhang L M. Recent progress and future directions of ChinaFLUX. *Science in China Series D: Earth Sciences*, 2006, 49(Suppl II): 1-23.
- [22] Zhang J H, Yu G R, Han S J, Guan D X, Sun X M. Seasonal and annual variation of CO₂ flux above a broad-leaved Korean pine mixed forest.

- Science in China Series D: Earth Sciences, 2006, 49(Suppl II): 63-73.
- [23] Wang C L, Yu G R, Zhou G Y, Yan J H, Zhang L M, Wang X, Tang X L, Sun X M. CO₂ flux evaluation over the evergreen coniferous and broad-leaved mixed forest in Dinghushan, China. Science in China Series D: Earth Sciences, 2006, 49(Suppl II): 127-138.
- [24] Li Y N, Sun X M, Zhao X Q, Zhao L, Xu S X, Gu S, Zhang G F, Yu G R. Seasonal variations and mechanism for environmental control of NEE of CO₂ concerning the *Potentilla fruticosa* in alpine shrub meadow of Qinghai-Tibet Plateau. Science in China Series D: Earth Sciences, 2006, 49(Suppl II): 174-185.
- [25] Zheng Z M, Yu G R, Sun X M, Cao G M, Wang Y S, Du M Y, Li J, Li Y N. Comparison of eddy covariance and static chamber/gas chromatogram methods in measuring ecosystem respiration. Chinese Journal of Applied Ecology, 2008, 19(2): 290-298.
- [26] Lin L S, Han S J, Wang Y S, Gu Z J. Soil CO₂ flux in several typical forests of Mt. Changbai. Chinese Journal of Ecology, 2004, 23(5): 42-45.
- [27] Zhang D Q, Sun X M, Zhou G Y, Yan J H, Wang Y S, Liu S Z, Zhou C Y, Liu J X, Tang X L, Li J, Zhang Q M. Seasonal dynamics of soil CO₂ effluxes with responses to environmental factors in lower subtropical forests of China. Science in China Series D: Earth Sciences, 2006, 49(Suppl II): 139-149.
- [28] Reichstein M, Falge E, Baldocchi D, Papale D, Aubinet M, Berbigier P, Bernhofer C, Buchmann N, Gilmanov T, Granier A, Grunwald T, Havrankova K, Ilvesniemi H, Janous D, Knohl A, Laurila T, Lohila A, Loustau D, Matteucci G, Meyers T, Miglietta F, Ourcival J M, Pumpanen J, Rambal S, Rotenberg E, Sanz M, Tenhunen J, Seufert G, Vaccari F, Vesala T, Yakir D, Valentini R. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration; review and improved algorithm. Global Change Biology, 2005, 11(9): 1424-1439.
- [29] Law B E, Williams M, Anthoni P M, Baldocchi D D, Unsworth M H. Measuring and modelling seasonal variation of carbon dioxide and water vapour exchange of a *Pinus ponderosa* forest subject to soil water deficit. Global Change Biology, 2000, 6(6): 613-630.
- [30] Valentini R, Gamon J A, Field C B. Ecosystem ags-exchange in a California grassland-seasonal patterns and implications for scaling. Ecology, 1995, 76(6): 1940-1952.
- [31] Guan D X, Wu J B, Zhao X S, Han S J, Yu G R, Sun X M, Jin C J. CO₂ fluxes over an old, temperate mixed forest in northeastern China. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137(3/4): 138-149.
- [32] Barr A G, Black T A, Hogg E H, Griffis T J, Morgenstern K, Kljun N, Theede A, Nesic Z. Climatic controls on the carbon and water balances of a boreal aspen forest, 1994—2003. Global Change Biology, 2007, 13(3): 561-576.
- [33] Polley H W, Frank A B, Sanabria J, Phillips R L. Interannual variability in carbon dioxide fluxes and flux-climate relationships on grazed and ungrazed northern mixed-grass prairie. Global Change Biology, 2008, 14(7): 1620-1632.
- [34] Yu G R, Zhang L M, Sun X M, Fu Y L, Wen X F, Wang Q F, Li S G, Ren C Y, Song X, Liu Y F, Han S J, Yan J H. Environmental controls over carbon exchange of three forest ecosystems in eastern China. Global Change Biology, 2008, 14(11): 2555-2571.
- [35] Wen X F, Wang H M, Wang J L, Yu G R, Sun X M. Ecosystem carbon exchanges of a subtropical evergreen coniferous plantation subjected to seasonal drought, 2003—2007. Biogeosciences, 2010, 7(1): 357-369.
- [36] Wang X C, Wang C K, Yu G R. Spatio-temporal patterns of forest carbon dioxide exchange based on global eddy covariance measurements. Science in China Series D: Earth Sciences, 2008, 51(8): 1129-1143.
- [37] Lasslop G, Reichstein M, Detto M, Richardson A D, Baldocchi D D. Comment on Vickers et al.: self-correlation between assimilation and respiration resulting from flux partitioning of eddy-covariance CO₂ fluxes. Agricultural and Forest Meteorology, 2010, 150(2): 312-314.
- [38] Subke J A, Inglis I, Francesca Cotrufo M. Trends and methodological impacts in soil CO₂ efflux partitioning: a meta-analytical review. Global Change Biology, 2006, 12(6): 921-943.
- [39] Zhan X Y, Yu G R, Zheng Z M, Wang Q F. Carbon emission and spatial pattern of soil respiration of terrestrial ecosystems in China: based on geostatistic estimation of flux measurement. Progress in Geography, 2012, 31(1): 97-108.
- [40] Wang C K, Yang J Y. Rhizospheric and heterotrophic components of soil respiration in six Chinese temperate forests. Global Change Biology, 2007, 13(1): 123-131.
- [41] Zhang N, Yu G R, Zhao S D, Yu Z L. Carbon budget of ecosystem in Changbai Mountain natural reserve. Environmental Science, 2003, 24(1): 24-32.
- [42] Yan J H, Wang Y P, Zhou G Y, Zhang D Q. Estimates of soil respiration and net primary production of three forests at different succession stages in South China. Global Change Biology, 2006, 12(5): 810-821.
- [43] Litton C M, Raich J W, Ryan M G. Carbon allocation in forest ecosystems. Global Change Biology, 2007, 13(10): 2089-2109.
- [44] DeLucia E H, Drake J E, Thomas R B, Gonzalez-Meler M. Forest carbon use efficiency: is respiration a constant fraction of gross primary production?. Global Change Biology, 2007, 13(6): 1157-1167.

参考文献:

- [10] 于贵瑞. 人类活动与生态系统变化的前沿科学问题. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [25] 郑泽梅, 于贵瑞, 孙晓敏, 曹广民, 王跃思, 杜明远, 李俊, 李英年. 涡度相关法和静态箱/气相色谱法在生态系统呼吸观测中的比较. 应用生态学报, 2008, 19(2): 290-298.
- [26] 林丽莎, 韩士杰, 王跃思, 谷志静. 长白山四种林分土壤 CO₂ 释放通量的研究. 生态学杂志, 2004, 23(5): 42-45.
- [39] 展小云, 于贵瑞, 郑泽梅, 王秋凤. 中国区域陆地生态系统土壤呼吸的碳排放及空间格局——基于通量观测的地学统计评估. 地理科学进展, 2012, 31(1): 97-108.
- [41] 张娜, 于贵瑞, 赵士洞, 于振良. 长白山自然保护区生态系统碳平衡研究. 环境科学, 2003, 24(1): 24-32.

ACTA ECOLOGICA SINICA Vol.33, No.21 Nov., 2013 (Semimonthly)

CONTENTS

Frontiers and Comprehensive Review

- Gross ecosystem product: theory framework and case study OUYANG Zhiyun, ZHU Chunquan, YANG Guangbin, et al (6747)
- Advances in impacts of climate change on infectious diseases outbreak LI Guodong, ZHANG Junhua, JIAO Gengjun, et al (6762)
- Ecology of aerobic methane oxidizing bacteria (methanotrophs) YUN Juanli, WANG Yanfen, ZHANG Hongxun (6774)
- Nitrogen deposition and *Leymus chinensis* leaf chlorophyll content in Inner Mongolian grassland
..... ZHANG Yunhai, HE Nianpeng, ZHANG Guangming, et al (6786)
- Worldwide distribution and multivariate similarity clustering analysis of spiders
..... SHEN Xiaocheng, ZHANG Baoshi, ZHANG Feng, et al (6795)
- The influence of wind direction on pollen-mediated gene flow in transgenic insect-resistant cotton
..... ZHU Jialin, HE Juan, NIU Jianqun, et al (6803)

Autecology & Fundamentals

- Ecological characteristics of benthic diatoms, protozoa and meiobenthos in the sediments of the Changjiang Estuary and East China
Sea in spring MENG Zhaoxui, XU Kuidong (6813)
- Macrobenthic functional groups at the reclamation and natural tidal flats of Hengsha East Shoal, the Estuary of Changjiang River
..... LV Weiwei, MA Chang'an, YU Ji, et al (6825)
- Enrichment and ecological risk of heavy metal in soils and dominant plants in the riparian of the Fenghe River
..... YANG Yang, ZHOU Zhengchao, WANG Huanhuan, et al (6834)
- Effects of salinity and exogenous substrates on the decomposition and transformation of soil organic carbon in the Yellow River
Delta LI Ling, QIU Shaojun, TAN Feifei, et al (6844)
- Effects of short-term dark chilling on leaves carbon and nitrogen metabolism and involved activities of enzymes in mangrove *Kandelia
obovata* seedling ZHENG Chunfang, LIU Weicheng, CHEN Shaobo, et al (6853)
- Preliminary evaluation on tolerance to phosphorous deficiency of 32 cultivars of cut chrysanthemum
..... LIU Peng, CHEN Sumei, FANG Weimin, et al (6863)
- Effects of age and environmental conditions on accumulation of heavy-metals Cd and Cu in *Tegillarca granosa*
..... WANG Zhaogen, WU Hongxi, CHEN Xiaoxiao, et al (6869)
- Effects of Chinese gallnut on photosynthetic characteristics and total nitrogen content of *Rhus chinensis*
..... LI Yang, YANG Zixiang, CHEN Xiaoming, et al (6876)
- The characterization of glyphosate degradation by *Burkholderia multivorans* WS-FJ9 LI Guanxi, WU Xiaoqin, YE Jianren (6885)
- Electroantennographic and behavioural responses of scarab beetles to *Ricinus communis* leaf volatiles
..... LI Weizheng, YANG Lei, SHEN Xiaowei, et al (6895)

Population, Community and Ecosystem

- Ecosystem health assessment in Baiyangdian Lake XU Fei, ZHAO Yanwei, YANG Zhifeng, et al (6904)
- Characteristics of macrobenthic communities in mangrove wetlands along the waterways of North Hezhou, Zhuhai, South China
..... WANG Hui, ZHONG Shan, FANG Zhanqiang (6913)
- The interaction between components of ecosystem respiration in typical forest and grassland ecosystems
..... ZHU Xianjin, YU Guirui, WANG Qiufeng, et al (6925)
- Effects of thinning on macro fungi and their relationship with litter decomposition in *Pinus tabulaeformis* plantations
..... CHEN Xiao, BAI Shulan, LIU Yong, et al (6935)

- Beta diversity of plant communities in Baishanzu Nature Reserve TAN Shanshan, YE Zhenlin, YUAN Liubin, et al (6944)
- Effect of Oxytetracycline (OTC) on the activities of enzyme and microbial community metabolic profiles in composting
..... CHEN Zhixue, GU Jie, GAO Hua, et al (6957)

Landscape, Regional and Global Ecology

- Variations in leaf anatomy of *Larix gmelinii* reflect adaptation of its photosynthetic capacity to climate changes
..... JI Zijing, QUAN Xiankui, WANG Chuankuan (6967)
- The studying of key ecological factors and threshold of landscape evolution in Yancheng Coastal wetland
..... ZHANG Huabing, LIU Hongyu, LI Yufeng, et al (6975)
- Eco-physiological response of *Phragmites communis* to water table changes in the Horqin Sand Land
..... MA Yunhua, ZHANG Tonghui, LIU Xinping (6984)
- Improvement of snowmelt implementation in the SWAT hydrologic model ... YU Wenjun, NAN Zhuotong, ZHAO Yanbo, et al (6992)
- Responses of lake fluctuation to climate change in Horqin Sandy Land
..... CHANG Xueli, ZHAO Xueyong, WANG Wei, et al (7002)
- Water ecology and fractal characteristics of soil particle size distribution of three typical vegetations in Shell Island
..... XIA Jiangbao, ZHANG Shuyong, WANG Rongrong, et al (7013)
- Spatio-temporal distribution of epilithic algal chlorophyll a in relation to the physico-chemical factors of Gufu River in Three Gorges Reservoir WU Shuyuan, GE Jiwen, MIAO Wenjie, et al (7023)

Resource and Industrial Ecology

- Graphic analysis of spatio-temporal effect for vegetation disturbance caused by coal mining: a case of Datong Coal Mine Area
..... HUANG Yi, WANG Yunjia, LI Xiaoshun, et al (7035)

《生态学报》2014 年征订启事

《生态学报》是由中国科学技术协会主管,中国生态学学会、中国科学院生态环境研究中心主办的生态学高级专业学术期刊,创刊于 1981 年,报道生态学领域前沿理论和原始创新性研究成果。坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,依靠和团结广大生态学科工作者,探索生态学奥秘,为生态学基础理论研究搭建交流平台,促进生态学研究深入发展,为我国培养和造就生态学科人才和知识创新服务、为国民经济建设和发展服务。

《生态学报》主要报道生态学及各分支学科的重要基础理论和应用研究的原始创新性科研成果。特别欢迎能反映现代生态学发展方向的优秀综述性文章;研究简报;生态学新理论、新方法、新技术介绍;新书评价和学术、科研动态及开放实验室介绍等。

《生态学报》为半月刊,大 16 开本,280 页,国内定价 90 元/册,全年定价 2160 元。

国内邮发代号:82-7,国外邮发代号:M670

标准刊号:ISSN 1000-0933 CN 11-2031/Q

全国各地邮局均可订阅,也可直接与编辑部联系购买。欢迎广大科技工作者、科研单位、高等院校、图书馆等订阅。

通讯地址:100085 北京海淀区双清路 18 号 电 话:(010)62941099; 62843362

E-mail: shengtaixuebao@rcees.ac.cn 网 址: www.ecologica.cn

本期责任副主编 余新晓

编辑部主任 孔红梅

执行编辑 刘天星 段 靖

生 态 学 报

(SHENGTAI XUEBAO)

(半月刊 1981 年 3 月创刊)

第 33 卷 第 21 期 (2013 年 11 月)

ACTA ECOLOGICA SINICA

(Semimonthly, Started in 1981)

Vol. 33 No. 21 (November, 2013)

编 辑	《生态学报》编辑部 地址:北京海淀区双清路 18 号 邮政编码:100085 电话:(010)62941099 www.ecologica.cn shengtaixuebao@rcees.ac.cn	Edited by	Editorial board of ACTA ECOLOGICA SINICA Add: 18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China Tel: (010)62941099 www.ecologica.cn shengtaixuebao@rcees.ac.cn
主 编	王如松	Editor-in-chief	WANG Rusong
主 管	中国科学技术协会	Supervised by	China Association for Science and Technology
主 办	中国生态学学会 中国科学院生态环境研究中心 地址:北京海淀区双清路 18 号 邮政编码:100085	Sponsored by	Ecological Society of China Research Center for Eco-environmental Sciences, CAS Add: 18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China
出 版	科 学 出 版 社 地址:北京东黄城根北街 16 号 邮政编码:100717	Published by	Science Press Add: 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China
印 刷	北京北林印刷厂	Printed by	Beijing Bei Lin Printing House, Beijing 100083, China
发 行	科 学 出 版 社 地址:东黄城根北街 16 号 邮政编码:100717 电话:(010)64034563 E-mail: journal@cspg.net	Distributed by	Science Press Add: 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China Tel: (010)64034563 E-mail: journal@cspg.net
订 购	全国各地邮局	Domestic	All Local Post Offices in China
国外发行	中国国际图书贸易总公司 地址:北京 399 信箱 邮政编码:100044	Foreign	China International Book Trading Corporation Add: P.O.Box 399 Beijing 100044, China
广告经营 许 可 证	京海工商广字第 8013 号		



ISSN 1000-0933
CN 11-2031/Q

国内外公开发行

国内邮发代号 82-7

国外发行代号 M670

定价 90.00 元