


ISSN 1000-0933  
CN 11-2031/Q

# 生态学报

## Acta Ecologica Sinica



第33卷 第16期 Vol.33 No.16 **2013**

中国生态学学会  
中国科学院生态环境研究中心  
科学出版社

主办  
出版



中国科学院科学出版基金资助出版

# 生态学报

(SHENGTAI XUEBAO)

第 33 卷 第 16 期 2013 年 8 月 (半月刊)

## 目 次

### 前沿理论与学科综述

- 物种分布模型理论研究进展..... 李国庆,刘长成,刘玉国,等 (4827)
- 稀土元素对农田生态系统的影响研究进展..... 金姝兰,黄益宗 (4836)
- 藤壶金星幼虫附着变态机制 ..... 饶小珍,林 岗,许友勤 (4846)
- 群居动物中的共同决策..... 王程亮,王晓卫,齐晓光,等 (4857)

### 个体与基础生态

- 季风进退和转换对中国褐飞虱迁飞的影响..... 包云轩,黄金颖,谢晓金,等 (4864)
- 两种海星对三种双壳贝类的捕食选择性和摄食率..... 齐占会,王 珺,毛玉泽,等 (4878)
- 新疆巴音布鲁克繁殖期大天鹅的生境选择..... 董 超,张国钢,陆 军,等 (4885)
- 我国特有植物青檀遗传结构的 ISSR 分析 ..... 李晓红,张 慧,王德元,等 (4892)
- 栽培菊花与菊属-近缘属属间杂种杂交后代耐盐性的遗传分析 ..... 许莉莉,陈发棣,陈素梅,等 (4902)
- 荒漠区植物光合器官解剖结构对水分利用效率的指示作用..... 张海娜,苏培玺,李善家,等 (4909)
- 水分对番茄不同叶龄叶片光合作用的影响..... 陈凯利,李建明,贺会强,等 (4919)
- 广西猫儿山不同海拔常绿树种和落叶树种光合速率与氮的关系 ..... 白坤栋,蒋得斌,万贤崇 (4930)
- 施肥对板栗林地土壤 N<sub>2</sub>O 通量动态变化的影响 ..... 张蛟蛟,李永夫,姜培坤,等 (4939)
- 施肥对红壤水稻土团聚体分布及其碳氮含量的影响..... 刘希玉,王忠强,张心昱,等 (4949)

### 种群、群落和生态系统

- 大兴安岭天然沼泽湿地生态系统碳储量..... 牟长城,王 彪,卢慧翠,等 (4956)
- 基于多时相 Landsat TM 影像的汶川地震灾区河岸带植被覆盖动态监测——以岷江河谷映秀-汶川段  
为例 ..... 许积层,唐 斌,卢 涛 (4966)
- 不同强度火干扰下盘古林场天然落叶松林的空间结构..... 倪宝龙,刘兆刚 (4975)
- 长江中下游湖群大型底栖动物群落结构及影响因素..... 蔡永久,姜加虎,张 路,等 (4985)
- 千岛湖岛屿社鼠的种群年龄结构和性比..... 张 旭,鲍毅新,刘 军,等 (5000)
- 性信息素诱捕下害虫 Logistic 增长及经济阈值数学模型 ..... 赵志国,荣二花,赵志红,等 (5008)
- 秋末苏南茶园昆虫的群落组成及其趋色性..... 郑颖姘,钮羽群,崔桂玲,等 (5017)
- 北方常见农业土地利用方式对土壤螨群落结构的影响 ..... 韩雪梅,李丹丹,梁子安,等 (5026)

### 景观、区域和全球生态

- 基于鸟类边缘种行为的景观连接度研究——空间句法的反规划应用..... 杨天翔,张韦倩,樊正球,等 (5035)
- 西南高山地区土壤异养呼吸时空动态..... 张远东,庞 瑞,顾峰雪,等 (5047)

江苏省土壤有机质变异及其主要影响因素..... 赵明松,张甘霖,李德成,等 (5058)

基于林业清查资料的桂西北植被碳空间分布及其变化特征..... 张明阳,罗为检,刘会玉,等 (5067)

### 资源与产业生态

基于能值分析方法的都市代谢过程——案例研究 ..... 刘耕源,杨志峰,陈彬 (5078)

基于 PSR 模型的耕地生态安全物元分析评价 ..... 张锐,郑华伟,刘友兆 (5090)

保水剂对煤矸石基质上高羊茅生长及营养吸收的影响 ..... 赵陟峰,王冬梅,赵廷宁 (5101)

### 城乡与社会生态

生态保护价值的距离衰减性——以三江平原湿地为例..... 敖长林,陈瑾婷,焦扬,等 (5109)

### 研究简报

广东山区土壤有机碳空间变异的尺度效应..... 姜春,吴志峰,钱乐祥,等 (5118)

室内养殖雌性松鼠秋季换毛期被毛长度和保温性能变化..... 荆璞,张伟,华彦,等 (5126)

期刊基本参数:CN 11-2031/Q \* 1981 \* m \* 16 \* 306 \* zh \* P \* ¥90.00 \* 1510 \* 32 \* 2013-08



**封面图说:** 高寒草甸牦牛群——三江源区位于青藏高原腹地,平均海拔 4200m,是长江、黄河、澜沧江三条大河的发源地,也是全球气候变化最敏感的地区。三江源区高寒草甸植被状况对该区的生态环境、草地资源合理利用和应对全球气候变化具有十分重要的意义。2005 年以来,国家投资 70 多亿元启动三江源生态保护工程。监测显示,近年来,三江源湖泊湿地面积逐步扩大,植被覆盖度得到提高,三江源区高寒草甸的生态恶化趋势得到遏制。图为冒着风雪在三江源高寒草甸上吃草的牦牛群。

彩图及图说提供: 陈建伟教授 北京林业大学 E-mail: cites.chenjw@163.com

DOI: 10.5846/stxb201209041252

姜春, 吴志峰, 钱乐祥, 文雅, 邓南荣. 广东山区土壤有机碳空间变异的尺度效应. 生态学报, 2013, 33(16): 5118-5125.

Jiang C, Wu Z F, Qian L X, Wen Y, Deng N R. Scaling effect on spatial variation of soil organic carbon in mountainous areas of Guangdong Province. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(16): 5118-5125.

## 广东山区土壤有机碳空间变异的尺度效应

姜 春<sup>1,2,3,4</sup>, 吴志峰<sup>1</sup>, 钱乐祥<sup>1,\*</sup>, 文 雅<sup>5</sup>, 邓南荣<sup>3</sup>

(1. 广州大学地理科学学院, 广州 510006; 2. 中国科学院广州地球化学研究所, 广州 510640;

3. 广东省生态环境与土壤研究所, 广州 510650; 4. 中国科学院大学, 北京 100049;

5. 华南农业大学信息学院, 广州 510642)

**摘要:** 研究土壤有机碳的尺度效应能够为区域生态环境保护和确定合理的土壤取样间距提供科学依据。采用土壤类型法估算了广东山区表层(0—20 cm)和全剖面(0—100 cm)土壤有机碳密度, 选择 4 条采样带, 获取采样间距为 250 m 的土壤有机碳密度序列, 并利用离散小波变换工具对其进行多尺度分解, 得到  $2 \times 250$  m、 $2^2 \times 250$  m、 $2^3 \times 250$  m、 $2^4 \times 250$  m、 $2^5 \times 250$  m 和  $2^6 \times 250$  m 6 个分解尺度上的小波信息, 计算小波信息方差。结果表明: 土壤有机碳密度具有较强的空间异质性, 其空间异质性的强弱受控于不同尺度下土壤有机碳密度分布格局的主导因子影响程度; 整体上在大于等于 1 km 的尺度, 其空间异质性较强; 各个样带特征尺度的差异与各样带的土壤和植被类型、地貌特征以及土地利用方式、耕作管理方式等人类活动干扰强度有关。

**关键词:** 土壤有机碳; 空间变异; 尺度效应; 小波变换; 广东山区

## Scaling effect on spatial variation of soil organic carbon in mountainous areas of Guangdong Province

JIANG Chun<sup>1,2,3,4</sup>, WU Zhifeng<sup>1</sup>, QIAN Lexiang<sup>1,\*</sup>, WEN Ya<sup>5</sup>, DENG Nanrong<sup>3</sup>

1 School of Geographical Sciences, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China

2 Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China

3 Guangdong Institute of Eco-environment and Soil Sciences, Guangzhou 510650, China

4 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

5 College of Informatics, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China

**Abstract:** Understanding the scaling effect on the spatial variation of soil organic carbon (SOC) is necessary for regional eco-environmental protection and for determination of reasonable soil sampling intervals. The objective of this study was to characterize the scaling effect on the spatial variation of SOC using wavelet multi-analysis techniques. This study was based on data from 223 typical soil profiles that were derived from the second national soil survey data from Guangdong Province. The soil profile data included soil types, soil organic matter (SOM) content, soil bulk density, soil depth and area. We estimated SOC density from depths of 20 cm and 100 cm in mountainous areas of Guangdong Province, and then developed an SOC density map with a grid size of 250 m by using the soil type map (1:200000). In detail, we selected four spatial sampling transects, which comprised two horizontal transects with a grid size of 250 m from 24° 50' N to 24° N latitude, and two left-oblique transects with a grid size of 250 m from 111° E to 114° E longitude, and from 115° E to 116° E longitude. These four transects reflect the general characteristics of the study area. By using the method of discrete wavelet

**基金项目:** 国家自然科学基金项目(41171446); 国家科技支撑计划项目(2012BAH32B03); 省部共建黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室开放基金项目(GTYR2011001)

收稿日期: 2012-09-04; 修订日期: 2013-05-13

\* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: qian-lx@163.com

transform (DWT) on the spatial sampling data of SOC density along the above four transects, we derived wavelet approximate information and wavelet detailed information over six different scales of  $2 \times 250$  m (0.5 km),  $2^2 \times 250$  m (1 km),  $2^3 \times 250$  m (2 km),  $2^4 \times 250$  m (4 km),  $2^5 \times 250$  m (8 km) and  $2^6 \times 250$  m (16 km) respectively. The descriptive statistical characteristics of SOC density were tabulated, and then we calculated the variance of the wavelet detailed information of SOC density, which can then represent the magnitude of variation in SOC density. The results showed the following. (1) On the whole, the spatial heterogeneity of SOC density was strong and varied with different transects and soil depth, which was controlled by dominant influence factors on different scales. (2) The overall optimum scale of grid size on which SOC had the maximum spatial heterogeneity was equal to or greater than 1 km. (3) The variation of different scales of each transect varied with soil type and vegetation type, geomorphologic characteristics, human activities (e. g. land use, cultivation management) and other influencing factors. In summary, this study provided a reference for the application of discrete wavelet transform to the spatial variation of SOC density on large regional scales, and made the analysis of SOC variation patterns more convenient.

**Key Words:** soil organic carbon; spatial variation; scaling effect; wavelet transform; mountainous areas of Guangdong Province

空间变异及其尺度效应在地理学、生态学、水文学和土壤学等学科领域都具有非常重要的地位,已经成为当前各学科研究的热点之一<sup>[1-5]</sup>。

关于土壤有机碳空间变异的尺度效应研究,目前主要集中在农田或果园等小区域土壤有机碳/有机质空间变异的尺度效应以及区域尺度和国家尺度间的对比分析方面,研究方法也多采用传统的数理统计分析、空间自相关分析、半方差分析、GIS 模型中的地统计分析等<sup>[6-10]</sup>。近年来,小波分析凭借其能够有效处理非平稳信号的优势被较多地应用到地学和生态学中,试图揭示自然或生态因子的多尺度格局<sup>[11-12]</sup>。G. Katul 等<sup>[13]</sup>应用 Haar 小波对碳、水和热等地表通量参数分别从秒到小时、小时到天以及周到年 3 个时间尺度上进行了分析。李双成等<sup>[14]</sup>通过小波变换揭示了西藏高原生态系统的(NDVI)与地形因子的多尺度空间格局和相关性。李小梅等<sup>[2,15]</sup>利用小波多尺度分析工具分析了福州市 NDVI 和地形因子等生态环境参数的尺度—格局特征以及生态环境参数相关关系的尺度响应。赵则海等<sup>[16]</sup>利用离散小波变换分析了北京东灵山地区辽东栎林样带中的土壤 pH 值、含水量和有机质这 3 个主要土壤因子指标沿山下到山顶样带梯度的不同分解水平上的变化规律。Bingcheng Si 等<sup>[11]</sup>利用小波分析研究了土壤水力特性和物理特性相关关系的尺度效应,并综述了小波分析法在土壤学中的应用。Qiaosheng Shu 等<sup>[17]</sup>以辽宁省阜新市一农田示范区作为研究区,利用连续小波变换研究得出了土壤水力特性和物理特性之间的相关性依赖于尺度和空间位置。Asim Biswas<sup>[18]</sup>等综述了连续小波变换在土壤空间变异研究中的应用,揭示了土壤属性的尺度和位置依赖性。

综上所述,目前小波分析多应用在生态环境的尺度研究中,利用小波分析研究土壤性质的尺度效应方面,多是集中在小区域土壤水力特性和物理特性相关关系的尺度效应研究以及土壤因子的多尺度变化规律上,而在省域这种大范围内来研究土壤有机质/有机碳空间变异的尺度效应至今还未见报道。基于此,本文以广东山区为例,采用土壤类型法估算了研究区域的土壤有机碳密度,并以此作为研究对象,选择 4 条样带,利用小波分析技术对土壤有机碳密度进行多尺度分解,以期在栅格尺度上定量揭示土壤有机碳密度的多尺度空间分布格局,既有助于区域的碳循环研究,也为确定合理的土壤取样间距和广东山区生态环境保护与资源可持续利用研究提供科学依据。

## 1 研究区和数据源

### 1.1 研究区概况

广东省政府采用以县域为单位,认为山区和丘陵面积占全县总面积 70% 以上的为山区县,按这一标准,广东省共有 50 个山区县(市),即本文的研究区域(图 1)。广东山区东起莲花山,西至云开大山,北部为南岭

山地,南部包括部分沿海丘陵台地,主要分布在粤北、粤东和粤西北,位于北纬  $21^{\circ}42'$ — $25^{\circ}31'$ ,东经  $110^{\circ}32'$ — $117^{\circ}11'$ 。地处中亚热带和南亚热带季风气候区,夏季多台风暴雨,冬春季有冷空气入侵。地势北高南低,地貌形态复杂,山地丘陵广布,山谷相间排列。植被类型主要为南亚热带常绿季雨林、中亚热带常绿阔叶林、亚热带草坡及人工杉林、松林等,由于人类活动的长期影响,原生的季雨林和常绿阔叶林已极少存在,大部分已变成针叶林、针阔混交林、稀树灌丛草坡、人工植被或次生林。土壤类型主要为地带性赤红壤和红壤及人为土壤水稻土<sup>[19]</sup>。

## 1.2 数据源概况

本研究以广东省 1:20 万土壤类型图、广东山区行政边界图及第二次土壤普查得到的 223 个典型土种剖面作为基础数据源,采用土壤类型法估算了研究区域以土属为基本单位的土壤有机碳密度<sup>[20-21]</sup>。为了满足研究的需要,通过土属标识码,分别以 20 cm 和 100 cm 深度土属有机碳密度作为属性,绘制了栅格大小为 250 m×250 m 的广东山区土壤有机碳密度空间分布图(图 2 和图 3)。




图 2 0—20 cm 土壤有机碳密度分布图

Fig. 2 The distribution of SOC density (0—20cm)




图 1 研究区域位置和范围示意图

Fig. 1 The scheme of study area's location and scope




图 3 0—100 cm 土壤有机碳密度分布图

Fig. 3 The distribution of SOC density (0—100cm)

SOC (Soil Organic Carbon) 为土壤有机碳

## 2 研究方法

### 2.1 样带剖面数据的提取

为了使得根据样带提取出的总的像元能够近似反映出研究区的总体特征,本文在选择经纬度采样法的同时还考虑了研究区的地貌、气候和形态特征:地貌形态复杂,地处中亚热带和南亚热带两个季风气候区,呈由南而北突的人字形条带。因此,分别沿  $24^{\circ}50'N$  和  $24^{\circ}N$  设置了间距为 250 m 的纬度采样带 1 和样带 2,分别沿  $111^{\circ}$ — $114^{\circ}$  和  $115^{\circ}$ — $116^{\circ}$  设置了间距为 250 m 的经度倾斜样带 3 和样带 4,如图 4 所示。在 ArcGIS9.2 软件的支持下,得到土壤有机碳密度在 4 条样带上一维空间数据序列。

### 2.2 小波多尺度分析—离散小波变换

#### 2.2.1 小波多尺度分析的基本原理

小波多尺度分析是通过构造小波基进行时间(空间)和频率变换,通过伸缩平移运算对时间(空间)序列进行多尺度分析,最终达到高频处时间(空间)细分,低频处频率细分,能自动适应时间(空间)序列分析的要求,因此它是时间(空间)序列尺度特性的强大分析工具,具体实现过程如下:

对于一组在位置  $x_i (i = 1, 2, \dots, M)$  处的空间序列  $y_i$ , 小波变换可以表示为:

$$W(s, \tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(x) \overline{\varphi_{s, \tau}(x)} dx \quad (1)$$

$$\varphi_{s, \tau}(x) = \frac{1}{\sqrt{s}} \varphi_{s, \tau}\left(\frac{x - \tau}{s}\right) \quad (2)$$

式中,  $\varphi(x)$  为被称之为小波的函数,  $s$  为小波函数  $\varphi(x)$  的扩张或收缩因子, 即尺度因子,  $\tau$  为  $\varphi(x)$  在时间或空间上的转化或迁移, 即平移因子, 待基本小波与待分析函数经过以上运算之后, 可分解得到不同尺度下的小波系数<sup>[11]</sup>。

### 2.2.2 空间变异的尺度效应的量度——小波方差

本文选择小波方差来度量土壤有机碳密度空间变异的尺度效应, 它表示土壤有机碳密度的空间采样序列在给定尺度的小波分解下小波细节信息离开平均位置的量度, 用来检验全局结构, 某一尺度的小波方差越大, 表示该尺度上结构信息越丰富, 空间异质性越强, 可以揭示特征尺度, 即指能够描述土壤有机碳密度空间异质性的最佳采样间距。具体做法为:

设  $W(a, b)$  为信号  $f(n)$  在尺度  $a$ , 位置  $b$  上的小波变换系数, 参照文献<sup>[2]</sup>, 尺度  $a$  下的小波方差可以定义为:

$$V(a) = \frac{1}{n} \sum_{b=1}^n |W(a, b)|^2 \quad (3)$$

式中,  $n$  为样带序列的总样本数。

## 3 结果与分析

### 3.1 各样带土壤有机碳密度的描述性统计特征

4 条采样带 6195 个样本土壤有机碳密度的描述性统计特征如表 1。由表 1 可知, 在原始尺度下, 4 条样带两种剖面深度的土壤有机碳密度具有不同的统计特征, 均值和标准差随样带和深度表现出了一定的差异, 这与 4 条样带的自然地理景观特征有关; 由均值和标准差计算得到的变异系数最小为 24.5%, 最大为 40.3%, 表明了土壤有机碳密度具有较强的空间变异性。

表 1 土壤有机碳(SOC)密度描述性统计特征

Table 1 Descriptive statistical characteristics of SOC density

土壤深度/cm Soil depth	描述特性 Descriptive characteristics	SOC 密度 SOC density/(tC/hm <sup>2</sup> )			
		样带 1 Transect 1 N=912	样带 2 Transect 2 N=2060	样带 3 Transect 3 N=2118	样带 4 Transect 4 N=1105
0—20	最小值	0.83	0.98	0.64	1.13
	最大值	74.77	74.77	75.01	74.77
	平均值	51.76	34.5	36.4	31.3
	标准差	14.448	11.875	11.625	10.687
0—100	最小值	1.8	2.48	2.19	8.1
	最大值	186.11	253.65	437.67	519.97
	平均值	125.61	97.71	99.95	96.21
	标准差	33.277	28.414	25.594	38.785

SOC: 土壤有机碳 Soil organic carbon




图 4 研究区域样带位置图

Fig. 4 The transects' location map of study area

### 3.2 土壤有机碳密度的 DB6 小波分解的意义

小波分析可分为连续小波变换(CWT)和离散小波变换(DWT), 离散小波变换被认为是对二进连续小波

的亚采样,并且从连续小波减弱到离散小波没有任何信息损失<sup>[18]</sup>,本文采用一维离散小波变换对土壤有机碳密度样带序列进行尺度分解,小波母函数选择在小波分析中常用的 DB6,算法采用 Mallat 算法,是通过调节尺度因子对信号实施由细至粗的分解和由粗至细的重构,分别对应分解后的细节信息( $d_j$ )和近似信息( $a_j$ ),两者之和等于原始信息<sup>[2]</sup>。分解级别选择 6 级,认为这个级别基本已达到分解末端<sup>[22]</sup>,6 级分解尺度对应的栅格大小分别为  $2 \times 250 \text{ m} \times 250 \text{ m}$ 、 $2^2 \times 250 \text{ m} \times 250 \text{ m}$ 、 $2^3 \times 250 \text{ m} \times 250 \text{ m}$ 、 $2^4 \times 250 \text{ m} \times 250 \text{ m}$ 、 $2^5 \times 250 \text{ m} \times 250 \text{ m}$  和  $2^6 \times 250 \text{ m} \times 250 \text{ m}$ ,即对应的采样间距分别为 0.5、1、2、4、8、16 km。算法的实现过程均在 Matlab7.0 软件中通过编程实现。

下面以样带 1 为例,分别给出了 0—20 cm 土壤有机碳密度的原始信息及经过 6 级分解后的近似信息和细节信息,如图 5—图 7 所示,并对其生态学意义进行了阐释。




图 5 0—20 cm 土壤有机碳密度原始信息变化情况

Fig. 5 The change of original SOC density (0—20cm)




图 6 0—20 cm 土壤有机碳密度小波分解后的近似信息

Fig. 6 The approximate information of decomposed original SOC density (0—20cm)

图 6 中,横坐标表示采样序列的位置,纵坐标表示土壤有机碳密度在各分解尺度下的近似信息,结合图 5 中其原始采样数据序列特征,不难发现,近似信息表示土壤有机碳密度沿着采样带随地理位置的变化而变化的拟合原始信息的部分,随着尺度的增大,近似信息去掉了由干扰因素造成的部分变化明显的噪声值(细节信息),而保留了原信息的主要成分。每一次尺度上推,近似信息的空间单元尺度(对应为本文中的土壤采样间距)会放大 2 倍,同时其原来尺度上两个单元内的信息差被分解到小波细节信息中去,两个相邻单元之间






图 7 0—20 cm 土壤有机碳密度小波分解后的细节信息

Fig. 7 The detailed information of decomposed original SOC density (0—20cm)

的近似信息就出现了平滑和近似,其变化规律也趋于清晰和简单化<sup>[2,16]</sup>,能够较为直观地反映出土壤有机碳密度在样带中的总体变化规律。

图 7 中,细节信息从原始信号中分解出来,代表了各个分解尺度上近似信息的“噪声”部分,反映了土壤有机碳密度在样带不同空间位置的波动变化情况。某个区域的波动变化越大,则反映了该区域土壤有机碳密度变化越复杂,受到其它因素干扰的强度越大。由于尺度效应的影响,细节信息在不同尺度上可以识别到土壤有机碳密度的空间异质性情况,通过细节信息方差-尺度图可以直观地表现出土壤有机碳密度的空间异质性格局—尺度响应特征。

### 3.3 尺度效应分析

根据土壤有机碳密度经过多尺度分解后的细节重构信息和小波方差的计算公式 2,在 Excel 软件中通过插入函数运算可以得到其在不同样带的小波方差-尺度图,横轴表示尺度,如 3.2 节所述,各尺度对应的采样间距分别为 0.5、1、2、4、8、16 km;纵轴表示土壤有机碳密度在不同尺度上的小波方差,如图 8 所示。




图 8 表层(0—20 cm)和全剖面(0—100 cm)土壤有机碳密度的小波方差—尺度图

Fig. 8 Comparison of wavelet variance-scale of SOC density (0—20cm and 0—100cm)

由图 8 可知,小波细节信息方差随尺度的增大而表现出不同的特征。首先来看 0—20 cm 土壤有机碳密度在各条样带上的空间异质性-尺度效应:0—20 cm 土壤有机碳密度在不同尺度上具有不同的空间异质性,不同样带的土壤有机碳密度随着尺度的增大变异程度不同;样带 1 和样带 4 土壤有机碳密度随尺度增大异质性

增强,在 16 km 尺度异质性最强;样带 2 和样带 3 土壤有机碳密度分别在 8 km 和 4 km 尺度异质性最大;从整体区域来看,样带 1 和样带 4 比样带 2 和样带 3 具有更大的变异程度。再来看 0—100 cm 土壤有机碳密度的空间异质性-尺度响应特征:样带 1 在 2 km 尺度出现一个拐点,然后随着尺度增大,异质性增强;样带 2 和样带 3 的土壤有机碳密度在不同尺度上变异性不是太大,在 8 km 尺度异质性最强;样带 4 在 1 km 尺度表现了最大的空间异质性,其后呈现随尺度增大而略微减小的趋势,具有不太显著的尺度效应。

土壤有机碳的空间变异是由气候、植被、土壤类型、地形、母质以及土地利用方式等各种因素在不同方向、不同尺度共同作用的结果<sup>[7-8]</sup>,空间异质性大小的尺度效应受控于不同尺度下控制土壤有机碳变化的各种生态过程的重要程度。样带 1 横跨粤北山地丘陵区,自西向东的地形分布有向南凸出的三列弧形山地和两列谷地,并兼有盆地、台地和平原,海拔高度、坡度和地形起伏度的变化幅度均较大,使得土壤类型具有明显的垂直地带性分布特征,因此,土壤有机碳密度具有显著的空间变异性,且随着尺度的增大,异质性增强,体现了地形要素在大的尺度上对土壤有机碳密度的影响程度;0—20 cm 土壤有机碳密度的空间变异性大于 0—100 cm 的土壤有机碳密度,这说明了深层土壤母质的相对稳定性以及表层土壤有机碳受到的影响因子更复杂。

样带 2 和样带 3 的土壤有机碳密度的变异性没有明显的规律,整体上受尺度的影响不大。究其原因,样带 2 位于亚热带珠三角外缘的丘陵台地,地貌特征和样带 1 类似,山系排列有序,宽谷、盆地和平原镶嵌其中,但山体海拔趋于平缓,样带 3 跨越了亚热带和中亚热带两个气候带,基本切合了粤北东部和粤西部山地东北—西南向的山脉、谷地走向,山脉之间盆谷分布,山体海拔自东北向西南呈较低趋势,因此,整体上来说样带 2 和样带 3 的地势均较为平坦,受地形因子的影响不大,而土壤母质、类型和植被等因素可能是造成这种空间差异性的主要因素。

样带 4 主要位于莲花山—阴那山山地与罗浮山脉之间的谷地,东北部为西北—东南向岭谷,中部主要为谷地并被山嶂切割,西南部斜跨莲花山脉,地貌形态复杂多样;在较小尺度内,该样带受人类活动影响较大,施肥、耕作措施、种植制度等各种人为活动使得土壤有机碳的空间相关性减弱,随着尺度的增大,局部复杂的地形使得土壤有机碳的区域差异性增强,同时还受到湿润海洋气流的影响,影响因素更加复杂,因此,0—20 cm 土壤有机碳密度空间异质性没有明显的特征尺度;与 0—20 cm 相比,0—100 cm 土壤有机碳密度随尺度变化的空间异质性格局具有不同的表现特征,究其原因,土层深度越厚受人类活动的影响越小,土壤类型、母岩母质和质地的差异是造成 0—100 cm 土壤有机碳密度异质性大小的主要原因,在 1 km 尺度表现了最强的空间异质性,然后随着尺度的增大差异不明显。

#### 4 结论与讨论

本文利用一维离散小波变换在栅格尺度上初步探索了广东山区土壤有机碳密度的空间异质性格局—尺度效应,主要研究结论有:土壤有机碳密度具有较强的空间异质性,空间异质性的大小受控于不同尺度下土壤有机碳密度分布格局的主导因子影响程度;整体上在大于等于 1 km 的尺度,其空间异质性较强;各个样带特征尺度的差异与各样带的土壤和植被类型、地貌特征以及土地利用方式、耕作管理方式等人类活动干活强度有关。

利用小波变换研究广东山区土壤有机碳密度空间变异的尺度效应,为小波变换在大区域尺度下来研究土壤有机碳的空间变异提供一种参考,从而使分析土壤有机碳的变异规律变得较为方便。但本文也存在着以下不足之处:

(1)本文中数据的原始采样间距为 250 m,每一次尺度上推,采样间距变为上一尺度的 2 倍,减少了连续小波变换时小波系数的冗余度,但同时也可能使土壤有机碳空间变异性最大的尺度没有挖掘出来。因此,通过改变数据的原始采样间距大小,再分别使用离散小波变换对其进行多尺度分解,能够更准确地揭示出土壤有机碳空间变异的多尺度响应特征。

(2)本文采用的是一维小波分析,而二维小波分析是针对整个研究区域进行小波系数的计算,克服了人为因素和样带代表性等限制,因此应该具有更大的优势。在后续的研究中,可以尝试利用二维小波或超小波

的分析方法来研究包括土壤有机碳在内的其他土壤性质的尺度效应。

**致谢:**感谢国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院李明杰博士对本文写作的帮助。

#### References:

- [ 1 ] Wu J G. Landscape Ecology: Pattern, Process, Scale and Hierarchy. Beijing: Higher Education Press, 2000: 186-192.
- [ 2 ] Li X M. Research on the Spatial Scale of Eco-Environment based on Wavelet Transform [D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2008.
- [ 3 ] Ou M M, Wang J W. Review of research on soil spatial variability. *Soils*, 2003, 35(1): 30-33.
- [ 4 ] Tang X H, Huang X X, Wei C F. Review of research on SOC spatial distribution characteristics at different scales. *Chinese Agricultural Science Bulletin*, 2005, 21(3): 224-228.
- [ 5 ] Xu X W. Regional Distribution and Variation of SOC Storage in Agricultural Soils at Different Scales [D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2008.
- [ 6 ] Zhang F S, Liu Z X, Zhang Y, Miao Y G, Qu W, Kang Z J. Scaling effect on spatial variability of soil organic matter in crop land. *Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences*, 2009, 26(3): 350-356.
- [ 7 ] Guo X D, Fu B J, Ma K M, Chen L D, Yang F L. Spatial variability of soil nutrients based on geostatistics combined with GIS—A case study in Zunhua City of Hebei Province. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2000, 11(4): 557-563.
- [ 8 ] Lei Y W, Wei C Z, Li J H, Hou Z A, Ye J, Bao B Y. Characters of soil nutrient spatial variability in different scale. *Soils*, 2004, 36(4): 376-381, 391-391.
- [ 9 ] Xie X L. Study on Soil Organic Carbon Stocks in National and Regional Scale Using GIS [D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2004.
- [ 10 ] Feng N N, Li Y X, Zhang X Z, Wang Y D, Xia J G. The spatial variability of the content of organic matter in hilly tea plantation soils with different sampling scales. *Acta Ecologica Sinica*, 2006, 26(2): 349-356.
- [ 11 ] Si B C. Spatial scaling analyses of soil physical properties: A review of spectral and wavelet methods. *Vadose Zone Journal*, 2008, 7(2): 547-562.
- [ 12 ] Shu Q S, Xie L Y. Advances in spatial scaling effects of soil hydraulic properties. *Soils*, 2010, 42(4): 513-518.
- [ 13 ] Katul G, Lai C T, Schäfer K, Vidakovic B, Albertson J, Ellsworth D, Oren R. Multiscale analysis of vegetation surface fluxes: from seconds to years. *Advances in Water Resources*, 2001, 24(9/10): 1119-1132.
- [ 14 ] Li S C, Gao M W, Zhou Q F, Liu F Y. Multi-scale spatial analysis on NDVI and topographical factors using wavelet transform. *Acta Ecologica Sinica*, 2006, 26(12): 4198-4203.
- [ 15 ] Li X M, Sha J M, Lian J L. Regional characteristic scale of NDVI based on wavelet analysis. *Acta Ecologica Sinica*, 2010, 30(11): 2864-2873.
- [ 16 ] Zhao Z H, Zu Y G, Cong P T. Haar wavelet decomposition of main soil factors in Liaotungensis Forest in Dongling Mountain Area. *Acta Ecologica Sinica*, 2002, 22(10): 1660-1665.
- [ 17 ] Shu Q S, Liu Z X, Si B C. Characterizing scale- and location-development correlation of water retention parameters with soil physical properties using wavelet techniques. *Journal of Environmental Quality*, 2008, 37(6): 2284-2292.
- [ 18 ] Biswas A, Si B C. Application of continuous wavelet transform in examining soil spatial variation: A review. *Mathematical Geosciences*, 2011, 43(3): 379-396.
- [ 19 ] Soil Survey Office of Guangdong Province. *Guangdong Soil*. Beijing: Science Press, 1993: 3-385.
- [ 20 ] Wen Y, Huang N S, Kuang Y Q. Pattern and characteristics of soil organic carbon density in Mountain Area of Guangdong Province, China. *Journal of Basic Science and Environment*, 2010, 18(supplement): 10-18.
- [ 21 ] Jiang C. The Scale-Correlation Analysis between Soil Organic Carbon Density and Its Influence Factors based on Wavelet [D]. Guangzhou: Guangzhou University, 2011.
- [ 22 ] Zhang M F, Liao K, Zheng D X. A multi-scale analysis on the structure of integrated ecological information tupu based on the wavelet transform. *Journal of Subtropical Resources and Environment*, 2007, 2(1): 21-27.

#### 参考文献:

- [ 1 ] 邬建国. 景观生态学——格局、过程、尺度与等级. 北京: 高等教育出版社, 2000: 186-192.
- [ 2 ] 李小梅. 基于小波变换的生态环境空间尺度研究 [D]. 福州: 福建师范大学, 2008.
- [ 3 ] 区美美, 王建武. 土壤空间变异研究进展. *土壤*, 2003, 35(1): 30-33.
- [ 4 ] 唐晓红, 黄雪夏, 魏朝富. 不同尺度土壤有机碳空间分布特征研究综述. *中国农学通报*, 2005, 21(3): 224-228.
- [ 5 ] 许信旺. 不同尺度区域农田土壤有机碳分布与变化 [D]. 南京: 南京农业大学, 2008.
- [ 6 ] 张法升, 刘作新, 张颖, 苗永刚, 曲威, 亢振军. 农田土壤有机质空间变异的尺度效应. *中国科学院研究生院学报*, 2009, 26(3): 350-356.
- [ 7 ] 郭旭东, 傅伯杰, 马克明, 陈利顶, 杨福林. 基于 GIS 和地统计学的土壤养分空间变异特征研究——以河北省遵化市为例. *应用生态学报*, 2000, 11(4): 557-563.
- [ 8 ] 雷咏雯, 危常州, 李俊华, 候振安, 冷军, 鲍柏杨. 不同尺度下土壤养分空间变异特征的研究. *土壤*, 2004, 36(4): 376-381, 391-391.
- [ 9 ] 解宪丽. 基于 GIS 的国家尺度和区域尺度土壤有机碳库研究 [D]. 南京: 南京师范大学, 2004.
- [ 10 ] 冯娜娜, 李廷轩, 张锡洲, 王永东, 夏建国. 不同尺度下低山茶园土壤有机质含量的空间变异. *生态学报*, 2006, 26(2): 349-356.
- [ 12 ] 舒乔生, 谢立夏. 土壤水力特性的空间尺度效应研究进展. *土壤*, 2010, 42(4): 513-518.
- [ 14 ] 李双成, 高伟明, 周巧富, 刘逢媛. 基于小波变换的 NDVI 与地形因子多尺度空间相关分析. *生态学报*, 2006, 26(12): 4198-4203.
- [ 15 ] 李小梅, 沙晋明, 连江龙. 基于小波变换的 NDVI 区域特征尺度. *生态学报*, 2010, 30(11): 2864-2873.
- [ 16 ] 赵则海, 祖元刚, 丛沛桐. 东灵山地区辽东栎林主要土壤因子的 Haar 小波分解. *生态学报*, 2002, 22(10): 1660-1665.
- [ 19 ] 广东省土壤普查办公室. *广东土壤*. 北京: 科学出版社, 1993: 3-385.
- [ 20 ] 文雅, 黄宁生, 匡耀求. 广东省山区土壤有机碳密度特征及空间格局. *应用基础与工程科学学报*, 2010, 18(增刊): 10-18.
- [ 21 ] 姜春. 基于小波的土壤有机碳密度与其影响因子的尺度相关分析 [D]. 广州: 广州大学, 2011.
- [ 22 ] 张明锋, 廖克, 郑达贤. 基于小波变换的生态综合信息图谱的多尺度结构分析. *亚热带资源与环境学报*, 2007, 2(1): 21-27.

**ACTA ECOLOGICA SINICA Vol. 33 ,No. 16 Aug. ,2013( Semimonthly)**  
**CONTENTS**

**Frontiers and Comprehensive Review**

- Advances in theoretical issues of species distribution models ..... LI Guoqing, LIU Changcheng, LIU Yuguang, et al (4827)
- A review on rare earth elements in farmland ecosystem ..... JIN Shulan, HUANG Yizong (4836)
- A review on the mechanism of attachment and metamorphosis in barnacle cyprids ... RAO Xiaozhen, LIN Gang, XU Youqin (4846)
- Decision making in group living animals ..... WANG Chengliang, WANG Xiaowei, QI Xiaoguang, et al (4857)

**Autecology & Fundamentals**

- Influence of monsoon's advancing, retreating and conversion on migrations of *Nilaparvata lugens* (Stål) in China .....  
..... BAO Yunxuan, HUANG Jinying, XIE Xiaojin, et al (4864)
- Prey selection and feeding rate of sea stars *Asterias amurensis* and *Asterina pectinifera* on three bivalves .....  
..... QI Zhanhui, WANG Jun, MAO Yuze, et al (4878)
- Habitat selection of Whooper Swan at Bayanbulak in Xinjiang of China ..... DONG Chao, ZHANG Guogang, LU Jun, et al (4885)
- The genetic structure of endemic plant *Pteroceltis tatarinowii* by ISSR markers .....  
..... LI Xiaohong, ZHANG Hui, WANG Deyuan, et al (4892)
- Genetic analysis of salt tolerance of F<sub>1</sub> progenies between chrysanthemum and the intergeneric hybrid of chrysanthemum and  
crossostephium ..... XU Lili, CHEN Fadi, CHEN Sumei, et al (4902)
- Indicative effect of the anatomical structure of plant photosynthetic organ on WUE in desert region .....  
..... ZHANG Haina, SU Peixi, LI Shanxia, et al (4909)
- Effects of water on photosynthesis in different age of tomato leaves ..... CHEN Kaili, LI Jianming, HE Huiqiang, et al (4919)
- Photosynthesis-nitrogen relationship in evergreen and deciduous tree species at different altitudes on Mao'er Mountain, Guangxi .....  
..... BAI Kundong, JIANG Debing, WAN Xianchong (4930)
- Effect of fertilization on the dynamic of soil N<sub>2</sub>O fluxes in Chinese chestnut stands .....  
..... ZHANG Jiaojiao, LI Yongfu, JIANG Peikun, et al (4939)
- Effects of long-term fertilization on aggregate dynamics and organic carbon and total nitrogen contents in a reddish paddy soil .....  
..... LIU Xiyu, WANG Zhongqiang, ZHANG Xinyu, et al (4949)

**Population, Community and Ecosystem**

- Carbon storage of natural wetland ecosystem in Daxing'anling of China ..... MU Changcheng, WANG Biao, LU Huicui, et al (4956)
- Monitoring the riparian vegetation cover after the Wenchuan earthquake along the Minjiang River valley based on multi-temporal  
Landsat TM images; a case study of the Yingxiu-Wenchuan section ..... XU Jiceng, TANG Bin, LU Tao (4966)
- A dynamic analysis of spatial distribution pattern of *Larix gmelinii* natural forest in Pangu farm under varying intensity of fire  
disturbance ..... NI Baolong, LIU Zhaogang (4975)
- Structure of macrozoobenthos in lakes along the Yangtze River and relationships with environmental characteristics .....  
..... CAI Yongjiu, JIANG Jiahu, ZHANG Lu, et al (4985)
- The research on the age structure and sex ratio of *Niviventer confucianus* in Thousand Island Lake .....  
..... ZHANG Xu, BAO Yixin, LIU Jun, et al (5000)
- Mathematical model of insect Logistic increasing and economic threshold based on sex pheromone trap .....  
..... ZHAO Zhiguo, RONG Erhua, ZHAO Zhihong, et al (5008)
- Community composition and phototaxis of insects in tea plantations in Southern Jiangshu Province during late fall .....  
..... ZHENG Yingcha, NIU Yuqun, CUI Guiling, et al (5017)
- Effect of agricultural land use types on soil mite communities in north China .....  
..... HAN Xuemei, LI Dandan, LIANG Zian, et al (5026)

**Landscape, Regional and Global Ecology**

- Exploring the space syntax under negative planning; a case study of landscape connectivity based on the behaviors of avian edge  
species ..... YANG Tianxiang, ZHANG Weiqian, FAN Zhengqiu, et al (5035)
- Temporal-spatial variation of heterotrophic respiration in alpine area of southwestern China .....  
..... ZHANG Yuandong, PANG Rui, GU Fengxue, et al (5047)

- Variability of soil organic matter and its main factors in Jiangsu Province ..... ZHAO Mingsong, ZHANG Ganlin, LI Decheng, et al (5058)
- Spatial distribution and change of vegetation carbon in Northwest Guangxi, China on the basis of vegetation inventory data ..... ZHANG Mingyang, LUO Weijian, LIU Huiyu, et al (5067)
- Resource and Industrial Ecology**
- Urban metabolism process based on emergy synthesis; a case study of Beijing ..... LIU Gengyuan, YANG Zhifeng, CHEN Bin (5078)
- Evaluation on cultivated land ecological security based on the PSR model and matter element analysis ..... ZHANG Rui, ZHENG Huawei, LIU Youzhao (5090)
- The effect of super absorbent polymer on the growth and nutrition absorption of *Festuca arundinacea* L. on an improved gangue matrix ..... ZHAO Zhifeng, WANG Dongmei, ZHAO Tingning (5101)
- Urban, Rural and Social Ecology**
- The effect of distance on the ecological conservation value; a case study of Sanjiang Plain Wetland ..... AO Changlin, CHEN Jinting, JIAO Yang, et al (5109)
- Research Notes**
- Scaling effect on spatial variation of soil organic carbon in mountainous areas of Guangdong Province ..... JIANG Chun, WU Zhifeng, QIAN Lexiang, et al (5118)
- The changes of hair length and pelage thermal insulation in captive female squirrel, *Sciurus vulgarize manchuricus*, during autumn molting period ..... JING Pu, ZHANG Wei, HUA Yan, et al (5126)

# 《生态学报》2013 年征订启事

《生态学报》是由中国科学技术协会主管,中国生态学学会、中国科学院生态环境研究中心主办的生态学高级专业学术期刊,创刊于1981年,报道生态学领域前沿理论和原始创新性研究成果。坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,依靠和团结广大生态学科工作者,探索生态学奥秘,为生态学基础理论研究搭建交流平台,促进生态学研究深入发展,为我国培养和造就生态学科人才和知识创新服务、为国民经济建设和发展服务。

《生态学报》主要报道生态学及各分支学科的重要基础理论和应用研究的原始创新性科研成果。特别欢迎能反映现代生态学发展方向的优秀综述性文章;研究简报;生态学新理论、新方法、新技术介绍;新书评价和学术、科研动态及开放实验室介绍等。

《生态学报》为半月刊,大16开本,300页,国内定价90元/册,全年定价2160元。

国内邮发代号:82-7,国外邮发代号:M670

标准刊号:ISSN 1000-0933 CN 11-2031/Q

全国各地邮局均可订阅,也可直接与编辑部联系购买。欢迎广大科技工作者、科研单位、高等院校、图书馆等订阅。

通讯地址:100085 北京海淀区双清路18号 电话:(010)62941099; 62843362

E-mail: shengtaixuebao@rcees.ac.cn 网址: www.ecologica.cn

本期责任副主编 王克林 编辑部主任 孔红梅 执行编辑 刘天星 段靖

生态学报

(SHENGTAI XUEBAO)

(半月刊 1981年3月创刊)

第33卷 第16期 (2013年8月)

ACTA ECOLOGICA SINICA

(Semimonthly, Started in 1981)

Vol. 33 No. 16 (August, 2013)

编辑 《生态学报》编辑部  
地址:北京海淀区双清路18号  
邮政编码:100085  
电话:(010)62941099  
www.ecologica.cn  
shengtaixuebao@rcees.ac.cn

主编 王如松  
主管 中国科学技术协会  
主办 中国生态学学会  
中国科学院生态环境研究中心  
地址:北京海淀区双清路18号  
邮政编码:100085

出版 科学出版社  
地址:北京东黄城根北街16号  
邮政编码:100717

印刷 北京北林印刷厂  
发行 科学出版社  
地址:东黄城根北街16号  
邮政编码:100717  
电话:(010)64034563  
E-mail: journal@espg.net

订购 全国各地邮局  
国外发行 中国国际图书贸易总公司  
地址:北京399信箱  
邮政编码:100044

广告经营 京海工商广字第8013号  
许可证

Edited by Editorial board of  
ACTA ECOLOGICA SINICA  
Add: 18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China  
Tel: (010)62941099  
www.ecologica.cn  
shengtaixuebao@rcees.ac.cn


Editor-in-chief WANG Rusong  
Supervised by China Association for Science and Technology  
Sponsored by Ecological Society of China  
Research Center for Eco-environmental Sciences, CAS  
Add: 18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China

Published by Science Press  
Add: 16 Donghuangchenggen North Street,  
Beijing 100717, China

Printed by Beijing Bei Lin Printing House,  
Beijing 100083, China

Distributed by Science Press  
Add: 16 Donghuangchenggen North  
Street, Beijing 100717, China  
Tel: (010)64034563  
E-mail: journal@espg.net

Domestic All Local Post Offices in China  
Foreign China International Book Trading  
Corporation  
Add: P. O. Box 399 Beijing 100044, China



ISSN 1000-0933  
CN 11-2031/Q

国内外公开发行

国内邮发代号 82-7

国外发行代号 M670

定价 90.00 元