ISSN 1000-0933

CN 11-2031/Q

生态学报

Acta Ecologica Sinica

第34卷 第4期 Vol.34 No.4 **2014**

中国生态学学会
中国科学院生态环境研究中心
科学出版社

主办
出版

中国科学院科学出版基金资助出版

生态学报

(SHENGTAI XUEBAO)

第 34 卷 第 4 期

2014 年 2 月 (半月刊)

目 次

前沿理论与学科综述

- 富营养化湖泊溶解性有机碳生物可利用性研究进展 叶琳琳,孔繁翔,史小丽,等 (779)
- 黄河下游平原农业景观中非农生境植物多样性 卢训令,梁国付,汤 茜,等 (789)

个体与基础生态

- 锰胁迫对杠板归细胞超微结构的影响 王 钧,邬 卉,薛生国,等 (798)
- 不同渗氧能力水稻品种对砷的耐性和积累 吴 川,莫竞瑜,薛生国,等 (807)
- 弱光下水分胁迫对不同产地披针叶茴香幼苗生理特性的影响 曹永慧,周本智,陈双林 (814)
- 不同分枝数对桑树幼苗生长发育的影响 邹慧慧,胥 晓,刘 刚,等 (823)
- 斑膜合垫盲蝽若虫在国槐上的空间分布型及抽样技术 朱惠英,沈 平,吴建华,等 (832)
- 连作苹果园土壤真菌的 T-RFLP 分析 尹承苗,王功帅,李园园,等 (837)
- 棉隆对苹果连作土壤微生物及平邑甜茶幼苗生长的影响 刘恩太,李园园,胡艳丽,等 (847)
- 两株具有芪降解功能的植物内生细菌的分离筛选及其特性 孙 凯,刘 娟,李 欣,等 (853)

种群、群落和生态系统

- 温度对柑橘始叶螨实验种群生长发育繁殖的影响 李迎洁,王梓英,张国豪,等 (862)
- 高原鼠兔有效洞穴密度对青藏高原高寒草甸群落植物生态位的影响 贾婷婷,毛 亮,郭正刚 (869)
- 三工河流域琵琶柴群落特征与土壤因子的相关分析 赵学春,来利明,朱林海,等 (878)
- 岷江干旱河谷造林对土壤微生物群落结构的影响 王卫霞,罗 达,史作民,等 (890)
- 滩涂围垦和土地利用对土壤微生物群落的影响 林 黎,崔 军,陈学萍,等 (899)
- 福寿螺对稻田水生植物群落结构的影响 赵本良,章家恩,戴晓燕,等 (907)
- 4 种木本植物在潜流人工湿地环境下的适应性与去污效果 陈永华,吴晓芙,郝 君,等 (916)
- 基于静态箱式法和生物量评估海北金露梅灌丛草甸碳收支 李红琴,李英年,张法伟,等 (925)
- 初始 pH 值对碱性和酸性水稻土微生物铁还原过程的影响 吴 超,曲 东,刘 浩 (933)

景观、区域和全球生态

- 库姆塔格柽柳沙包年层稳定碳同位素与气候环境变化 张锦春,姚 拓,刘长仲,等 (943)

资源与产业生态

- 大棚甜瓜蒸腾规律及其影响因子 张大龙,常毅博,李建明,等 (953)
- 盐胁迫下荒漠共生植物红砂与珍珠的根茎叶中离子吸收与分配特征 赵 昕,杨小菊,石 勇,等 (963)
- 普通鹿蹄草品质与根际和非根际土壤的关系 耿增超,孟令军,刘建军 (973)

作物种植前后土壤有机质及养分因子的空间变异分析 方 斌,吴金凤 (983)

城乡与社会生态

城市河流健康评价指标体系构建及其应用 邓晓军,许有鹏,翟禄新,等 (993)

西藏生态足迹与承载力动态分析..... 安宝晟,程国栋 (1002)

研究简报

三峡库区岸坡消落带草地、弃耕地和耕地土壤微生物及酶活性特征 马 朋,李昌晓,雷 明,等 (1010)

盐胁迫对 2 种栎树苗期生长和根系生长发育的影响..... 王树凤,胡韵雪,孙海菁,等 (1021)

恒温 and 变温驯化对大蟾蜍蝌蚪热耐受性的影响 王立志 (1030)

学术信息与动态

国际生物土壤结皮研究发展态势文献计量分析..... 贺郝钰,侯春梅,迟秀丽,等 (1035)

期刊基本参数:CN 11-2031/Q * 1981 * m * 16 * 264 * zh * P * ¥90.00 * 1510 * 30 * 2014-02

封面图说: 大蟾蜍蝌蚪群——大蟾蜍别名癞蛤蟆,体长达 10cm 以上,身体肥胖,四肢短,步态及齐足跳的姿势具特征性。其背部皮肤厚而干燥,通常有疣,呈黑绿色,常有褐色花斑,趾间具蹼。毒腺在背部的疣内,受惊后毒腺分泌或射出毒液。大蟾蜍早春在水中繁殖,可迁移至 1.5km 外或更远的适合繁殖的池塘,产卵量很大,产卵数天后蝌蚪即可孵出,1—3 个月后发育为蟾。大蟾蜍常作为实验动物或药用动物,其耳后腺和皮肤腺的白色分泌物可制成“蟾酥”,可治疗多种疾病。研究表明,大蟾蜍蝌蚪最高逃避温度和最高致死温度比最适温度产生的影响要大。

彩图及图说提供: 陈建伟教授 北京林业大学 E-mail: cites.chenjw@ 163.com

DOI: 10.5846/stxb201210101401

李红琴, 李英年, 张法伟, 刘晓琴, 吴启华, 毛绍娟. 基于静态箱式法和生物量评估海北金露梅灌丛草甸碳收支. 生态学报, 2014, 34(4): 925-932.

Li H Q, Li Y N, Zhang F W, Liu X Q, Wu Q H, Mao S J. Carbon budget of alpine *Potentilla fruticosa* shrubland based on comprehensive techniques of static chamber and biomass harvesting. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(4): 925-932.

基于静态箱式法和生物量评估 海北金露梅灌丛草甸碳收支

李红琴^{1,2}, 李英年^{1,2,*}, 张法伟^{1,2}, 刘晓琴^{1,3}, 吴启华^{1,3}, 毛绍娟^{1,3}

(1. 中国科学院西北高原生物研究所, 西宁 810001;

2. 中国科学院高原生物适应与进化重点实验室, 西宁 810001; 3. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要: 高寒灌丛是青藏高原重要植被类型, 因特殊生物学性质致使其系统碳功能较难评估。采用静态箱式法测定高寒金露梅 (*Potentilla fruticosa*) 灌丛草甸的生态系统呼吸, 结合生物量收获法估测生态系统净初级碳量。结果表明, 高寒金露梅灌丛草甸生态系统呼吸、土壤呼吸和植物呼吸具有明显的季节动态变化, 其年总量分别为 886.28、444.93 gC/m² 和 441.36 gC/m²; 灌丛区、草本区以及土壤区的呼吸均与 5 cm 地温具有极显著的指数关系 (R^2 分别为 0.95、0.94 和 0.83), 各区温度敏感系数 Q_{10} 分别为 4.40、4.13 和 3.16; 8a(2003—2010) 植被净初级生产力平均为 468.55 gC/m²。结合系统土壤呼吸, 生态系统年均净固碳量为 27.19 gC/m², 即高寒金露梅灌丛草甸生态系统为碳汇。对比涡度相关标准方法连续观测数据表明该方法评估生态系统碳功能具有较大可信度。

关键词: 金露梅灌丛; 生态系统呼吸; 土壤呼吸; 净初级生产力; 碳汇能力

Carbon budget of alpine *Potentilla fruticosa* shrubland based on comprehensive techniques of static chamber and biomass harvesting

LI Hongqin^{1,2}, LI Yingnian^{1,2,*}, ZHANG Fawei^{1,2}, LIU Xiaoqin^{1,3}, WU Qihua^{1,3}, MAO Shaojuan^{1,3}

1 Northwest Institute of Plateau Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810001, China

2 Key Laboratory of Adaptation and Evolution of Plateau Biota, Chinese Academy of Sciences, Xining 810001, China

3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: Alpine shrubland is one of the most important dominant vegetation types on the Qinghai-Tibetan Plateau, and because of its biological uniqueness, accurately estimating its ecosystem carbon function is very difficult. This is particularly true in the case of shrub encroachment induced by ongoing climate warming. Shrubs sequester much more carbon (C), and their woody branches have a higher carbon to nitrogen (C/N) ratio than do grasses. In addition, soil organic matter and litter are predicted to decompose more rapidly under future warmer scenarios. Consequently, predicting changes in the ecosystem carbon budget caused by more shrubland in the future is crucial but difficult.

In this study, the referee CO₂ fluxes were estimated by eddy covariance method from 2003—2010 in the alpine *Potentilla fruticosa* shrubland of Haibei Tibetan Autonomous Prefecture, China. The respiration rates of the soil and ecosystem were observed using a static chamber, and biomass was estimated by harvesting plants four to six times per month from May 2009 through June 2010. Finally, the net ecosystem primary production was evaluated to assess whether the ecosystem was a sink or a source of carbon.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (31070437, 31270523); 中国科学院战略性先导科技专项资助项目 (XDA05050601, XDA05050404); 国家重点基础研究发展计划 (973) 资助项目 (2010CB833501-01-13)

收稿日期: 2012-10-10; 修订日期: 2013-03-14

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: ynli@nwipb.cas.cn

Because shrubs were mixed with grasses in the study area, our experimental design included three treatments, each with three replicates, in the shrubland; the treatments were shrub plots, grass plots, and exposed field plots. In each plot, soil temperature was measured daily in each year of the study, while respiration rate was measured at intervals. The correlation between soil temperature and respiration rate on the days when both were measured was used to estimate the daily respiration rate. The results showed that daily respiration rate in the shrub, grass, and exposed field plots was 1.49—48.27, 1.04—39.14, and 1.01—16.99 g CO₂ m⁻² d⁻¹, respectively. The soil, vegetation and ecosystem respiration rates fluctuated distinctly among seasons, and all three reached their maxima in August. The annual carbon accumulations were 444.93, 441.36, and 886.28 g C/m², respectively. The respiration rates of the shrub, grass, and exposed field plots correlated exponentially and significantly with the soil temperature at a depth of 5 cm ($R^2 = 0.95, 0.94, \text{ and } 0.83$, respectively). Respiration entropy, Q_{10} (the magnitude of the respiration rate change with a 10 °C change in temperature), of the treatments was 4.40, 4.13, and 3.16, respectively. The respiration rate in the shrub and grass plots was relatively sensitive to temperature, implying that plant respiration might contribute to ecosystem respiration much more in warming scenarios. The average 8-year net plant primary production was 468.55 g C/m² from 2003 to 2010, ranging from 345.02 g C/m² in 2005 to 633.96 g C/m² in 2009. The below-ground net plant primary production was 3.89 times that of the above-ground net plant primary production. Subtracting soil heterotrophic respiration, the alpine shrubland ecosystem acted as weak carbon sink and on average absorbed 27.19 g C/m² per year from the atmosphere. However, carbon function varied over time, from releasing -108.72 g C/m² in 2005 to assimilating 175.06 g C/m² in 2009. The magnitude and direction of carbon function was consistent with the results of an authentic eddy covariance technique in this alpine shrubland ecosystem, although our value of 27.19 g C/m² was slightly lower than in the previous study. Our results indicated that this comprehensive method integrating data from static chambers and plant harvests provided a credible estimate of the ecosystem carbon budget.

Key Words: *Potentilla fruticosa* shrubland; ecosystem respiration; soil heterotrophic respiration; net primary production; carbon sequestration capacity

陆地生态系统中植被碳库和土壤碳库碳贮存约为大气碳库的 3 倍,是全球碳循环的重要组成部分^[1]。陆地生态系统种类繁多,灌丛生态系统介于木本和草本之间,不仅占有较高的比重,而且具有特殊的生物学性质。伴随着气候暖干化,灌丛化尤其在高寒区域越来越普遍^[2]。由于灌丛木质部分相对于草本具有较高的 C/N,而且随温度升高而增大,但另一方面灌丛生态系统的土壤有机质和凋落物在暖化情境下分解变快^[3],致使灌丛化所引起的系统碳收支变化复杂^[4]。通过精确解析灌丛生态系统碳收支特征,可为评估灌丛化所引起的区域碳功能提供科学依据。

高寒灌丛草甸在青藏高原分布面积仅次于高寒草甸,约为 0.106×10^6 km²,占青藏高原总面积的 4 % 左右,多分布在东部海拔 2700—4500 m 的山地阴坡、土壤湿度较高的平缓滩地,以及地下水位较高的河谷阶地。金露梅 (*Potentilla fruticosa*) 灌丛草甸生

物量较高、土壤有机质含量丰富且因低温分解缓慢,系统碳储量巨大^[5-6],冬季往往易被积雪和结冰所覆盖,夏季多为当地牧民的放牧草场。但在气候变暖和人类活动加剧的双重压力下,生态系统的植被结构和分布现状业已发生改变,尤其是系统的碳源/汇功能变化显著^[7]。为了认识和了解青藏高原金露梅灌丛草甸植被类型的碳收支特征,在北海高寒草地生态系统国家野外观测研究站(海北站)于 2003 年开始利用微气象-涡度相关法观测系统进行大气与植被界面碳通量的观测,取得一定的研究结果^[8]。同时相应不定期的进行了生态系统呼吸、土壤呼吸、植被净初级生产碳量、土壤碳库储量等项目监测。本文以静态箱式法解析生态系统植被、土壤呼吸特征,结合植被净初级生产力数据,评估生态系统源/汇功能。并通过对比涡度相关连续数据,评估该方法的可信度,以期高寒灌丛草甸生态系统碳汇能力的估算和碳循环的研究等提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 自然概况

研究在青藏高原东北隅的海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(海北站)东北 7 km 处的金露梅灌丛草甸进行。实验区(37°29′—37°45′ N, 101°12′—101°23′ E)海拔 3358 m, 具明显的高原大陆性气候。据海北站资料分析, 实验区附近年平均气温约为-2℃; 年降水量 620 mm 左右, 降水主要集中于暖季的 5—9 月。区域气候表现出冷季寒冷、干燥、漫长, 暖季凉爽、湿润、短暂^[9]。土壤类型为暗沃寒冻雏形土(Mol-Cryic Cambisols), 土壤发育年轻, 土层浅薄, 有机质含量丰富^[10]。

金露梅灌丛草甸群落由 2 层组成, 上层为金露梅灌丛群落, 下层为禾本和莎草为主植物群落。金露梅灌丛株高在 30—40 cm 之间, 最高可达 60 cm, 其盖度为 50% 左右。下部草本植物种类异质性较强。草本层中主要有 47 种植物组成, 隶属 15 科 37 属, 草本层优势种有藏异燕麦(*Helictotrichon tibeticum*)、垂穗披碱草(*Elymus nutans*), 次优势种有异针茅(*Stipa aliena*)、羊茅(*Festuca ovina* L.)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、线叶嵩草(*Kobresia capillifolia*), 伴生种有柔软紫菀(*Aster flaccidus*)、棘豆(*Oxytropis ochrocephala*)、瑞苓草(*Saussurea nigrescens*)、珠芽蓼(*Polygonum viviparum* L.)、矮火绒草(*Leontopodium nanum*)、尖叶龙胆(*Gentiana aristata*)、糙毛野青茅(*Deyeuxia arundinacea*)、花苜蓿(*Trigonella ruthenica*)、圆萼摩菱草(*Morina chinensis*)等。群落的总盖度约为 90%, 草本高度平均约为 8—16 cm。

1.2 研究材料和方法

1.2.1 金露梅灌丛草甸生态系统及土壤 CO₂ 排放量测定

CO₂ 通量气体测定采用静态密闭箱-气相色谱法进行。采集箱由 304K 薄不锈钢板制作, 考虑到金露梅灌丛较高, 箱体设计为顶箱、中段箱, 体积均为 50 cm×50 cm×50 cm。底座(50 cm×50 cm×10 cm), 上端有密闭水槽。

因金露梅灌丛草甸系草本和木本嵌套分布, 故观测按草本、灌丛木本和裸露地表(人为除去地表植物)3 个处理区进行, 分别代表系统的草本区、灌丛区和土壤呼吸(当然也包括了一定的植物根系呼

吸), 每个处理区 3 个重复。静态箱式法 CO₂ 通量观测于 2009 年 5 月到 2010 年 6 月期间进行。按有关研究者提出在 9:00—11:00 的采样可代表日平均值方案^[11], 观测频次视天气状况每月进行 4—6 次, 考虑到海北站区地方时与北京时相差 1 h 18 min, 实验观测取在采样时间为 10:00—11:00, 气体样品采集频率 1 次/10min, 共 4 次。此外, 在寒冬季节(1 月)、植物生长初期(5 月)、中期(7 月)和末期(9—10 月), 分别进行了每 3 h 的 1 次日变化观测。取样后及时带回实验室采用 HP4890D 气相色谱仪进行分析。通量计算则采用下式计算:

$$F = \rho \cdot \frac{V}{A} \cdot \frac{P}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{dC_t}{dt}$$

式中, F 是被测气体排放通量; V 是箱体体积; A 是箱体底面积; C_t 是时间 t 时刻箱内被测气体的体积混合比浓度; ρ 是标准状态下的被测气体密度; T_0 和 P_0 分别为标准状况下的空气绝对温度和气压; P 为采样地点的气压; T 为采样时的绝对温度。

1.2.2 金露梅灌丛草甸植被净初级生产碳量的测定与计算

高寒金露梅灌丛草甸为草本和灌丛景观嵌套分布。草本植被生物量采用收获法, 即 5 月 15 日到枯黄初期的 10 月 15 日期间的每月 15 日前后调查草本地表、地下生物量。随机选择 6 个 50 cm×50 cm 的丛间草地样方, 收集枯落物和植物绿色部分; 地下生物量在上述样方内再随机选择 25 cm×25 cm 的二级样方 3 个, 按 0—10 cm、10—20 cm 和 20—40 cm 3 个层次用铁铲和切刀分层取出, 用 100 目的筛子将根系样品冲洗干净。然后置恒温 65℃ 的烘箱, 烘干至恒重后称重, 并换算为碳含量(gC/m²)。

对金露梅灌木生物量采用收获法与样线法相结合进行估算。首先, 于 2002 年 5 月在金露梅灌丛草甸中央部随机选择一点, 分别依正北方向(0°)、120°方向、240°方向延伸 80 m 后, 在左侧选择 10 m×10 m 的样方, 共 3 个样方, 并对 3 个样方内所有(包括刚生长的单株)金露梅灌木进行标记(共计 1162 丛)。再在植物生长期的 6—9 月每月 15 日前后的 3 d 内, 测定样方内所有标记的金露梅灌木冠面自然状况下的最大长度、最小宽度和植株最大高度。每月得到 1162 组数据, 作为调查金露梅灌丛生物量的基本参数。

每月 15 日上述参数测定的同时,在 3 个样方外围挖掘最小(单株)到最大的金露梅灌木丛 18 丛。挖掘前测定对应的金露梅冠面最大长度(A)、最小宽度(B)和植株最大高度(H)。挖掘后用剪刀分离出金露梅当年新生长的枝叶、地上部分和地下部分,分别装入纸袋,并将地下部分用水冲洗,最后所有样品置在恒温 65 °C 的烘箱连续烘干至恒重后称重。

然后,以地上多年累积枝秆生物量、地下生物量、地上新生生物量为因变量,分别建立与冠面最大长度、最小宽度和植株最大高度的回归方程:

$$W_{ij} = e^{a \ln(A \cdot B \cdot H) + b}$$

式中, a 、 b 为回归系数; W_{ij} ($i=1,2,3$) 分别为金露梅灌丛地上多年累积枝秆生物量、地下生物量、地上新生生物量, j 为月份。再利用 300 m² 每月所调查的 1162 丛灌丛数的基本参数,计算单位面积平均灌木生物量(g/m²)。并根据灌木各部位碳含量转换成碳量(gC/m²)。

由于金露梅灌丛草甸生物量是由灌木和草本植物构成。在 10 m×10 m 的 3 个样方内,测量、计算灌丛和草本面积的比例,进而估测灌丛草甸的植被总生物碳量。其中灌木地上部和地下部平均碳含量分别为 0.50 和 0.48(实测值),丛间草本植被含碳量地上和地下分别取 0.45 和 0.40^[12]。

1.2.3 金露梅灌丛草甸 CO₂ 净生态系统交换量(碳

汇能力)计算

本研究假设未发生根系分泌补给土壤碳,另外根系呼吸监测难度大,文中将根系呼吸归入到土壤呼吸。因此采用植被净初级生产碳量与土壤呼吸的差值来估算净生态系统生产力(NEP)^[13]。利用 2009 年 5 月到 2010 年 12 月期间监测的土壤呼吸、植被呼吸数据,建立与微气象连续观测资料的 TEM 指数相关模型^[14]:

$$R_{eco} = R_{eco,f} e^{\ln(Q_{10})(T-T_f)/10}$$

式中, R_{eco} 是系统呼吸速率, $R_{eco,f}$ 是系统在 T_f 参考温度下的呼吸速率(本研究取 T_f 为 10 °C), Q_{10} 是系统呼吸敏感度(温度每增加 10 °C,呼吸速率增加的倍数), T 为土壤温度。并根据灌木和草本的比例,获取生态系统年际呼吸特征,计算金露梅灌丛年际 NEP。同时,对比涡度相关系统观测的相应净生态系统 CO₂ 交换量(NEE),以评估本研究方法的可信度。

2 结果与分析

2.1 金露梅灌丛草甸生态系统呼吸、土壤呼吸和植被呼吸

本研究共取得了 66 次生态系统呼吸的有效数据。分析发现,生态系统 CO₂ 日排放量与 5 cm 地温(T_d)具有极显著的指数关系(图 1)。由模拟方程可

图 1 高寒金露梅灌丛草甸草本区(R_{ch})、木本区(R_{ew})和裸露土壤(R_h)系统日呼吸速率与 5cm 平均地温关系

Fig.1 The relationship between average soil temperature at 5cm and diurnal CO₂ emissions in grass plots (R_{ch}), shrub plots (R_{ew}) and exposed soil plots (R_h)

知, T_d 能够解释丛间草地区和灌木区系统呼吸变异的 94% 和 95%, 而对裸露地表的土壤呼吸可解释 83%。根据 TEM 模型^[14], 各区系统呼吸熵 Q_{10} 分别为 4.40、4.13 和 3.16, 表明灌丛草本区和木本区系统呼吸强度的温度敏感性较高。其中灌木区系统呼吸强度最大, 丛间草本区仅次之, 裸露地表区最小。这主要由于: 1) 灌丛区郁闭度较高, 能有效降低土壤蒸发, 改善土壤湿度和结构, 利于微生物的活动和 CO_2 扩散^[15]; 2) 灌丛区、草本区和裸露区的地下生物量和系统光合通化速率依次降低, 而根系活动强度和光合能力的高低影响了微生物活动的底物供应^[16]; 3) 灌丛植被具有较高的持雪能力 (Snow-holding capacity), 为微生物和根系活动提供了充足的水分和营养物质^[3,17]。

依连续观测的地温资料及模拟方程, 计算得到生态系统 CO_2 呼吸日总量的年际变化 (图 2)。灌木区系统呼吸的变化范围在 $1.49—48.27 \text{ g } CO_2 \text{ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 之间, 草本区系统呼吸的变化范围在 $1.04—39.14 \text{ g } CO_2 \text{ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 之间, 土壤呼吸的变化范围在 $1.01—16.99 \text{ g } CO_2 \text{ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 之间。3 个处理区系统呼吸都表现出明显的季节变化规律。从 5 月中旬开始, 随着土壤温度的升高, 系统 CO_2 日排放量也迅速增大, 7 到 8 月达最高; 冷季一般低于 $5 \text{ g } CO_2 \text{ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 且变化平缓, 在 11 月下旬到次年 3 月上旬低于 $2 \text{ g } CO_2 \text{ m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 。

图 2 高寒金露梅灌丛草甸草本区、木本区生态系统和裸露地表下总土壤 CO_2 日排放量的年特征

Fig.2 Annual variation of CO_2 emissions every day in grass plots, shrub plots and exposed soil plots

测量表明, $10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ 的 3 个样方内草本和灌丛分别占地表面积的 78% 和 22%。因此高寒金露梅

灌丛草甸生态系统植被总的净初级生产碳量和生态系统呼吸量按 78% 的草本和 22% 的灌丛之和来估算。表明 2010 年高寒金露梅灌丛草甸生态系统呼吸、土壤呼吸和植物呼吸年总量分别为 886.28 、 $444.93 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 和 $441.36 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ (表 1)。并根据 2003—2010 年 5 cm 日平均地温资料利用相关指数回归模型计算出 8a 生态系统呼吸、土壤呼吸、植物呼吸的年总量, 8a 平均分别为 874.43 、 $441.36 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 和 $433.07 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ (表 1)。虽然年景不同, 生态系统、土壤呼吸、植物呼吸有所不同, 但波动幅度较小 (约为 10%), 生态系统、土壤呼吸、植物呼吸其年间波动幅度分别为 76.89 、 $34.33 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 和 $47.73 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 。植被呼吸、土壤呼吸占生态系统呼吸比例表明, 分别为 49.5% 和 50.5% (表 1)。

2.2 金露梅灌丛草甸植被地上、地下生物碳量及净初级生产碳量

同样, 高寒金露梅灌丛草甸生态系统净初级生产碳量按照 22% 的灌木和 78% 的草本净初级生产碳量加权而得。其结果见表 1。2003—2010 年, 海北金露梅灌丛草甸植被净初级生产碳量在 $345.02 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ (2005 年) 到 $633.96 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ (2009 年) 之间, 平均为 $468.55 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 。地上部分净初级生产碳量为 $117.10 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$, 地下部分净初级生产碳量为 $455.88 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$, 地下部分是地上部分的 3.89 倍。而金露梅灌丛草甸其灌丛木本部分净初级生产碳量仅只是草本净初级生产碳量的 13%, 是总的净初级生产碳量的 10%。表明高寒灌丛草甸生态系统, 植被对大气 CO_2 的吸收主要归功于草本植物的吸收, 而灌木木本部分对碳吸收作用微弱。因此草本植物在灌丛生态系统碳吸收过程中起重要作用。

2.3 金露梅灌丛草甸生态系统碳汇能力

统计分析表明, 2003—2010 年年均净生态系统生产力 (碳汇能力) 为 $27.19 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ (表 1), 各年间差异稍大, 在 $-108.72—175.06 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 之间波动, 2009 年碳汇能力最强, 而 2005 表现为强的碳源。这个值比同试验地涡度相关法观测系统观测的 8 年平均值 ($58.57 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$) 低 $31.38 \text{ gC m}^{-2} \text{ a}^{-1}$ 。偏低的原因主要是裸露地表处理仅将植物地上部分去除, 而将植物根系的呼吸也纳入到土壤呼吸之中, 致使系统土壤呼吸偏大而低估了净生态系统生产碳

量。因此高寒金露梅灌丛草甸生态系统为一弱碳汇 功能区或源汇平衡区。

表 1 海北金露梅灌丛草甸 2003—2010 年 Re 、 Ra 、 R_h 、 NPP 、 NEP 分布状况及 Ra 、 R_h 分配比例

Table 1 Re 、 Ra 、 R_h 、 NPP and NEP of Haibei alpine *Potentilla fruticosa* shrubland and the ratio of Ra and R_h

年份 Year	Re	R_h	Ra	NPP	NEP	Ra/Re	Rh/Re
2003	845.81	429.56	416.25	445.68	16.12	0.492	0.508
2004	836.34	424.58	411.76	456.12	31.54	0.492	0.508
2005	913.23	453.74	459.49	345.02	-108.72	0.503	0.497
2006	908.87	450.99	457.88	469.36	18.37	0.504	0.496
2007	855.76	435.11	420.66	419.22	-15.89	0.492	0.508
2008	849.44	433.05	416.39	553.48	120.43	0.490	0.510
2009	899.70	458.90	440.80	633.96	175.06	0.490	0.510
2010	886.28	444.93	441.36	425.53	-19.40	0.498	0.502
平均	874.43	441.36	433.07	468.55	27.19	0.495	0.505

Re 生态系统呼吸 ($gC\ m^{-2}\ a^{-1}$); Ra 植被呼吸 ($gC\ m^{-2}\ a^{-1}$); R_h 土壤呼吸 ($gC\ m^{-2}\ a^{-1}$); NPP 植被地上地下总的净初级生产碳量 ($gC\ m^{-2}\ a^{-1}$); NEP 为忽略根分泌及根系呼吸后的碳汇能力 ($gC\ m^{-2}\ a^{-1}$)

利用净初级生产量和土壤呼吸计算得到的碳汇值与涡度相关法观测的 NEE 是有差别的,这种差别包含了多种因素。如生物量测定误差,土壤呼吸仅是在 10:00—11:00 间测定而替代日平均,同时受条件限制没有进行动态的连续观测,仅只是选择了一年中 66 次得测定值,而且在土壤呼吸过程中有根系呼吸的作用,测定值又用地温来模拟其年变化乃至年的总呼吸量的计算。当然,涡度相关法观测的 NEE 也有其本身的缺陷。但从二者比较的最终结果来看,在年际变化的长时间尺度上仍能说明植被的碳汇源强度。表明利用该方法估算金露梅灌丛草甸生态系统碳汇能力是可行的。

3 讨论

草地灌丛化随气候变暖在高寒地区日益增加^[18]。本研究发现高寒金露梅灌丛草甸生态系统的碳汇功能主要归功于草本植物(表 1),这主要由于一方面虽然灌丛冠面面积较大(可达 40%—50%),而基部占地表面积较低(约为草本的 1/4),另一方面草本植物净初级生产力较高(约同面积灌木的 3 倍以上)。同时,灌木枝条丰富且高度较高,具有较大的生态系统呼吸存在较高的碳释放能力(图 2),表明草地灌丛化可能会降低系统的碳汇能力;但由于草本植物的碳储时效性远低于木本^[19],灌木能增加系统碳储的时效性,其对区域碳收支的作用仍还需进一步深入研究。另外,由于草本区呼吸熵 Q_{10} (4.13) 仅比灌木区呼吸熵(4.40)低 0.27,加

之高寒金露梅灌丛草甸植被中草本群落在地表面占据较大的面积比例,表明气候暖化的背景下,生态系统的草本呼吸强度贡献明显增强,更为灌丛化引起的区域碳平衡增加了复杂度。

草地碳储巨大,但其碳汇能力时间和空间异质性较强^[20-22]。涡度相关法被认为是最直接、最有效的监测生态系统 CO_2 交换的技术^[23]。但由于涡度相关仪器昂贵,加之生态系统复杂的景观格局,亟需可替代的方法。本研究通过测定生态系统净初级生产力和土壤呼吸的方法,估测高寒金露梅灌丛草甸在 2003 和 2004 年表现为碳汇,分别吸收 $16.12gC\ m^{-2}\ a^{-1}$ 和 $31.54gC\ m^{-2}\ a^{-1}$ (表 1),略低于 Zhao 等^[24]利用涡度相关法所得的 $58.5gC\ m^{-2}\ a^{-1}$ (2003 年)和 $75.5gC\ m^{-2}\ a^{-1}$ (2004 年)。这主要由于以下 2 方面的原因:1)生态系统的呼吸十分复杂^[16],当温度到一定程度后,土壤湿度、C/N、生物因子将成为主控因素^[11,23]。而本文仅仅采用温度来模拟生态系统呼吸,极有可能高估生态系统的呼吸速率,进而低估了系统的碳汇功能;2)涡度相关系统虽然是测定同质、均匀下界面 CO_2 交换的精确方法,但当夜间大气层结稳定时易低估生态系统呼吸,尽管可通过摩擦速度这一方法降低误差但却无法消除^[21-22]。但两种方法的差值较为恒定(约 $43gC\ m^{-2}\ a^{-1}$),说明本研究的方法具有一定的可信度。

同时,以 8 年高寒金露梅灌丛草甸生态系统碳汇能力为因变量,构建其与年均气温(Ta)和年降水量(R)的函数。一般线性模型统计表明, $Ta(p =$

0.36)、 $R(p = 0.79)$ 和 $Ta \times R(p = 0.26)$ 与系统碳汇能力无显著关系。表明该系统碳汇能力年际波动受控因子较为复杂,有别于温度控制高寒金露梅灌丛草甸生态系统 CO_2 通量季节波动的研究结果^[8]。而高寒生态系统的碳汇能力受光合吸收的影响更强^[25],也暗示高寒生态系统碳汇能力更多的受控于生物群落和生理特性。

不同生态系统的呼吸因受碳底物有效性、植被种类和土壤性质等众多因子的影响而表现出差异^[14]。由于微生物和植被酶活性,生态系统呼吸与温度存在显著指数相关^[26-27]。对温度的敏感性 Q_{10} 分析发现,灌丛生态系统呼吸,草本生态系统呼吸以及土壤呼吸的 Q_{10} 分别为4.40、4.13和3.16,和中高纬度地区的研究结果相似^[28],这是因为温度较低和海拔较高的缘故^[16],同时也导致了土壤呼吸占生态系统呼吸的比例略低于内蒙古羊草草原的^[29]。

4 结论

高寒金露梅灌丛草甸生态系统的灌木区、草本区和裸露土壤区呼吸强度与 T_d 具有极显著的指数关系。其中,灌木区 CO_2 日排放量最大,草本区次之,裸露地表区最小。结合地温连续观测资料,估算其年总量分别为886.28、444.93 $gC\ m^{-2}\ a^{-1}$ 和441.36 $gC\ m^{-2}\ a^{-1}$ 。金露梅灌丛区和草本区的系统呼吸熵 Q_{10} 分别为4.40、4.13,显著高于裸露地表区的3.16,表明前两者的系统呼吸的温度敏感性较强。2003—2010年8a高寒金露梅灌丛草甸的平均植被净初级生产力为468.55 $gC\ m^{-2}\ a^{-1}$,生态系统土壤呼吸量为441.36 $gC\ m^{-2}\ a^{-1}$,生态系统净生产力为27.19 $gC\ m^{-2}\ a^{-1}$,但年际变异较大。表明高寒金露梅灌丛草甸生态系统为弱碳汇区或者源汇平衡区,和国际广泛认可的焐度相关观测结果波动较为一致,表明利用该方法评估的系统净初级生产力具有一定的可信度。

References:

- [1] Tao B, Ge Q S, Li K R, Shao X M. Progress in the studies on carbon cycle in terrestrial ecosystem. *Geographical Research*, 2001, 20(5): 564-575.
- [2] Cannone N, Sgorbati S, Guglielmin M. Unexpected impacts of climate change on alpine vegetation. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 2007, 5(7): 360-364.
- [3] Sturm M, Schimel J, Michaelson G, Welker J M, Oberbauer S F, Liston G E, Fahnestock J, Romanovsky V E. Winter biological processes could help convert Arctic tundra to shrubland. *Bioscience*, 2005, 55(1): 17-26.
- [4] Knapp A K, Briggs J M, Collins S L, Archer S R, Bret-Harte M S, Ewers B E, Peters D P, Young D R, Shaver G R, Pendall E, Cleary M B. Shrub encroachment in North American grasslands: shifts in growth form dominance rapidly alters control of ecosystem carbon inputs. *Global Change Biology*, 2007, 14(3): 615-623.
- [5] Zhou H K, Zhou L, Zhao X Q, Shen Z X, Li Y N, Zhou X M, Yan Z L, Wei L. Study of formation pattern of below-ground biomass in *Potentilla fruticosa* shrub. *Acta Prataculturae Sinica*, 2002, 11(2): 59-65.
- [6] Wang Q J, Zhou X M, Zhang Y Q, Zhao X Q. Structure characteristics and biomass of *Potentilla Fruticosa* shrub in Qinghai-Xizang Plateau. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica*, 1991, 11(4): 333-340.
- [7] Li Y Q, Zhao H, Zhao X, Zhang T, Chen Y. Soil respiration, carbon balance and carbon storage of sandy grassland under post-grazing natural restoration. *Acta Prataculturae Sinica*, 2006, 15(5): 25-31.
- [8] Li Y N, Sun X M, Zhao X Q, Zhao L, Xu S X, Gu S, Zhang F W, Yu G R. Seasonal variations and mechanism for environmental control of NEE of CO_2 concerning the *Potentilla fruticosa* in alpine shrub meadow of Qinghai-Tibet Plateau. *Science in China (Series D: Earth Sciences)*, 2006, 36(SII): 163-173.
- [9] Li Y N, Zhao X Q, Cao G M, Zhao L, Wang Q X. Analyses on climates and vegetation productivity background at Haibei alpine meadow ecosystem research station. *Plateau Meteorology*, 2004, 23(4): 558-567.
- [10] Le Y Z, Zuo K C, Zhang J X, Zhao B L, Wang Z M, Guo J H. Soil type and basic characteristics at Haibei research station of Alpine Meadow Ecosystem // Xia W P, ed. *Alpine Meadow Ecosystem*. Lanzhou: Gansu People's Press, 1982: 19-32.
- [11] Dugas W A, Heuer M L, Mayeux H S. Carbon dioxide fluxes over bermudagrass, native prairie, and sorghum. *Agricultural and Forest Meteorology*, 1999, 93(2): 121-139.
- [12] Zhang J X, Cao G M, Zhou D W, Hu Q W, Zhao X Q. The carbon storage and carbon cycle among the atmosphere, soil, vegetation and animal in the *Kobresia humilis* alpine meadow ecosystem. *Acta Ecologica Sinica*, 2003, 23(4): 627-634.
- [13] Fang J Y, Ke J H, Tang Z Y, Chen A P. Implications and estimation of four terrestrial productivity parameters. *Acta Phytocologica Sinica*, 2001, 25(4): 414-419.
- [14] Raich J W, Tufekciogul A. Vegetation and soil respiration: correlations and controls. *Biogeochemistry*, 2000, 48(1): 71-90.
- [15] Li D, Cao G M, Hu Q W, Wu Q, Li Y M, Wang Y H. A primary study on CO_2 emission from alpine *Potentilla fruticosa* scrub meadow ecosystem. *Acta Agrestia Sinica*, 2005, 13(2):

- 144-148.
- [16] Lloyd J, Taylor J A. On the temperature dependence of soil respiration. *Functional Ecology*, 1994, 8(3): 315-323.
- [17] Strack J E, Pielke Sr R A, Liston G E. Arctic tundra shrub invasion and soot deposition: Consequences for spring snowmelt and near-surface air temperatures. *Journal of Geophysical Research*, 2007, 112: G04S44 doi:10.1029/2006JG000297.
- [18] Chapin F S III, Shaver G R, Giblin A E, Nadelhoffer K J, Laundre J A. Responses of arctic tundra to experimental and observed changes in climate. *Ecology*, 1995, 76(3): 694-711.
- [19] Chen P Q, Wang X K, Wang L M. Carbon Budget and Its Sink Promotion of Terrestrial Ecosystem in China. Beijing: Science Press, 2008.
- [20] Diemer M, Körner C. Transient enhancement of carbon uptake in an alpine grassland ecosystem under elevated CO₂. *Arctic and Alpine Research*, 1998, 30(4): 381-387.
- [21] Oberbauer S F, Gillespie C T, Cheng W, Sala A, Gebauer R, Tenhunen J D. Diurnal and seasonal patterns of ecosystem CO₂ efflux from upland tundra in the foothills of the Brooks Range, Alaska, USA. *Arctic and Alpine Research*, 1996, 28(3): 328-338.
- [22] Ren J Z, Liang T G, Lin H L, Feng Q S, Huang X D, Hou F H, Zou D F, Wang C. Study on grassland's responses to global climate change and its carbon sequestration potentials. *Acta Prataculturae Sinica*, 2011, 20(2): 1-22.
- [23] Baldocchi D D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems: past, present and future. *Global Change Biology*, 2003, 9(4): 479-492.
- [24] Zhao L, Li Y N, Xu S X, Zhou H K, Gu S, Yu G, Zhao X Q. Diurnal, seasonal and annual variation in net ecosystem CO₂ exchange of an alpine shrubland on Qinghai-Tibetan plateau. *Global Change Biology*, 2006, 12(10): 1940-1953.
- [25] McFadden J P, Eugster W, Chapin F S. A regional study of the controls on water vapor and CO₂ exchange in arctic tundra. *Ecology*, 2003, 84(10): 2762-2776.
- [26] Davidson E A, Richardson A D, Savage K E, Hollinger D Y. A distinct seasonal pattern of the ratio of soil respiration to total ecosystem respiration in a spruce-dominated forest. *Global Change Biology*, 2006, 12(2): 230-239.
- [27] Zhang L H, Song C C, Wang D X, Wang Y Y. Relationship of ecosystem respiration with temperature, nitrogen and plant in freshwater marshes. *Environmental Science*, 2007, 28(1): 1-8.
- [28] Boone R D, Nadelhoffer K J, Canary J D, Kaye J P. Roots exert a strong influence on the temperature sensitivity of soil respiration. *Nature*, 1998, 396(6711): 570-572.
- [29] Geng Y B, Luo G Q. Analysis of affecting factors and partitioning of respiration in a *Leymus chinensis* steppe in Inner Mongolia. *Acta Geographica Sinica*, 2010, 65(9): 1058-1068.

参考文献:

- [1] 陶波, 葛全胜, 李克让, 邵雪梅. 陆地生态系统碳循环研究进展. *地理研究*, 2001, 20(5): 567-575.
- [5] 周华坤, 周立, 赵新全, 沈振西, 李英年, 周兴民, 严作良, 刘伟. 金露梅灌丛地下生物量形成规律的研究. *草业学报*, 2002, 11(2): 59-65.
- [6] 王启基, 周兴民, 张堰青, 赵新全. 青藏高原金露梅灌丛的结构特征及其生物量. *西北植物学报*, 1991, 11(4): 333-340.
- [7] 李玉强, 赵哈林, 赵学勇, 张铜会, 陈银萍. 不同强度放牧后自然恢复的沙质草地土壤呼吸、碳平衡与碳储量. *草业学报*, 2006, 15(5): 25-31.
- [8] 李英年, 孙晓敏, 赵新全, 赵亮, 徐世晓, 古松, 张法伟, 于贵瑞. 青藏高原金露梅灌丛草甸净生态系统 CO₂ 交换量的季节变异及其环境控制机制. *中国科学 D 辑: 地球科学*, 2006, 36(增刊): 163-173.
- [9] 李英年, 赵新全, 曹广民, 赵亮, 王勤学. 海北高寒草甸生态系统定位站气候、植被生产力背景的分析. *高原气象*, 2004, 23(4): 558-567.
- [10] 乐炎舟, 左克成, 张金霞, 赵宝莲, 王在模, 郭建华. 海北高寒草甸生态系统定位站的土壤类型及其基本特点 // 夏武平. 高寒草甸生态系统. 兰州: 甘肃人民出版社, 1982: 19-33.
- [12] 张金霞, 曹广民, 周党卫, 胡启武, 赵新全. 高寒矮嵩草草甸大气-土壤-植被-动物系统碳素储量及碳素循环. *生态学报*, 2003, 23(4): 627-634.
- [13] 方精云, 柯金虎, 唐志尧, 陈安平. 生物生产力的“4P”概念、估算及其相互关系. *植物生态学报*, 2001, 25(4): 414-419.
- [15] 李东, 曹广民, 胡启武, 吴琴, 李月梅, 王迎红. 高寒灌丛草甸生态系统 CO₂ 释放的初步研究. *草地学报*, 2005, 13(2): 144-148.
- [19] 陈泮勤, 王效科, 王礼茂. 中国陆地生态系统碳收支与增汇对策. 北京: 科学出版社, 2008.
- [22] 任继周, 梁天刚, 林慧龙, 冯琦胜, 黄晓东, 侯扶江, 邹德富, 王翀. 草地对全球气候变化的响应及其碳汇潜势研究. *草业学报*, 2011, 20(2): 1-22.
- [27] 张丽华, 宋长春, 王德宣, 王毅勇. 沼泽湿地生态系统呼吸与温度、氮素及植物生长的相互关系. *环境科学*, 2007, 28(1): 1-8.
- [29] 耿元波, 罗光强. 内蒙古羊草草原呼吸的影响因素分析和区分. *地理学报*, 2010, 65(9): 1058-1068.

ACTA ECOLOGICA SINICA Vol.34, No.4 Feb., 2014 (Semimonthly)

CONTENTS

Frontiers and Comprehensive Review

- The bioavailability of dissolved organic carbon in the eutrophic lakes YE Linlin, KONG Fanxiang, SHI Xiaoli, et al (779)
- Plant species of the non-agricultural habitats in the lower reaches of the Yellow River plain agro-landscape
..... LU Xunling, LIANG Guofu, TANG Qian, et al (789)

Autecology & Fundamentals

- Manganese stress on the ultrastructures of a manganese tolerant plant, *Polygonum perfoliatum* L.
..... WANG Jun, WU Hui, XUE Shengguo, et al (798)
- Characteristics of arsenic (As) tolerance and accumulation in rice (*Oryza sativa* L.) genotypes with different radial oxygen loss
..... WU Chuan, MO Jingyu, XUE Shengguo, et al (807)
- Effects of water stress on physiological characteristics of different *Illicium lanceolatum* ecotypes under low light intensity
..... CAO Yonghui, ZHOU Benzhi, CHEN Shuanglin (814)
- Effect of branch number on the growth and development of *Morus alba* saplings ... HUAN Huihui, XU Xiao, LIU Gang, et al (823)
- Spatial distribution pattern and sampling technique for *Orthotylus* (*O.*) *sophorae* nymphs on *Sophora japonica*
..... ZHU Huiying, SHEN Ping, WU Jianhua, et al (832)
- Assessment of fungal diversity in apple replanted orchard soils by T-RFLP analysis
..... YIN Chengmiao, WANG Gongshuai, LI Yuanyuan, et al (837)
- Effects of dazomet on edaphon and growth of *Malus hupehensis* rehd. under continuous apple cropping
..... LIU Entai, LI Yuanyuan, HU Yanli, et al (847)
- Isolation, identification, and performance of two pyrene-degrading endophytic bacteria SUN Kai, LIU Juan, LI Xin, et al (853)

Population, Community and Ecosystem

- Effects of different temperatures on the growth and development of *Eotetranychus Kankitus* (Ehara)
..... LI Yingjie, WANG Ziyang, ZHANG Guohao, et al (862)
- Effect of available burrow densities of plateau pika (*Ochotona curzoniae*) on plant niche of alpine meadow communities in the
Qinghai-Tibet Plateau JIA Tingting, MAO Liang, GUO Zhenggang (869)
- Correlation between characteristics of *Reaumuria soongarica* communities and soil factors in the Sangong River basin
..... ZHAO Xuechun, LAI Liming, ZHU Linhai, et al (878)
- Effects of afforestation on soil microbial community structure in the arid valley of Minjiang River
..... WANG Weixia, LUO Da, SHI Zuomin, et al (890)
- Effects of reclamation on tidal flat and land use on soil microbial community
..... LIN Li, CUI Jun, CHEN Xueping, FANG Changming (899)
- Effects of *Pomacea canaliculata* on aquatic macrophyte community structure in paddy fields
..... ZHAO Benliang, ZHANG Jiaen, DAI Xiaoyan, et al (907)
- The adaptability and decontamination effect of four kinds of woody plants in constructed wetland environment
..... CHEN Yonghua, WU Xiaofu, HAO Jun, et al (916)
- Carbon budget of alpine *Potentilla fruticosa* shrubland based on comprehensive techniques of static chamber and biomass harvesting ...
..... LI Hongqin, LI Yingnian, ZHANG Fawei, et al (925)
- Effect of initial pH value on microbial Fe (III) reduction in alkaline and acidic paddy soils ... WU Chao, QU Dong, LIU Hao (933)

Landscape, Regional and Global Ecology

- Climate environmental change and stable carbon isotopes in age layers of *Tamarix* sand-hillocks in Kumtag desert
..... ZHANG Jinchun, YAO Tuo, LIU Changzhong, et al (943)

Resource and Industrial Ecology

- The critical factors of transpiration on muskmelon in plastic greenhouse ZHANG Dalong, CHANG Yibo, LI Jianming, et al (953)
- Ion absorption and distribution of symbiotic *Reaumuria soongorica* and *Salsola passerina* seedlings under NaCl stress
..... ZHAO Xin, YANG Xiaojun, SHI Yong, et al (963)
- The relationship between selected rhizosphere and non-rhizosphere soil properties and the quality of *Pyrola decorata*
..... GENG Zengchao, MENG Lingjun, LIU Jianjun (973)
- Spatial variation analysis of soil organic matter and nutrient factor for before and after planting crops
..... FANG Bin, WU Jinfeng (983)

Urban, Rural and Social Ecology

- Establishment and application of the index system for urban river health assessment
..... DENG Xiaojun, XU Youpeng, ZHAI Luxin, et al (993)
- Dynamic analysis of the ecological footprint and carrying capacity of tibet AN Baosheng, CHENG Guodong (1002)

Research Notes

- Responses of soil microorganisms and soil enzyme activities to different land use patterns in the water-level-fluctuating zone of
the Three Gorges Reservoir region MA Peng, LI Changxiao, LEI Ming, et al (1010)
- Effects of salt stress on growth and root development of two oak seedlings
..... WANG Shufeng, HU Yunxue, SUN Haijing, et al (1021)
- The effects of constant and variable thermal acclimation on thermal tolerance of the common giant toad tadpoles (*Bufo gargarizans*) ...
..... WANG Lizhi (1030)

《生态学报》2014 年征订启事

《生态学报》是由中国科学技术协会主管,中国生态学学会、中国科学院生态环境研究中心主办的生态学高级专业学术期刊,创刊于 1981 年,报道生态学领域前沿理论和原始创新性研究成果。坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,依靠和团结广大生态学科工作者,探索生态学奥秘,为生态学基础理论研究搭建交流平台,促进生态学研究深入发展,为我国培养和造就生态学科人才和知识创新服务、为国民经济建设和发展服务。

《生态学报》主要报道生态学及各分支学科的重要基础理论和应用研究的原始创新性科研成果。特别欢迎能反映现代生态学发展方向的优秀综述性文章;研究简报;生态学新理论、新方法、新技术介绍;新书评价和学术、科研动态及开放实验室介绍等。

《生态学报》为半月刊,大 16 开本,280 页,国内定价 90 元/册,全年定价 2160 元。

国内邮发代号:82-7,国外邮发代号:M670

标准刊号:ISSN 1000-0933 CN 11-2031/Q

全国各地邮局均可订阅,也可直接与编辑部联系购买。欢迎广大科技工作者、科研单位、高等院校、图书馆等订阅。

通讯地址:100085 北京海淀区双清路 18 号 电 话:(010)62941099; 62843362

E-mail: shengtaixuebao@rcees.ac.cn 网 址: www.ecologica.cn

本期责任副主编 董 鸣 编辑部主任 孔红梅 执行编辑 刘天星 段 靖

生 态 学 报
(SHENGTAI XUEBAO)
(半月刊 1981 年 3 月创刊)
第 34 卷 第 4 期 (2014 年 2 月)

ACTA ECOLOGICA SINICA
(Semimonthly, Started in 1981)
Vol. 34 No. 4 (February, 2014)

编 辑	《生态学报》编辑部 地址:北京海淀区双清路 18 号 邮政编码:100085 电话:(010)62941099 www.ecologica.cn shengtaixuebao@rcees.ac.cn	Edited by	Editorial board of ACTA ECOLOGICA SINICA Add: 18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China Tel: (010)62941099 www.ecologica.cn shengtaixuebao@rcees.ac.cn
主 编	王如松	Editor-in-chief	WANG Rusong
主 管	中国科学技术协会	Supervised by	China Association for Science and Technology
主 办	中国生态学学会 中国科学院生态环境研究中心 地址:北京海淀区双清路 18 号 邮政编码:100085	Sponsored by	Ecological Society of China Research Center for Eco-environmental Sciences, CAS Add: 18, Shuangqing Street, Haidian, Beijing 100085, China
出 版	科 学 出 版 社 地址:北京东黄城根北街 16 号 邮政编码:100717	Published by	Science Press Add: 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China
印 刷	北京北林印刷厂	Printed by	Beijing Bei Lin Printing House, Beijing 100083, China
发 行	科 学 出 版 社 地址:东黄城根北街 16 号 邮政编码:100717 电话:(010)64034563 E-mail: journal@ cspg. net	Distributed by	Science Press Add: 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China Tel: (010)64034563 E-mail: journal@ cspg. net
订 购	全国各地邮局	Domestic	All Local Post Offices in China
国外发行	中国国际图书贸易总公司 地址:北京 399 信箱 邮政编码:100044	Foreign	China International Book Trading Corporation Add: P.O.Box 399 Beijing 100044, China
广告经营 许 可 证	京海工商广字第 8013 号

ISSN 1000-0933
CN 11-2031/Q

国内外公开发行

国内邮发代号 82-7

国外发行代号 M670

定价 90.00 元