DOI: 10.5846/stxb201801300252

陈超男,朱连奇,田莉,李新鸽.秦巴山区植被覆盖变化及气候因子驱动分析.生态学报,2019,39(9): - .

Chen C N, Zhu L Q, Tian L, Li X G. Spatial-temporal changes in vegetation characteristics and climate in the Qinling-Daba Mountains. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(9): - .

秦巴山区植被覆盖变化及气候因子驱动分析

陈超男¹,朱连奇¹,田莉^{2,3,*},李新鸽¹

1 河南大学环境与规划学院,开封 475004

2 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101

3 千烟洲生态试验站,生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京 100101

摘要:基于 GIMMS_{3g}(1982—2015 年)、SOPT VEG(1998—2015 年)和 MODIS(2000—2017 年)3 种 NDVI 数据集,结合气温、降水和 DEM 数据,利用平均法、线性趋势分析法和相关分析法等方法,分析了秦巴山区植被覆盖的时空变化特征及其与气候因子的相关性,并以秦岭山地(陕西境内)为重点区域,分析了植被覆盖的海拔梯度差异及其与气候因子的垂直响应模式。结果表明:①1982—2017 年秦巴山区 3 种植被 NDVI 均呈显著增加趋势,其中 1982—2015 年 NDVI-GIMMS_{3g} 增速为 1.4%/10a,1982—2000 年 NDVI-GIMMS_{3g} 较低且波幅较大,增速为 1.6%/10a,年际间变异系数(CV)为 0.04,2000—2015 年 NDVI-GIMMS_{3g} 较高且稳定增加,增速为 1.7%/10a,CV 为 0.02;2000—2015 年 NDVI-SPOT VEG 增速为 4.1%/10a,CV 为 0.04;2000—2017 年 NDVI-MODIS 年增速为 4.5%/10a,CV 为 0.04;②2000—2017 年(MODIS 数据)秦巴山区植被覆盖高值区主要为秦岭、米仓山和神农架等山地,低值区主要为西部高海拔区和东部低海拔区等区域;秦岭山地随海拔升高植被 NDVI 先升高后降低;③2000—2017 年(MODIS 数据)秦巴山区植被覆盖增加和减少的区域分别占 96.90%和 3.10%,低海拔地区较高海拔地区变化剧烈;秦岭山地低海拔带植被覆盖较高海拔带增加显著;④2000—2015 年(SOPT VEG 数据)秦巴山区增温效应显著,增速为 0.49℃/10a,植被覆盖与温度以正相关为主,与降水正负相关并存,与温度的相关性较降水的相关性高;秦岭山地高海拔带植被对温度变化更敏感,低海拔带对降水更敏感。

关键词:植被覆盖;NDVI;时空格局;气候变化;秦巴山区

Spatial-temporal changes in vegetation characteristics and climate in the Qinling-Daba Mountains

CHEN Chaonan¹, ZHU Lianqi¹, TIAN Li^{2,3,*}, LI Xinge¹

1 College of Environment and Planning, Henan University, Kaifeng 475004, China

2 Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

3 Qianyanzhou Ecological Research Station, Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

Abstract: Vegetation and its characteristics are largely controlled by regional landforms and climate. The Qinling-Daba Mountains are located in a transitional zone between the subtropical and the warm temperate climate in China, where a complex relationship between vegetation and climate exists. To explore this relationship, we used GIMMS_{3g}(1982—2015), SPOT VEGETATION (SPOT VEG) (1998—2015), and MODIS (2000—2017), the DEM, and climate data (temperature and precipitation) to quantify the spatiotemporal changes in vegetation in the Shaanxi Province of the mountains. We found that: (1) NDVI of the GIMMS_{3g} database increased significantly at a rate of 1.4%/10a from 1982 through 2015. For

基金项目:国家自然科学基金项目(41671090);科技基础资源调查专项(2017FY100902)

收稿日期:2018-01-30; **网络出版日期:**2018-00-00

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: tianli@igsrr.ac.cn

1982—2000, NDVI of GIMMS_{3g} was low but highly variable (linear tendency 1.6%/10a, CV = 0.4) by year, whereas a stable increasing trend appeared after 2000 (linear tendency 1.7%/10a, CV = 0.2). For 2000—2015, the increasing rate was 4.1%/10a (CV = 0.04) for NDVI of the SPOT VEG database. For 2000—2015, the increasing rate was 4.5%/10a (CV = 0.04) for NDVI of the MODIS database. (2) High vegetation coverage was found from MODIS for 2000—2017, primarily in the mountainous regions (e.g., Qinling Mountains, Micang Mountains, and Shennongjia), whereas low cover was detected at high altitudes in the west and low altitudes in the east. For the Qinling Mountains, NDVI increased and decreased with elevation. (3) The increase and decrease of vegetation coverage during 2000—2017 accounted for 96.90% and 3.10% of the total land area, respectively. Meanwhile, the vegetation cover at low altitude appeared more protected than that in the high-altitude areas. (4) Annual mean temperature in the study area increased by 0.49°C/10a during 1982—2015, whereas the precipitation showed no significant change. For 2000—2015, we found that vegetation cover (based on SPOT VEG and climate data) was positively correlated with temperature, but not with precipitation. The correlation analysis further demonstrated that vegetation cover was more strongly correlated with temperature in the Qingling-Daba Mountains. In the Qinling Mountains, the correlation was significant between NDVI and temperature in the high-altitude areas, and between NDVI and precipitation in low-altitude areas.

Key Words: vegetation cover; NDVI; spatial-temporal patterns; climate change; Qingling-Daba Mountains

植被作为陆地生态系统的主体,在物质循环和能量流动中起着重要作用,是联结大气、水分和土壤关系的自然纽带,被认为是全球变化研究中的“指示器”^[1-3],其动态变化受土壤、气候、人类活动等多重因素的共同影响,气候因子中以温度和降水的影响最为直接^[4-7]。归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)能较好的反映区域植被覆盖与植被生长状况,在全球范围内得到广泛应用^[8-11]。

近百年来,气候系统正经历以全球变暖为主要特征的显著变化,尤其是在北半球高海拔、高纬度(如蒙古高原、北极)等自然过渡带与生境脆弱区,温度升高显著高于全球温度升高的平均水平^[12-13],由这种变化所引起的陆地生态系统效应已受到人类的高度重视。山地因在较小的空间具有浓缩的环境梯度和高度异质化的生境,对气候变化的敏感性仅次于极地,亦成为全球变化背景下研究植被动态对气候响应的热点区域^[14-16]。

秦巴山区(102°24'—112°40'E 和 30°43'—35°29'N)西接青藏高原东缘,东临华北平原,汉江以北为秦岭,南为大巴山,中部分布有汉中盆地和安康盆地。该区是中国地理格局的重要枢纽、大尺度东西向的生态廊道,又是最高级别的生态安全保障区、扶贫开发重点区,以复杂、多样、独特的自然环境孕育了丰富的天然动植物资源,对其生态环境变化的研究具有重要意义。作为气候变化的敏感区和生境脆弱区,秦巴山区植被覆盖变化及其驱动力研究是全球变化研究领域的重点内容之一,国内学者在这方面已做了大量工作且取得一定成果^[14, 17-19]。雒新萍^[20]研究秦巴山区 1982—2003 年植被年均 NDVI 与气候因子的相关性,认为秦巴山区植被覆盖与温度的相关性高于降水,这与刘宪锋等^[21]的研究结果相反。崔晓临等^[22-23]分析了 2000—2009 年秦岭山地植被覆盖与温度的响应,发现研究时段内秦岭植被覆盖整体呈增加趋势,高海拔植被 NDVI 对温度变化更为敏感。邓晨辉等^[24]则指出 2000—2015 年间秦岭覆盖植被变化主要受人类活动影响,其次是降水与温度。张清雨等^[25]对秦岭山地林地类型时空变化格局进行研究,发现 1978—2006 年研究区林地面积增加但破碎化日益严重,经济发展、适耕地面积等是林地类型转换的主要驱动力。然而,目前关于秦巴山区植被覆盖变化及其驱动力研究主要集中于陕西省境内^[21-22, 26-28],对西秦岭、伏牛山和大巴山研究较少,且前人对秦巴山区植被覆盖变化的主要气候驱动因子争议较大,大多仅用一种植被数据对植被覆盖变化进行探究,全面、准确评价整个秦巴山区植被覆盖时空变化特征及其对气候因子的响应机制、整合碎片化、局域化资料显得尤为重要与紧迫。鉴于此,本文使用 GIMMS_{3g}(1982—2015 年)、SPOT VEG(1998—2015 年)、MODIS(2000—2017 年)3 种不同时空分辨率的 NDVI 数据集,对秦巴山区 1982—2017 年植被覆盖的时空变化特征及其与主要气候因子的相关性进行研究,并以秦岭山地(陕西境内)为重点,分析了植被覆盖的海拔梯度差异及其与气候因子的

垂直响应模式,以期在全球气候变化的背景下为山地植被保护与恢复提供科学依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

秦巴山区(图 1)地跨甘、川、陕、渝、鄂和豫等 6 个省市,东西长约 1000 km,南北宽约 300 km,总面积约为 30 万 km²。以秦岭-大巴山为主体的秦巴山区是长江-黄河流域的分水岭,也是我国南北过渡带的主体区。过渡带的地理位置使得该区植被区系复杂,秦岭北坡主要为暖温带落叶阔叶林,南坡主要为混有常绿树种的落叶阔叶林,大巴山北坡与秦岭南坡植被相似,南坡则为典型的常绿阔叶林,随海拔升高,气候、植被等呈明显的垂直地带性分布^[29-30]。该地区年平均气温介于 12—16℃,年平均降水量介于 709—1500 mm。因其地理环境的高度复杂性、生物多样性和气候敏感性,该区已成为我国地学、生物学的天然实验室。

图 1 秦巴山区地理位置及其地形示意图

Fig.1 Location and topography of Qinling-Daba Mountains

1.2 数据来源与预处理

为了延长对区域植被覆盖变化的研究时间,避免遥感数据本身的机械误差,本研究采用了三套不同时空分辨率的植被遥感数据集。其中 GIMMS_{3g} V1.0(1982—2015 年)数据来源于美国全球检测与模型组(Global Inventor Modeling and Mapping Studies, GIMMS) 15 d 合成的空间分辨率为 8 km(<https://ecocast.arc.nsd.gov>) 的 NDVI 数据集; SPOT VEG(1998—2015 年)数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心提供的逐月 NDVI 数据集(<http://www.resdc.cn>),空间分辨率为 1 km; MODIS(2000—2017 年)数据来源于美国国家航空航天局(NASA)16 d 合成的空间分辨率为 250 m MOD13Q1 产品。利用 MRT(MODIS Reprojection Tool)工具对 MODIS 数据集进行拼接、剪裁等预处理,提取 NDVI 影像。为减少云、气溶胶、视角等影响, GIMMS_{3g} 和 MODIS 数据均采用最大值合成法 MVC(Maximum Value Composites)^[31]得到月 NDVI。

气象数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(<http://www.resdc.cn>)提供的中国年降水量、年平均气温空间插值数据集,空间分辨率为 1 km。

DEM 数据(空间分辨率为 30 m)来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(<http://datamirror.csdb.cn>)。

1.3 研究方法

采用均值法得到年均 NDVI 和多年累计平均 NDVI, 为了避免遥感数据本身带来的误差, 将年均 NDVI 进行 z-score 标准化处理, 利用线性趋势分析法探讨研究区植被覆盖年际变化特征, 并基于像元尺度的线性趋势分析法对多年年均 NDVI 进行处理, 以回归方程斜率表征不同区域植被覆盖空间变化特征, 斜率为正时, 植被呈改善趋势 (NDVI 随时间推移而增加), 斜率为负时, 植被呈退化趋势 (NDVI 随时间推移而降低), 且斜率绝对值越大, 植被覆盖变化趋势越明显; 最后采用相关分析法来探明区域植被覆盖变化对气候因子的响应状况。另外, 水热组合、土壤养分等条件随海拔变化导致植被覆盖有很大的差异^[32-35], 本文以秦岭山地 (陕西境内) 为重点区, 参考《秦岭山地自然地理》^[36], 根据秦岭植被分布的垂直带性将海拔划分为 6 个梯度 (<500 m, 500—1000 m, 1000—1600 m, 1600—2700 m, 2700—3200 m, >3200 m) 以观察植被覆盖的垂直变化特征。

由于本文采用了 3 种不同时空分辨率的植被遥感数据集, 根据研究需要, 在分析秦巴山区植被覆盖长时间序列 (1982—2017 年) 年际变化特征时采用 3 种数据, 这样既能对各种遥感数据质量互相验证又延长了对区域植被变化的研究时段; 分析植被覆盖空间分布、空间变化 (包括不同海拔带) 特征时采用高分辨率的 MODIS 数据; 分析植被覆盖变化对气候因素的响应时采用和气象数据具有相同空间分辨率的 SPOT VEG 数据。

2 结果与分析

2.1 植被 NDVI (GIMMS_{3g}_{1982—2017}、SPOT VEG_{1998—2015} 和 MODIS_{2000—2017}) 年际变化特征

将秦巴山区 1982—2017 年 (GIMMS_{3g}、SPOT VEG 和 MODIS 数据) 年均 NDVI 进行标准化处理, 用其年际变化趋势代表研究区植被覆盖年际变化趋势 (图 2)。

图 2 1982—2017 年秦巴山区 NDVI 变化趋势

Fig.2 The trends of the GIMMS_{3g}_{1982—2015}, SPOT VEG_{1998—2015} and MODIS_{2000—2017} in Qinling-Daba Mountains during 1982—2017

CV: 变异系数, Coefficient of Variation; G1982—2015: 1982—2015 年 GIMMS_{3g} NDVI 数据, GIMMS_{3g} NDVI during 1982—2015; G1982—2000: 1982—2000 年 GIMMS_{3g} NDVI 数据, GIMMS_{3g} NDVI during 1982—2000; G2000—2015: 2000—2015 年 GIMMS_{3g} NDVI 数据, GIMMS_{3g} NDVI during 2000—2015; S2000—2015: 2000—2015 年 SPOT VEG NDVI 数据, SPOT VEG NDVI during 2000—2015; M2000—2017: 2000—2017 年 MODIS NDVI 数据, MODIS NDVI during 2000—2017

结果表明, 基于不同分辨率的 3 种遥感数据在重叠年份的年际变化趋势一致, 充分证明了该区域遥感数据的可靠性, 适用于分析秦巴山区植被覆盖的时空变化格局。2000—2017 年间, 三种遥感数据 NDVI 均呈现稳定增加趋势, 且年际波动表现为较好的一致性, GIMMS_{3g}_{2000—2015}、SPOT VEG_{2000—2015} 和 MODIS_{2000—2017} 增速分别

为 2.2%/10a ($P < 0.001$)、4.1%/10a ($P = 0.001$) 和 4.5%/10a ($P < 0.001$), 由于传感器自身差异, GIMMS_{3g} 数据增速略小于 SPOT VEG 和 MODIS 数据增速, 但整体上可以准确显示研究区植被覆盖变化趋势。由 GIMMS_{3g} 数据可知, 秦巴山区 1982—2015 年间植被覆盖整体为增加趋势, 增速为 1.4%/10a, 其中 1982—2000 年增速为 1.6%/10a ($P = 0.098$), 植被覆盖变化主要受气候因子影响, NDVI 水平较低且年际波动较大, 仅 1990、1991、1995、1997 和 1998 年 NDVI 高于平均值, 其余年份均低于平均水平, 在 1998—2000 年间 NDVI 迅速下降 (与 SPOT VEG 数据表现一致), 该时间段为研究区实施退耕还林工程初期, 耕地面积急剧减少^[37], 导致植被覆盖度降低; 2000 年之后, 生态保护工程成效显著, 在人为作用的影响下, 植被覆盖呈稳定增加趋势 (1.7%/10a, $P < 0.001$), 除 2005、2011、2012 年有较大下降, 其余年份 NDVI 值均处于较高水平且稳定上升。计算 GIMMS_{3g} 1982—2000 NDVI 年际变异系数 (CV) 为 0.04, 2000—2015 年为 0.02, SPOT VEG_{2000—2015} 和 MODIS_{2000—2017} CV 值分别为 0.04 和 0.05, 对比不同时期 GIMMS_{3g} 数据的 CV 值可知, 2000 年之前, 秦巴山区植被覆盖变化受气候因素影响年际波动较大, 而 2000 年之后, 在人为因素 (如植树造林工程) 影响下稳定增加。

2.2 植被 NDVI (MODIS_{2000—2017}) 空间分布特征

由于植被类型、土地利用、气候因素等不同, 秦巴山区 2000—2017 年植被覆盖呈现明显的区域差异 (图 3a), NDVI 介于 0.27—0.74 之间, 平均值为 0.59。对比地形图 (图 1) 可以发现, 研究区植被覆盖最好的区域主要为太白山、米仓山、雪宝顶和神农架等山地, NDVI 达到 0.60—0.74, 这些区域植被覆盖以森林为主, 植被组成主要有常绿阔叶林、落叶阔叶林以及暖温带针阔叶林等; 研究区中部的汉中盆地土地利用类型主要为农耕地及人工园林, 与林地相比, NDVI 有所下降, 集中分布于 0.4—0.5 之间; 研究区东北部海拔较低, 人口密集, 植被覆盖受人为干扰严重相对较低, NDVI 多分布于 0.30—0.40 之间, 另外, 西秦岭 (研究区西北、西南边缘的岷县、武都县以及西和县) 以及研究区海拔最高的西南部等地区, 因受水热条件制约, 植被类型以亚高山落叶阔叶灌丛、禾草、杂草草甸为主, 植被覆盖度相对较差, NDVI 小于 0.35。

图 3 2000—2017 年秦巴山区 NDVI 空间分布 (a) 及垂直分布特征 (b)

Fig.3 Spatial distribution (a) and vertical characteristics (b) of NDVI in Qinling-Daba Mountains during 2000—2017

由图 3b 可以看出, 秦岭山地随着海拔的升高, NDVI 值呈先增大后减小的变化特征, 海拔 < 500 m 时, NDVI 相对较小且分布分散, 平均值为 0.52, 主要介于 0.50—0.60 之间, 占该海拔带总面积的 55.50%, 其次为 0.40—0.50 和 0.60—0.70, 所占比例分别为 23.62%、13.52%, 小于 0.30 和 0.30—0.40 之间分布较少; 500—1000 m, NDVI 有所上升且分布较为集中, 平均值为 0.59, 主要介于 0.50—0.6 与 0.6—0.7 之间, 所占比例分别为 41.69%、49.21%, 0.30—0.40 分布较少; 1000—1600 m, NDVI 继续上升, 平均值为 0.63, 介于 0.60—0.70 之间的比例为 71.13%; 1600—2700 m, 平均值为 0.67, 植被覆盖状况最好且分布最为集中, NDVI 主要介于 0.60—0.70 之间, 所占比例为 71.47%, 大于 0.7 的分布比例次之; 2700—3200 m, NDVI 略有下降, 平均值为 0.59, 0.6—0.7 之间所占比例为 39.00%; > 3200 m 时, NDVI 最小, 平均值为 0.34, 小于 0.4 的区域占 78.11%。

植被分布受多种因素的影响, 其中人为因素与气候因素最为重要^[38-41]。海拔小于 500 m 时, 植被类型主要为农耕栽培植被, 500—1600 m 海拔带植被覆盖有所升高, 但由于受人类活动影响, 不少山坡已被开垦, 原

始森林植被遭到破坏,植被类型主要为人工林地,植被组成单一^[42],且山麓气候干燥,故植被覆盖较差;海拔升高至 1600—2700 m 时,人为干扰较小,森林植被保存完好,水热条件适宜,植被覆盖状况最好,植被组成主要为针阔叶混交林^[36];2700—3200 m 为亚高山植被带,植被成分单纯,NDVI 值迅速下降,海拔高于 3200 m 时,受温度限制,植被主要由灌丛和草甸组成,NDVI 值最小。

2.3 植被 NDVI (MODIS_{2000—2017}) 空间变化特征

利用线性趋势分析法对 2000—2017 年各年均 NDVI 值与其相对应的的时间序列进行逐项元回归分析,将其回归斜率划分为五类,用以表征该时间段内植被覆盖变化趋势,划分标准及结果见图 4a、表 1。结果表明,18 a 间秦巴山区植被覆盖改善的区域面积约 20.07 万 km², 占总面积的 96.90%,退化的区域面积约 0.93 万 km², 所占比例为 3.10%,即研究区植被覆盖整体呈增加趋势。其中轻度改善的面积最大,为 13.79 万 km² (45.97%),中度改善的面积次之,为 13.42 万 km² (44.73%),明显改善的区域面积为 1.86 万 km² (6.19%),之后为轻度退化和中度退化,面积分别为 0.71 万 km² (2.35%) 和 0.14 万 km² (0.47%),明显退化的面积最小,为 0.09 万 km² (2.9%)。从空间分布来看,植被明显改善的区域主要集中在西秦岭(甘南的礼县、武都县、西和县),另外,安康中部和十堰北部等低海拔区域植被覆盖也以明显改善为主;中度改善的区域较为零散,遍布整个研究区;轻度改善的区域主要集中在研究区北部高海拔区域,太白山、米仓山和神农架等山地也多表现为轻度改善;植被退化的面积较少,主要集中在研究区西南部的少数地区,如成都北部和德阳北部的交界处,汉中盆地及南阳西部边缘区域也有零星分布。由上述分析可得,近 18 a 秦巴山区植被覆盖整体呈改善趋势,以轻度改善和中度改善为主体,变化斜率较大的区域主要集中在海拔相对较低、人类活动较为频繁的地区,高海拔区域主要受气候因素影响,植被覆盖变化主要表现为基本不变(轻度退化、轻度改善)。

图 4 2000—2017 年秦巴山区 NDVI 空间及垂直变化特征

Fig.4 Spatial pattern (a) and vertical characteristics (b) of NDVI change trends in Qinling-Daba Mountains during 2000—2017

* 和 ** 分别为通过置信水平为 95% 和 99% 的显著性检验

表 1 2000—2017 年秦巴山区植被变化趋势分类标准及结果统计

Table 1 The classification protocol for vegetation coverage changes statistical result in Qinling-Daba Mountains during 2000—2017

类型 Type	分类标准 Classification protocol	面积/万 km ² Area	面积比例/% Area percent
明显退化 Significant degradation	Slope < -0.002	0.09	0.29
中度退化 Moderate degradation	-0.002 < Slope < -0.001	0.14	0.47
轻度退化 Mild degradation	-0.001 < Slope < 0	0.71	2.35
轻度改善 Mild improvement	0 < Slope < 0.001	13.79	45.97
中度改善 Moderate improvement	0.001 < Slope < 0.002	13.42	44.73
明显改善 Significant improvement	Slope > 0.002	1.86	6.19

为进一步探究海拔对植被覆盖变化的影响,统计秦岭地区不同海拔带多年来植被覆盖的变化情况,结果显示,不同海拔带植被覆盖均呈增加趋势,但增速有所不同(图 4b)。海拔 <500 m、500—1000 m、1000—

1600 m时,植被类型以农作物与人工园林为主,植被覆盖变化主要受人类活动(耕作制度、灌溉及施肥方式、退耕还林政策等)影响,NDVI 增速较大,分别为 4.8%/10a、5.7%/10a、5.1%/10a,且均通过了置信水平为 99%的显著性检验;海拔在 1600—2700 m 与 2700—3200 m 时,植被覆盖变化受人为干扰较小,主要受温度和降水等气候因子影响,在全球变暖的大背景下,该区植被覆盖有所增加,但与低海拔相比增速减小,分别为 3.2%/10a($P<0.001$)、2.6%/10a($P<0.05$);随着海拔的继续升高(>3200 m),NDVI 变化不显著,增速为 1.2%/10a($P>0.05$)。进一步说明人为因素对植被覆盖影响的速度大于气候因素对植被覆盖影响的速度,人类活动可在短时间内改变区域植被覆盖格局。

2.4 植被 NDVI(SPOT VEG_{1982—2015})变化的气候因子驱动力分析

温度和降水是影响植被覆盖最直接、重要的气候因子^[7],在全球气候变化的大背景下,1982—2015 年秦巴山区以增温效应为主,温度增加速率为 0.49℃/10a($R=0.826$, $P<0.001$, $n=34$),增湿效应不显著(图 5a、5b)。在这种情况下,本文以年为单位,逐项元分别计算 2000—2015 年植被 NDVI 与年均温和年降水的相关系数,得到其空间分布图(图 5c、5d),用以分析研究区植被覆盖对气候因子的响应模式,并对相关系数进行分类(表 2)。结果显示,研究区植被覆盖变化与温度主要为正相关,与降水为正负相关并存,与温度的相关性较降水高。

2000—2015 年秦巴山区植被覆盖变化与温度的平均相关系数为 0.22,区域正相关系数和负相关系数所占比例分别为 88.81%和 11.19%(图 5c,表 2),即在研究时段内,研究区植被覆盖变化与温度主要呈正相关。在正相关区域中,低度正相关的区域占总面积的 57.12%,分布于整个研究区;中度正相关和高度正相关比例分别为 10.61%、0.58%,主要分布在太白山、米仓山和神农架等森林面积较大的高海拔区域,这些地区降水充沛但温度较低,热量为该区域植被生长的主要限制性因子,温度升高有利于植被覆盖的增加。负相关的区域面积较小,主要分布在四川北部的松潘县、平武县和茂县等地区,另外,豫西地区人口密集、人为干扰较大的洛宁县、栾川县、内乡县一带也与温度呈负相关,但相关性均不显著。

相比之下,植被覆盖变化与降水的正负相关性较为平衡,平均相关系数为 0.03,正相关与负相关所占比例分别为 41.53%和 58.47%。其中呈低度正相关的区域比例为 49.14%,主要分布在研究区北部和南部边缘地区,中度和高度正相关的区域比例分别为 7.86%和 1.66%,主要位于研究区西北部的临潭县、岷县和温县等降雨较少的地区,这些地区温度较高,土壤水分蒸发严重,降水增加将促进植被生长;呈低度负相关和中度负相关的区域比例为 34.98%和 6.55%,主要集中在研究区东部城镇化水平较高的大面积低海拔区域,另外,西南部的高海拔区域也呈负相关,这些区域降水量相对较多,植物生长所需的水分足够,降水增加将导致光照强度下降、光合作用减弱,从而抑制植被的生长^[43]。

表 2 2000—2015 年秦巴山区 NDVI 与温度、降水相关系数分类标准及结果统计

Table 2 The classification standard for correlation coefficient among NDVI, temperature and precipitation statistical result in Qinling-Daba Mountains during 2000—2015

相关性 Correlation	相关系数 Correlation coefficient	面积比例/% Area percent	
		温度 temperature	降水 precipitation
中度负相关 Moderate negative correlation	< -0.3	0.58	6.55
低度负相关 Mild negative correlation	-0.3—0.0	10.61	34.98
低度正相关 Mild positive correlation	0.0—0.3	57.12	49.14
中度正相关 Moderate positive correlation	0.3—0.5	26.62	7.68
高度正相关 Significant positive correlation	> 0.5	5.07	1.66

不同海拔带植被覆盖变化对气候因子的响应具有明显的差异性(图 5e、5f)。结果表明,随着海拔的升高,植被覆盖与温度的相关性出现由负到正的转变。海拔小于 1600 m 时,植被 NDVI 与温度主要呈负相关,但均未通过显著性检验,1000—1600 m 海拔带与温度相关系数最大;海拔在 1600—3200 m 时,相关性转为正相关,2700—3200 m 时,相关系数略有上升,>3200 m 时,相关系数最大为 0.35,且通过了置信水平为 90%的

图5 秦巴山区气温距平(a)、降水距平百分率(b)变化趋势,NDVI与温度(c)、降水(d)与的相关系数分布以及对温度(e)、降水(f)的垂直响应模式

Fig.5 The change trends of temperature anomaly (a), precipitation anomaly percentage (b); the spatial distribution of correlation among NDVI with temperature (c) and precipitation (d); the correlation among NDVI and temperature (e) and precipitation (f) at different altitudes in Qinling-Daba Mountains during 2000—2015

* 为通过置信水平为90%的显著性检验

显著性检验,即高海拔区域植被对温度变化更为敏感;与温度相反,随着海拔的升高,NDVI与降水的相关性出现由正到负的转变,海拔在低于2700 m时两者为负相关,高于2700 m时两者为正相关,低海拔区域相关系数更大,但不同海拔带相关性均未通过显著性检验。造成这种现象的原因主要为:在低海拔区域,植被覆盖类型主要为农作物和人工园林,植被覆盖与人类活动的相关性高于与气候因子的相关性,且栽培植被对水分要求较高,因此与降水呈正相关,随着海拔的升高,降水增加而温度降低,植被生长主要受热量条件限制,因此与温度呈正相关。

3 结论

(1)时间变化上,1982—2017年3种NDVI遥感数据在秦巴山区均呈显著上升趋势。1982—2015年NDVI-GIMMS_{3g}增速为1.4%/10a,其中1982—2000年NDVI-GIMMS_{3g}整体较低且波动幅度较大,增速为1.6%/10a,年间变异系数(CV)为0.04,2000年后NDVI较高且呈稳定增加状态,增速为1.7%/10a,CV为0.02;

2000—2015 年 NDVI-SPOT VEG 增速为 4.1%/10a, CV 为 0.04; 2000—2017 年 NDVI-MODIS 增速为 4.5%/10a, CV 为 0.05。

(2) 空间分布上, 2000—2017 年 (MODIS 数据) 秦巴山区高植被覆盖区主要为太白山、米仓山、神农架等山地, 低植被覆盖区主要为研究区西部的高海拔区和东部受人为干扰严重的低海拔区; 随海拔升高, 秦岭山地 NDVI 呈先增加后减少的变化趋势。

(3) 空间变化上, 2000—2017 年 (MODIS 数据) 秦巴山区植被覆盖增加的区域大于减少的区域, 增加和减少的区域分别占总面积的 96.90% 和 3.10%, 低海拔区域变化显著, 高海拔区域基本不变; 秦岭山地不同海拔梯度带植被覆盖均呈增加趋势, 低海拔增速较高海拔大。

(4) 1982—2015 年 (SPOT VEG 数据) 秦巴山区增温效应显著, 增速为 0.49°C/10a, 增湿效应不显著; 2000—2015 年研究区植被覆盖与温度以正相关为主, 主要分布在山地等降水较多的地区; 与降水为正负相关性并存, 正相关主要分布在研究区西北部降水较少的半干旱区, 负相关主要分布在东部城镇化水平较高的低海拔区域; 秦岭山地随着海拔的升高, 植被覆盖与温度的相关系数呈由负到正的转变, 高海拔区域对温度更敏感, 与降水的相关系数呈由正到负的转变, 低海拔区对降水更敏感。

研究结果表明, 1982—2017 年秦巴山区植被覆盖呈显著增加趋势, 1982—2000 年植被 NDVI 较低且年际波动大, 2000 年后植被 NDVI 较高且稳定增加。植被动态变化受气候、人为和历史等多种因素共同影响, 在研究时段内, 研究区温度和降水均呈增加趋势, 增温效应尤为明显, 但对 2000—2015 年植被覆盖与气温和降水进行相关分析, 发现植被覆盖与温度以正相关为主, 与降水为正负相关并存, 且高海拔区域植被对温度变化更为敏感, 低海拔区域对降水更为敏感, 这与以往的研究结果相似^[13,20,22,27,36], 但无论是气温还是降水, 呈明显相关的区域面积并不是很大^[44], 造成这种现象的可能性主要有以下几点: 首先, 气候虽为植被覆盖变化的决定性因子, 但两者的相关性受研究时段和空间尺度影响^[5], 研究的时空尺度不同, 相关系数将存在较大的差异性; 其次, 植被覆盖变化对气候的响应模式存在显著的空间差异性, 并可能存在一定的滞后性^[14,45-47], 本文仅研究了年均温、年降水量对植被 NDVI 的影响, 未对其滞后性进行分析; 另外, 有研究表明, 近年来植被覆盖变化的主要驱动力已由气候因素转为人为因素^[48], 人类活动能在短时间内改变区域环境, 退耕还林、植树造林等生态保护工程可快速增加区域植被覆盖^[21,49-50], 自 2000 年后, 研究区全面实施退耕还林政策, 林地增加面积为 $2.54 \times 10^6 \text{ hm}^2$, 约占全国退耕还林总面积的 10%^[37], 植被覆盖变化受人为因素干扰较大。因此, 秦巴山区植被覆盖变化对不同时段气候因子的响应以及定量分析人为因素 (社会经济、城市扩张等) 对植被覆盖的影响是以后工作的重点内容, 以期更为全面的揭示秦巴山区植被覆盖对气候因素与人为因素的响应机制, 为山地植被保护和恢复提供科学依据。

参考文献 (References):

- [1] Braswell B H, Schimel D S, Linder E, Moore III B. The response of global terrestrial ecosystems to interannual temperature variability. *Science*, 1997, 278(5339): 870-873.
- [2] Buitenwerf R, Rose L, Higgins S I. Three decades of multi-dimensional change in global leaf phenology. *Nature Climate Change*, 2015, 5(4): 364-368.
- [3] Verbeeck H, Kearsley E. The importance of including lianas in global vegetation models. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2016, 113(1): E4-E4.
- [4] 袁丽华, 蒋卫国, 申文明, 刘颖慧, 王文杰, 陶亮亮, 郑华, 刘孝富. 2000-2010 年黄河流域植被覆盖的时空变化. *生态学报*, 2013, 33(24): 7798-7806.
- [5] 王永财, 孙艳玲, 王中良. 1998-2011 年海河流域植被覆盖变化及气候因子驱动分析. *资源科学*, 2014, 36(3): 594-602.
- [6] 于泉洲, 梁春玲, 张祖陆. 近 40 年来南四湖湿地 NDVI 变化特征及其控制因子分析. *湖泊科学*, 2014, 26(3): 455-463.
- [7] Nemani R R, Keeling C D, Hashimoto H, Jolly W M, Piper S C, Tucker C J, Myneni R B, Running S W. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. *Science*, 2003, 300(5625): 1560-1563.
- [8] Eckert S, Husler F, Liniger H, Hodel E. Trend analysis of MODIS NDVI time series for detecting land degradation and regeneration in Mongolia. *Journal of Arid Environments*, 2015, 113: 16-28.
- [9] Gehrig-Fasel J, Guisan A, Zimmermann N E. Tree line shifts in the Swiss Alps: climate change or land abandonment? *Journal of Vegetation Science*, 2007, 18(4): 571-582.

- [10] Mancino G, Nolè A, Ripullone F, Ferrara A. Landsat TM imagery and NDVI differencing to detect vegetation change: assessing natural forest expansion in Basilicata, southern Italy. *iForest - Biogeosciences and Forestry*, 2014, 7(2): 75-84.
- [11] 信忠保, 许炯心, 郑伟. 气候变化和人类活动对黄土高原植被覆盖变化的影响. *中国科学 D 辑: 地球科学*, 2007, 37(11): 1504-1514.
- [12] IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change). *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- [13] IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Global and sectoral aspects. contribution of working group II to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. UK: Cambridge University Press, 2014.
- [14] 张晓东, 朱文博, 崔耀平, 张静静, 朱连奇. 伏牛山地区森林植被动态变化对水热条件的响应. *地理研究*, 2016, 35(6): 1029-1040.
- [15] 方精云. 探索中国山地植物多样性的分布规律. *生物多样性*, 2004, 12(1): 1-4.
- [16] 王根绪, 刘国华, 沈泽昊, 王文志. 山地景观生态学研究进展. *生态学报*, 2017, 37(12): 3967-3981.
- [17] 孙华, 白红英, 张清雨, 雒新萍, 张善红. 基于 SPOT VEGETATION 的秦岭南坡近 10 年来植被覆盖变化及其对温度的响应. *环境科学学报*, 2010, 30(3): 649-654.
- [18] 贺映娜, 白红英, 高翔, 马新萍. 基于 NDVI 的米仓山植被覆盖变化趋势分析. *西北植物学报*, 2011, 31(8): 1677-1682.
- [19] 任园园, 张哲, 侯钦磊, 贺映娜, 袁博. 大巴山地区植被覆盖变化及其对气候变化的响应. *水土保持通报*, 2012, 32(2): 56-59.
- [20] 雒新萍. 近 25a 来秦巴山区植被 NDVI 时空变化及其对区域气候的响应[D]. 西安: 西北大学, 2009.
- [21] 刘宪锋, 潘耀忠, 朱秀芳, 李双双. 2000-2014 年秦巴山区植被覆盖时空变化特征及其归因. *地理学报*, 2015, 70(5): 705-716.
- [22] 崔晓临, 白红英, 尚小清. 基于 MODIS NDVI 的秦岭地区植被覆盖变化研究. *西北大学学报: 自然科学版*, 2012, 42(6): 1021-1026.
- [23] 崔晓临, 白红英, 王涛. 秦岭地区植被 NDVI 海拔梯度差异及其气温响应. *资源科学*, 2013, 35(3): 618-626.
- [24] 邓晨晖, 白红英, 高山, 刘荣娟, 马新萍, 黄晓月, 孟清. 秦岭植被覆盖时空变化及其对气候变化与人类活动的双重响应. *自然资源学报*, 2018, 33(3): 425-438.
- [25] 张清雨, 白红英, 孙华, 高翔, 雒新萍. 近 30 年秦岭山地商洛段林地类型时空变化及其驱动力. *环境科学学报*, 2010, 30(2): 424-430.
- [26] 任志远, 李晶. 陕南秦巴山区植被生态功能的价值测评. *地理学报*, 2003, 58(4): 503-511.
- [27] 孙华, 白红英, 张清雨, 雒新萍, 张善红. 秦岭南北地区植被覆盖对区域环境变化的响应. *环境科学学报*, 2009, 29(12): 2635-2641.
- [28] 贺添, 邵全琴. 基于 MOD16 产品的我国 2001-2010 年蒸散发时空格局变化分析. *地球信息科学学报*, 2014, 16(6): 979-988.
- [29] 张百平, 周成虎, 陈述彭. 中国山地垂直带信息图谱的探讨. *地理学报*, 2003, 58(2): 163-171.
- [30] 周自翔, 任志远, 李晶. 秦巴山区植被土壤保持生态价值研究. *干旱区研究*, 2006, 23(1): 144-148.
- [31] Lovell J L, Gaetz R D. Filtering pathfinder AVHRR land NDVI data for Australia. *International Journal of Remote Sensing*, 2001, 22(13): 2649-2654.
- [32] 孙建, 程根伟. 山地垂直带谱研究评述. *生态环境学报*, 2014, 23(9): 1544-1550.
- [33] He X J, Hou E Q, Liu Y, Wen D Z. Altitudinal patterns and controls of plant and soil nutrient concentrations and stoichiometry in subtropical China. *Scientific Reports*, 2016, 6: 24261.
- [34] Körner C. The use of 'altitude' in ecological research. *Trends in Ecology & Evolution*, 2007, 22(11): 569-574.
- [35] 张静静, 朱文博, 赵芳, 朱连奇, 李茂娟, 朱明, 张晓东. 山地平原过渡带地形起伏特征及其对景观格局的影响——以太行山淇河流域为例. *中国科学: 地球科学*, 2018, 48(4): 476-486.
- [36] 余显芳. 秦岭山地自然地理. *华南师范学院学报*, 1958, (1): 157-175, 177-178.
- [37] 何家理, 马治虎, 陈绪敦. 秦巴山区退耕还林生态效益外显与经济效益内隐状况调查. *水土保持通报*, 2012, 32(4): 251-254, 260-260.
- [38] 刘华训. 我国山地植被的垂直分布规律. *地理学报*, 1981, 36(3): 267-279.
- [39] 刘亚兰, 郭汝清, 孙书存. 中国亚热带山地植被垂直带分布对气候季节性的响应. *生态学报*, 2010, 30(14): 3912-3922.
- [40] 杨胜天, 周旭, 刘晓燕, 刘昌明, 罗娅, 吴琳娜, 赵海根. 黄河中游多沙粗沙区(渭河段)土地利用对植被盖度的影响. *地理学报*, 2014, 69(1): 31-41.
- [41] 周锡饮, 师华定, 王秀茹. 气候变化和人类活动对蒙古高原植被覆盖变化的影响. *干旱区研究*, 2014, 31(4): 604-610.
- [42] 彭舜磊, 王得祥. 秦岭主要森林类型近自然度评价. *林业科学*, 2011, 47(1): 135-142.
- [43] 王强, 张勃, 张志强, 张喜凤, 戴声佩. 基于 GIMMS AVHRR NDVI 数据的三北防护林工程区植被覆盖动态变化与影响因子分析研究(英文). *资源与生态学报*, 2014, 5(1): 53-59.
- [44] 赵舒怡, 宫兆宁, 刘旭颖. 2001-2013 年华北地区植被覆盖度与干旱条件的相关分析. *地理学报*, 2015, 70(5): 717-729.
- [45] 穆少杰, 李建龙, 陈奕兆, 刚成诚, 周伟, 居为民. 2001-2010 年内蒙古植被覆盖度时空变化特征. *地理学报*, 2012, 67(9): 1255-1268.
- [46] 张含玉, 方怒放, 史志华. 黄土高原植被覆盖时空变化及其对气候因子的响应. *生态学报*, 2016, 36(13): 3960-3968.
- [47] Bao Y J, Song G B, Li Z H, Gao J X, Lü H Y, Wang H M, Cheng Y, Xu T. Study on the spatial differences and its time lag effect on climatic factors of the vegetation in the Longitudinal Range-Gorge Region. *Chinese Science Bulletin*, 2007, 52(S2): 42-49.
- [48] 孙晓鹏, 王天明, 寇晓军, 葛剑平. 黄土高原泾河流域长时间序列的归一化植被指数动态变化及其驱动因素分析. *植物生态学报*, 2012, 36(6): 511-521.
- [49] 宋乃平, 杜灵通, 王磊. 盐池县 2000—2012 年植被变化及其驱动力. *生态学报*, 2015, 35(22): 7377-7386.
- [50] 严恩萍, 林辉, 党永峰, 夏朝宗. 2000—2012 年京津风沙源治理区植被覆盖时空演变特征. *生态学报*, 2014, 34(17): 5007-5020.