DOI: 10.5846/stxb201806011224

陈丽,王东波,君珊.拉萨河流域大型底栖动物群落结构及其与环境因子的关系.生态学报,2018,38(24): - .

Chen L, Wang D B, Jun S. Macroinvertebrate community structure and relationships with environmental factors in the LhaSa River Basin. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(24): - .

拉萨河流域大型底栖动物群落结构及其与环境因子的关系

陈 丽¹, 王东波², 君 珊^{2,*}

1 呼伦贝尔市生态环境监测站, 呼伦贝尔 021008

2 呼伦贝尔市环境监测中心站, 呼伦贝尔 021008

摘要:2017年8月对拉萨河流域23个采样点的底栖动物群落和环境因子特征进行了调查,采集到大型底栖动物41属(种),其中水生昆虫35属(种),占85.4%;软体动物2属(种),占4.9%;环节动物3属(种),占7.3%;线形动物1属(种),占2.4%。各点位平均物种数为8种,优势种组成差别较大,优势种主要有四节蜉属(*Baetis* spp.)、大蚊属(*Tipula* sp.)、纹石蛾属(*Hydropsyche* sp.)、短石蛾属(*Brachycentrus* sp.)、水丝蚓属(*Limnodrilus* sp.)、摇蚊属(*Chironomus* sp.)等,各采样点底栖动物平均密度为362只/m²。运用生物多样性指数分析底栖动物的群落结构,Marglef丰富度指数、香农威纳指数和均匀度指数平均值分别为1.18、1.32和0.49,生物多样性指数水平较低。采用均匀度指数法和底栖动物BI指数法进行了水质评价,两种评价结果显示分别有30.3%和56.5%的采样点水质为中污染至重污染状态。典范对应分析结果表明:影响拉萨河流域底栖动物群落的主要环境因子是海拔、化学需氧量、硫化物、pH值、总磷和总氮。

关键词:拉萨河流域;底栖动物;环境因子

Macroinvertebrate community structure and relationships with environmental factors in the LhaSa River Basin

CHEN Li¹, WANG Dongbo², JUN Shan^{2,*}

1 Ecological environment monitoring station of Inner Mongolia, Hulunbeir 021008, China

2 Environmental monitoring center of Inner Mongolia, Hulunbeir 021008, China

Abstract: The macroinvertebrate community structure and environmental factors were surveyed in 23 sampling sites in the LhaSa River Basin in August 2017. A total of 41 macroinvertebrate species were collected, of which, 35 species (85.4%) were aquatic insects, 2 species (4.9%) were mollusks, 3 species (7.3%) were annelids, 1 species (2.4%) was nematomorpha. The average number of species was 8 from all sites, there were significant differences in the dominant species composition, the main dominant species were *Baetis* spp., *Tipula* sp., *Hydropsyche* sp., *Brachycentrus* sp., *Limnodrilus* sp., and *Chironomus* sp. The average density of macroinvertebrate species was 362 ind/m². The macroinvertebrate community structure was evaluated by using biodiversity indices (including the Margalef species richness index, Shannon-Wiener index, and Pielou index). The level of biodiversity indices were relatively low, and the average value of each index was 1.18, 1.32, and 0.49, respectively. The Pielou index and Biotic Index were used to assess the water quality. The two results of assessment, respectively, showed that 30.3% and 56.5% of sampling sites were moderately polluted or heavily polluted. Canonical correspondence analysis revealed that macroinvertebrate community structure was

基金项目:西藏自治区科技计划项目(Z2016C01G01108)

收稿日期:2018-06-01; 修订日期:2018-09-27

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: hlbrhbzh@126.com

heavily determined by levels of altitude, COD_{Cr} , sulfides, pH, TP, and TN.

Key Words: LhaSa River Basin; macroinvertebrate; environmental factor

用于水体生态健康评价的生物类群有细菌、藻类、底栖动物及鱼类,其中底栖动物因其特有的生物属性,是应用最为广泛的指示生物^[1-2]。大型底栖动物是河流生态系统的重要组成生物,它们迁移能力有限,容易受外界环境条件的影响,类群中有对环境敏感的物种,也有耐污的物种,通过对底栖动物特征的分析可以从不同侧面反映出河流水质的好坏,能够说明河流生态系统的健康状况。大型底栖无脊椎动物参与河流生态系统的物质循环与能量流动,处于河流生态系统的中间环节,是联系能量来源和顶级猎食者的主要环节,对维持河流生态系统的完整性起着重要的作用,并能较好地反映过去一段时间内水体受干扰和胁迫的累积效应^[3]。

拉萨河是雅鲁藏布江最大的支流,位于雅鲁藏布江中游的左岸,流域位于 $29^{\circ}20' - 30^{\circ}15' \text{N}$ 和 $90^{\circ}05' - 91^{\circ}09' \text{E}$ 之间,全长 551 km。河源海拔约 5200 m,汇入口海拔 3580 m,水流湍急,水温较低^[4]。根据河谷形态和地质状况,拉萨河大致分为上、中、下游 3 段。上游河段从源头的麦地藏布、色荣藏布到桑曲汇入口,长约 250 km,河床平均坡降 0.37%,中游河段从热振藏布到旁多扒曲汇入口,长约 60 km,河床平均坡降约 0.26%,下游河段从旁多到曲水县境内雅鲁藏布江汇入口,长约 240 km,河床平均比降约 0.19%,主要支流有麦曲、桑曲、乌鲁龙曲、扒曲、雪绒藏布、玛曲、澎波曲和堆龙曲等^[5]。

拉萨河是高原河流,其流域面积仅占西藏自治区总面积的 2.7%,而流域内的人口、耕地却约占全自治区的 15%,由于其特殊的地理位置以及周边的土地利用和社会经济发展状况,注定拉萨河流域的生态状况研究有着重要的意义。简东等^[6]对拉萨河中下游地区底栖动物群落特征进行过研究,但是对整个拉萨河流域底栖动物群落结构特征以及与环境因子的关系研究未见报道,本研究于 2017 年 8 月对拉萨河流域大型底栖动物群落结构、类群多样性进行调查与分析,并利用多元排序统计方法来探寻大型底栖动物与环境因子的关系,为流域的生态健康评估与生态环境管理提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 点位布设

根据对拉萨河流域生态健康评估的研究需要,2017 年 8 月,在拉萨河流域设置了 23 个监测点位(拉萨河干流 9 个,支流 14 个)(见图 1),点位覆盖拉萨河干流、重要支流及流域内重要湿地保护区。干流上游麦地卡湿地、林堤、帕热湿地、旁多电站上下游、直孔电站上下游、拉萨市、才纳 9 个采样点,7 条支流拉曲、雪绒藏布、玛曲、甲玛沟、澎波河、热泉及堆龙曲共设置 14 个采样点。

1.2 底栖动物样品采集与鉴定

使用索伯网在采样断面选择 3 处采样点进行定量采样,索伯网采样面积 0.05 m^2 ,采样后将采集的样品进行分拣,分拣出的节肢动物、软体动物用 75% 的酒精固定,环节动物用 5% 的福尔马林固定,固定 24 h 后转入 70% 的酒精内保存。带回室内鉴定。大型底栖无脊椎动物在体式显微镜下观察计数,鉴定至属级水平。

1.3 水环境理化参数测定

采用 WTW3210 便携式 pH 计现场测定 pH 值、便携式水质监测仪(YSI 85)现场测定溶解氧 DO,根据 GB3838—2002《地表水环境质量标准》,在实验室内测定采集水样的氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$)、总磷(TP)、总氮(TN)、氟化物(F^-)、硫化物(S^{2-})、高锰酸盐指数(COD_{Mn})、化学需氧量(COD_{Cr})、铜(Cu)、锌(Zn)、镉(Cd)、铅(Pb)、六价铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As),其中重金属 7 项均低于检出限,本次调查中不参与计算。样品分析方法均参照国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》测定^[7]。

1.4 数据分析

采用物种数量、个体数量、优势种、生物多样性指数作为大型底栖动物特征参数,分析流域底栖动物的群

图1 拉萨河流域采样点图

Fig.1 Sampling sites of river Lhasa

点位代码:拉萨河干流 G1—G9;雪绒藏布 Z1—Z3;拉曲 Z4—Z5;玛曲 Z6;甲玛沟 Z7—Z8;彭波河 Z9—Z10;热泉 Z11—Z12;堆龙曲 Z13—Z14; (“G”代表干流点位,“Z”代表支流点位)

落结构特征。

1.4.1 优势度及多样性分析

采用优势度^[8](Y)、Margalef 丰富度指数^[9](R)、Shannon-Wiener 多样性指数^[10](H)和 Pielou 均匀度指数^[11](J)对底栖动物群落特征进行评价:

$$Y = f_i \times p_i \quad (1)$$

$$R = (S - 1) / \ln N \quad (2)$$

$$H = - \sum_{i=1}^S p_i \ln p_i \quad (3)$$

$$J = H / \log_2 S \quad (4)$$

式中, S 为总物种数; N 为总个体数; $p_i = n_i / N$, p_i 为*i*种在总数量中的比例, n_i 为第*i*种个体数; f_i 为*i*种在采样点中出现频率, $Y > 0.02$ 时,定为优势种。

1.4.2 水质生物学评价

利用 Pielou 均匀度指数 J (对应水质等级划分标准见表 1) 和生物指数 BI 进行水质生物学评价。

$$BI = \sum_{i=1}^n \frac{n_i t_i}{N} \quad (5)$$

式中, n_i 是第*i*种个体数; t_i 是第*i*个分类单元的耐污值; N 是样本总个体数。

参照 Karr 等使用的水质生物评价指数值与分值的转换方法,计算 BI 指数水质评价分级标准。具体方法为:应用所有样点的 BI 值,通过频数分析,以 5%分位数对应的值作为标准,小于该值表示水质最清洁,大于该值至最大值分布范围四等分,分值从小到大依次分别代表清洁、轻污染、中污染和重污染。

1.4.3 多元分析

采用主成分分析(PCA)中的因子分析法,将各采样点的环境数据进行标准化处理(其中溶解氧为逆指

标,故将其先进行倒数变换,然后在 SPSS 13.0 中完成数据标准化),为了使每个主成分的意义更加明确,采用 Varimax 最大方差法对因子进行旋转,按照特征值 λ 大于 1 的原则提取出 3 个主成分,选择主成分的因子载荷量 >0.7 的环境因子用于底栖动物与环境因子的关系分析。

表 1 均匀度指数与水质等级标准

Table 1 Pielou index and graded standards of water quality

生物指数 Biological index	最清洁(I) Cleanest(I)	清洁(II) Clean(II)	轻污染(III) Light pollution(III)	中污染(IV) Moderate pollution(IV)	重污染(V) Heavy pollution(V)
Pielou 均匀度指数 J Evenness index J	>0.80	$0.61-0.80$	$0.41-0.60$	$0.21-0.40$	<0.20

本次对拉萨河流域底栖动物与环境因子的关系分析采用多元排序方法进行。底栖动物数据与环境因子数据均进行对数转换(pH 除外),在排序前先对底栖动物相对丰度矩阵进行除趋势对应分析(detrended correspondence analysis, DCA),若计算结果中最大的梯度长度大于 3,则选择单峰模型典范对应分析(canonical correspondence analysis, CCA)进行大型底栖动物群落结构数据与环境因子之间的关系分析,若计算结果中最大的梯度长度小于 3,则选择线性模型 RDA(redundancy analysis)进行分析。本研究的 DCA 结果表明,最大的梯度长度为 4.335,因此运用 CCA 方法进行排序分析。采用向前引入法筛选能通过 Monte Carlo 置换检验的显著的环境因子变量。

底栖动物与环境因子的多元分析在 Canoco for windows 4.5 中完成,成图利用 Canoco Draw for windows 4.0 及 ArcMap 9.3 完成。

2 结果与分析

2.1 大型底栖动物物种组成及分布

调查期间在拉萨河流域所有干、支流 23 个点位共发现大型底栖动物 41 种,隶属于 9 目 30 科 41 属(表 2)。其中水生昆虫分属 6 目 25 科 35 个分类单元,占 85.4%;软体动物和环节动物种类较少,共 2 目 4 科 5 属,分别为 2 属和 3 属,各占总数的 4.9%和 7.3%,铁线虫纲蠕虫 1 目 1 科 1 属,占 2.4%。对拉萨河流域所有点位的大型底栖动物类群相对丰度进行统计,各样点共出现了 20 种优势类群,各样点优势类群差别较大。优势种有四节蜉属、纹石蛾属、短石蛾属、水丝蚓属等。四节蜉属以及大蚊属在所有点位出现的频率高于 50%,是广泛分布物种。

拉萨河各点位物种数量和组成差别也较大,平均物种数为 8 种,最低在 G8 点位,仅出现大型底栖动物 1 种,而 Z3 采集到的大型底栖动物种类最多,为 18 种。

2.2 大型底栖动物群落密度与分布

从各点位的采样调查及鉴定结果看来,点位间群落密度相差较大。最大值出现在拉萨河干流上游 G2 点,该点位生态环境状况较好,植被覆盖度较高,河水清澈,底质为卵石,物种类型主要为摇蚊幼虫,底栖动物密度为 1250 只/m²;最低值出现在拉萨市下游干流 G8 点位,底栖动物密度为 3 只/m²。总体来看,支流底栖动物密度高于干流,支流中,除甲玛沟和热泉(堆龙曲支流)外,其他支流底栖动物密度均较高,其中彭波河底栖动物密度最高,而且上下游比较稳定。底栖动物密度空间分布情况见图 2。

2.3 生物多样性指数

2.3.1 生物多样性指数结果

从拉萨河流域各点位大型底栖动物多样性的计算结果图 3 来看, Margalef 丰富度指数、Shannon-Wiener 多样性指数和 Pielou 均匀度指数在拉萨河干流、各支流表现出较为一致的变化趋势。拉萨河干流上游至下游,多样性指数呈现下降趋势,但下降幅度较小,自直孔电站开始指数下降明显;支流中,除雪绒藏布自上游至下游呈现明显上升趋势,其余支流均呈现下降或者微小变化。

表 2 拉萨河流域大型底栖动物物种组成
Table 2 The species composition of Lhasa River Basin

类别 Categories	名称 Name	干流点位 Main stream sites										支流点位 Tributary sites												
		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	Z13
水生昆虫 Aquatic insect	四节蜉属 <i>Baetis</i> spp. *	a	a			a	a	a									a	a	a	a	a	a	a	a
	高地蜉属 <i>Caucasion</i> sp. *								a								a		a					
	高翅蜉属 <i>Epeorus</i> sp.																							
	赞蜉属 <i>Paegniodes</i> sp. *																						a	a
	短丝蜉属 <i>Siphonurus</i> sp.			a													a							
	小蜉属 <i>Ephemerella</i> sp.																							a
	晚蜉属 <i>Toboganodes</i> sp.																							
	假二翅蜉属 <i>Pseudocoon</i> sp. *																							
	纹石蛾属 <i>Hydropsyche</i> sp. *																							
	多距石蛾属 <i>Polyplectropus</i> sp.																							
	短石蛾属 <i>Brachycentrus</i> sp. *																							
	长角石蛾属 <i>Leptocerus</i> sp.																							
	舌石蛾属 <i>Glossosoma</i> sp.																							
	原石蛾属 <i>Rhyacophila</i> sp.																							
	襟石蛾属 <i>Togoperla</i> sp. *																							
	狭石蝇属 <i>Stausolus</i> sp. *																							
	叉石蝇属 <i>Nemoura</i> sp. *																							
	Agnetina sp.																							
	Swallia sp.																							
	大石蝇属 <i>Pteronarcys</i> sp.																							

续表

类别 Categories	名称 Name	干流点位 Main stream sites									支流点位 Tributary sites														
		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	
	冬石蝇属 <i>Taeniopteryx</i> sp. *									a															
	狭溪泥甲属 <i>Stenelmis</i> sp. *										a		a	a	a	a									
	钩虾属 <i>Gammarus</i> sp.		a	a				a											a						
	直突摇蚊属 <i>Orthocladius</i> sp. *		a							a			a										a		
	多足摇蚊属 <i>Polypedilum</i> sp. *			a	a			a						a					a	a					a
	摇蚊属 <i>Chironomus</i> sp. *												a												
	齿斑摇蚊属 <i>Stictochironomus</i> sp.						a																	a	a
	特突摇蚊属 <i>Thenemanimyia</i> sp.						a																		
	环足摇蚊属 <i>Cricotopus</i> sp. *					a																			
	隐摇蚊属 <i>Cryptochironomus</i> sp. *																								
	锥长足虻属 <i>Rhaphium</i> sp.																								
	大蚊属 <i>Tipula</i> sp. *	a	a		a	a																			
	蚋属 <i>Simulium</i> sp. *	a			a	a																			
	拟网蚊属 <i>Deuteroptelebia</i> sp.																								
环节动物 Annelida	水丝蚓属 <i>Limnodrilus</i> sp. *	a	a			a																			
	颤蚓属 <i>Tubifex</i> sp. *																								
软体动物 Mollusca	膀胱螺属 <i>Physa</i> sp.	a																							
	萝卜螺属 <i>Radix</i> sp.				a																				
	赤豆螺属 <i>Bithynia</i> sp.																								
线虫动物 Nematoda	铁线虫属 <i>Gordius</i> sp.	a																							

a 代表在该采样点出现;标注 * 为优势度 $y > 0.02$ 的优势种;“G”代表干流点位,“Z”代表支流点位

图2 拉萨河流域大型底栖动物密度空间分布特征

Fig.2 Spatial patterns of abundance for macroinvertebrate in the Lhasa River Basin

Margalef 丰富度指数与 Shannon-Wiener 多样性指数变化幅度较大,而 Pielou 均匀度指数变化幅度相对较小; Shannon-Wiener 多样性指数在拉萨河干流平均值为 0.99,最大值出现在 G4 旁多电站下游(1.47);支流雪绒藏布直孔电站上游 Z3 点 Margalef 指数和 Shannon-Wiener 指数最高,分别为 3.12 和 2.51。支流中甲玛沟 Margalef 指数和 Shannon-Wiener 多样性指数最低,但 Pielou 均匀度指数经过比物种数的运算又弱化了这种现象。

2.3.2 水质生物学评价

(1) 基于 Pielou 均匀度指数的水质评价

如图 4(a),根据计算的 Pielou 均匀度指数按照水质等级进行划分的结果显示,在拉萨河流域 23 个点位中,多数点位处于清洁(Ⅱ)至中污染(Ⅳ)状态。清洁(Ⅱ)、轻污染(Ⅲ)和中污染(Ⅳ)点位数量分别为 6 个、10 个、6 个,占总点位的比例分别为 26.1%、43.5%、26.1%;水质评价等级为重污染(Ⅴ)的点位只有 1 个,占 4.3%。从拉萨河流域来看,干流上游、下游以及彭波河水质状况较差,水质等级为中污染(Ⅳ)和重污染(Ⅴ);干流中游以及其他支流水质状况较好,水质等级为清洁(Ⅱ)和轻污染(Ⅲ)。

(2) 基于底栖动物 BI 指数的水质评价

由前述的 BI 指数水质评价方法,计算出的 BI 指数最小值为 2.41,最大值为 6.00,5%分位数为 2.46,根据计算结果确定的水质评价分级标准见表 3。

表 3 BI 指数与水质等级标准

Table 3 Biological index and graded standards of water quality

生物指数 Biological index	最清洁(Ⅰ) Cleanest(Ⅰ)	清洁(Ⅱ) Clean(Ⅱ)	轻污染(Ⅲ) Light pollution(Ⅲ)	中污染(Ⅳ) Moderate pollution(Ⅳ)	重污染(Ⅴ) Heavy pollution(Ⅴ)
BI 指数 BI index	<2.46	2.46—3.35	3.35—4.23	4.23—5.12	>5.12

如图 4(b),在拉萨河流域 23 个点位中,1 个为最清洁(Ⅰ),占总点位的比例为 4.3%;4 个点位为清洁(Ⅱ),比例为 17.4%;5 个点位为轻污染(Ⅲ),占 21.8%;4 个为中污染(Ⅳ),占 17.4%;其余 9 个为重污染点

图3 生物多样性指数计算结果
Fig.3 Results of biodiversity indices

位,占 39.1%。从全流域来看,基本呈现出支流以及干流的上游的水质状况优于下游的趋势。拉萨河干流从直孔电站下游起至入雅鲁藏布江前以及彭波河、甲玛沟的水质状况较差,水质等级均是重污染(V);干流的上游以及支流上游的水质状况较好,水质等级为最清洁(I)、清洁(II)和轻污染(III)。

2.4 拉萨河流域环境特征

此次调查共计监测水质指标 17 项,其中 7 项指标在各采样点水样中未检出,监测结果数据特征见表 4。

表 4 拉萨河流域环境因子特征

Table 4 Environmental factors features of Lhasa River Basin

环境因子 Environmental factors	海拔 Altitude	pH	溶解氧 DO	氨氮 NH ₃ -N	总氮 TN	总磷 TP	氟化物 F ⁻	高锰酸盐指数 COD _{Mn}	硫化物 S ²⁻	石油类 Oil	化学需氧量 COD _{Cr}	样本数 n Sample number
平均值 Mean	4137.32	7.76	6.20	0.35	0.87	0.16	0.59	1.15	0.02	0.56	12.88	23
标准偏差 Standard deviation	420.09	0.27	0.56	0.20	0.48	0.10	0.37	0.43	0.01	0.43	10.19	

水质未检出项目:Cu、Zn、Cr、Cd、Pb、Hg、As。海拔单位为 m, pH 无量纲,样本数单位为个,其他项目单位为 mg/L

图4 水质评价结果

Fig.4 Water quality assessment results

流域海拔从干流最低的才纳点位 3590 m—支流雪绒藏布点位 5040 m,海拔跨度较大;从水质测定结果综合来看,拉萨河流域水体呈碱性,监测项目均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水体或更高水体功能标准。

2.5 大型底栖动物与环境因子的关系

用主成分分析(PCA)提取特征值大于1的主成分,共有6个,累计贡献率达到81.9%;选取载荷超过0.7的指标作为主要影响因子,并对相关性较强的因子组进行比较剔除,筛选出海拔(H)、pH、总磷(TP)、总氮(TN)、硫化物(S²⁻)、化学需氧量(COD_{Cr})6个主要环境因子。

大型底栖动物优势类群与主要环境因子的 CCA 的分析结果表 5 显示,前两个排序轴的特征值较大,分别

为 0.432 和 0.300, 分别解释了 8.7% 和 6.1% 的底栖动物优势物种数据方差变异以及 28.6% 和 19.8% 的物种-环境关系变异。第 3 轴和第 4 轴分别解释 5.3% 和 4.1% 的底栖动物优势物种数据方差变异以及 17.3% 和 13.6% 的物种-环境关系变异; 两个物种排序轴近似垂直, 相关系数为 -0.02, 两个环境排序轴的相关系数为 0, 说明排序轴与环境因子间线性结合的程度较好地反映了物种与环境之间的关系, 排序结果可靠^[12]。从 19 个底栖动物优势类群和环境因子的排序结果图 5 来看, 第 1 轴与环境因子 TN、TP、S²⁻ 的相关性较高, 第 2 轴与 COD_{Cr} 的相关性较高, pH、H 与两个轴的相关度相近。从各因子进入 CCA 分析的顺序及其解释率可以看出, H、COD_{Cr}、S²⁻ 的解释率相对较高, 对拉萨河流域大型底栖动物优势种丰度影响较显著; 而 pH、TP 和 TN 的解释率相对较低, 六项环境因子之间的相关性较小。

如图 5 所示, TP 沿着 CCA 第一轴从左至右逐渐降低, 而 TN 和 S²⁻ 沿第 1 轴从左往右逐渐增加。沿 CCA 第 2 轴从下向上, pH 逐渐增大, COD_{Cr} 逐渐减小。

排序结果表明, 不同物种对环境因子的要求不同, 因而在 CCA 排序图中空间位置分布不同。襟石蝇属、颤蚓属、冬石蝇属、高地蜉属以及狭溪泥甲属位于排序图的外围, 说明这几种底栖动物对特定的环境因子有响应, 如冬石蝇属分布在海拔极高的点位、颤蚓属和襟石蝇属分布在 pH 较高的环境中、高地蜉属分布在硫化物含量较高的环境中。而四节蜉属、纹石蛾属、大蚊属及摇蚊属等位于排序图中部, 也广泛分布于各采样点, 说明这些物种在拉萨河流域受环境影响较小, 适应性强, 为广布种。

表 5 大型底栖动物群落结构与环境因子的典范对应分析结果表

Table 5 Summarized results for the first four axes of the CCA of species-environment

项目 Item	轴 1 Axis1	轴 2 Axis2	轴 3 Axis3	轴 4 Axis4	总惯量 Total inertia
特征值 Eigenvalues	0.432	0.300	0.262	0.206	4.952
物种-环境相关系数 Species-environment correlations	0.952	0.911	0.891	0.819	
物种数据方差变异累计百分比/% Cumulative percentage variance of species data	8.7	14.8	20.1	24.2	
物种-环境关系变异累计百分比/% Cumulative percentage variance of species-environment relation	28.6	48.4	65.7	79.3	
总磷 TP	-0.26	-0.12	0.30	-0.07	
总氮 TN	0.11	0.03	-0.37	0.21	
硫化物 S ²⁻	0.57	-0.27	0.29	0.41	
pH	-0.25	0.35	-0.09	0.67	
化学需氧量 COD _{Cr}	-0.13	-0.62	-0.53	0.17	
海拔 H	-0.71	-0.55	0.20	0.10	

3 讨论

西藏被称为地球第三极, 平均海拔 4000 m 以上, 生态环境相对脆弱和敏感。拉萨河属于中纬度高海拔河流, 底栖动物的群落结构和特征既有普遍分布的特性又有区域独特的特点。

3.1 拉萨河流域大型底栖动物群落结构特征

有关大型底栖动物群落的研究在低海拔地区开展较多^[13-15], 高海拔地区的研究相对较少, 2010 年赵伟华和刘学勤^[16] 以及 2012 年马宝珊等^[17] 对雅鲁藏布江底栖动物进行了初步研究, 李斌等^[18] 对怒江西藏段大型底栖动物群落进行了调查研究。拉萨河是雅鲁藏布江的支流, 拉萨河流域有关大型底栖动物的研究报道较少, 可参照对比的资料也较少, 徐梦珍等^[19] 对雅鲁藏布江流域底栖动物多样性进行研究中在拉萨河设置了 3 个采样点位。2013 年简东等^[6] 对拉萨河中下游底栖动物群落结构特征进行了研究, 共设置 16 个采样断面, 干流和支流共采集到 31 种底栖动物, 本次调查为全面调查拉萨河流域的底栖动物状况, 采样点布设范围涵盖拉萨河上中下游, 共设置了 26 个点位, 共采集到 41 种底栖动物, 对拉萨河流域大型底栖动物分布特征掌握了

等地的样本,本研究区域具有一定的地理特殊性,物种耐污值应用的准确性及适用性有待深入的研究。通过本研究中理化手段和生物学方法对水质进行评价的过程及结果,表明在高海拔地区使用生物学方法对水质进行评价还需进一步的修正,才能与长久以来使用的理化手段相结合,更好的应用于水生生态系统的健康评价工作中。

3.3 优势种及其与环境因子的关系

拉萨河流域干流和支流以及支流间群落组成差别较大,不同点位的优势种不同。干流点位由于支流的汇入,水文条件发生改变加上不同类型不同程度的人为干扰致使优势种差别较大,最上游 G1 优势种为四节蜉属和短石蛾属,到中游 G3 优势种为摇蚊幼虫和纹石蛾属,进入雅鲁藏布江前的 G9 优势种为摇蚊幼虫。宏观看来,随着海拔下降与人类活动干扰的增加,干流底栖动物的优势种由较清洁的类群过渡到较耐污的类群。雪绒藏布支流从上游 Z1 到下游 Z3 耐污种类逐渐增多,不过每个点位都有襁科清洁种存在,表明河流水质还是较好的;拉曲支流上游 Z4 点位优势种由指示较清洁的四节蜉属、短石蛾属、大蚊属以及中等耐污的摇蚊幼虫等组成,下游 Z5 点位优势种清洁种减少,较耐污的纹石蛾属成为优势种;甲玛沟、彭波河、热泉以及堆龙曲几条支流的优势种也是相似的状况。从不同支流优势种看来,不同支流的优势种不同,雪绒藏布有襁科物种、热泉有赞蜉、拉曲有毛翅目物种、彭波河有假二翅蜉,根据李宁等^[24]的研究成果,青藏高原高山大川,地理隔绝明显,不同河段海拔高度不同,底栖动物单独进化,使得不同溪流底栖动物的优势种及群落结构差别较大。

大型底栖动物不仅受到底质影响,也受到底层水环境的影响^[25]。CCA 结果表明拉萨河流域大型底栖动物群落结构受海拔、总氮、pH 值、化学需氧量、硫化物、总磷影响较多,其中海拔是影响底栖动物优势种分布的关键因子,其次为水体化学物质含量以及总磷总氮营养盐。海拔决定了一个地区的温度和光照等环境因素的变化,属于宏观尺度的环境因子,因此从根本上决定了河流底栖动物的群落结构组成^[21]。COD_{Cr} 和硫化物作为判别底栖动物优势种的指标说明了不同点位污染来源和程度的不同。水体中总磷、总氮等营养盐在一定程度上也影响着拉萨河流域大型底栖动物优势种的空间分布格局,在对太子河流域、西苕溪^[26]以及鱼山渔场^[27]等的研究中,发现总氮对底栖动物的影响较为严重,张又等^[28]在巢湖流域的研究中也有相似的结果,营养盐的含量与水体中其他化学物质也是有关联的,根据 Jonge MD 等^[29]的研究结果,在营养盐浓度较高的水体中,致使底层水环境溶氧较少并增加底质中和水体中硫化物的含量,限制了敏感种的分布。从以上结果与讨论得出,拉萨河属高原河流,流域底栖动物优势种的组成分布与自然因素海拔密切相关,同时污染及营养物质输入等人为干扰因素也是关注的重点。

鉴于拉萨河流域特殊的地理区位及本次研究的结果,今后应加强区域大型底栖动物与更多环境因子的调查、监测及研究,完善水环境评价体系,通过找出影响底栖动物分布的因素,再反过来从因素的角度出发探讨改善流域生态环境,为相关部门提供决策参考,为拉萨河水生态健康的评估及保护提供指导,用以推动区域自然、经济和社会的和谐发展。

4 结论

(1) 拉萨河流域调查共发现大型底栖动物 41 个分类单元,各点位间底栖动物物种数量和密度差别较大,物种数量变化范围为 1—18 种,物种密度变化范围为 3—1250 只/ m²。

(2) Margalef 丰富度指数 R 、Shannon-Wiener 多样性指数 H 和 Pielou 均匀度指数 J 在拉萨河干流、各支流表现出的趋势较为一致。利用 Pielou 均匀度指数法和底栖动物 BI 指数法进行了水质评价,两种评价结果显示分别有 30.3% 和 56.5% 的采样点水质为中污染至重污染状态。

(3) 拉萨河流域大型底栖动物空间分布主要受到海拔、硫化物、化学需氧量、总磷、总氮和 pH 等 6 个因子影响。

参考文献 (References):

[1] Karr J R. Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries, 1981, 6(6): 21-27.

- [2] Bonada N, Prat N, Resh V H, Statzner B. Developments in aquatic insect biomonitoring: a comparative analysis of recent approaches. *Annual Review of Entomology*, 2006, 51: 495-523.
- [3] 李镇, 张岩, 袁建平, 卢路. 大型底栖无脊椎动物在河流健康评价中的发展趋势. *南水北调与水利科技*, 2011, 9(4): 96-101.
- [4] 中国科学院青藏高原综合科学考察队. *西藏河流与湖泊*. 北京: 科学出版社, 1984: 108-142.
- [5] 布多, 许祖银, 吴坚扎西, 李明礼, 旦增, 德吉. 拉萨河流域选矿厂分布及其对环境的影响. *西藏大学学报: 自然科学版*, 2009, 24(2): 33-38.
- [6] 简东, 黄道明, 常秀岭, 张庆, 谢山, 陈峰, 陈胜. 拉萨河中下游底栖动物群落结构特征分析. *水生态学杂志*, 2015, 36(1): 40-46.
- [7] 国家环境保护总局. *水和废水监测分析方法(第四版)*. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
- [8] 徐兆礼. 东亚强真哲水蚤种群生态特征. *生态学报*, 2006, 26(4): 1151-1158.
- [9] Margalef R. Diversidad de especies en las comunidades naturales. *Publicacions del Institute de Biologia Aplicada*, 1951, 9(5): 5-27.
- [10] Shannon C E, Weaver W. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press, 1963.
- [11] Pielou E C. *Ecological Diversity*. New York: John Wiley, 1975.
- [12] Ter Braak C J F. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis. *Ecology*, 1986, 67(5): 1167-1179.
- [13] 殷旭旺, 韩洁, 王博涵, 金文, 杨璐, 陈海, 吴丹. 太子河流域底栖动物群落结构及其与环境因子的关系. *水产学杂志*, 2017, 30(3): 40-44.
- [14] 段学花, 王兆印, 程东升. 典型河床底质组成中底栖动物群落及多样性. *生态学报*, 2007, 27(4): 1664-1672.
- [15] 杨莲芳, 李佑文, 戚道光, 孙长海, 田立新. 九华河水生昆虫群落结构和水质生物评价. *生态学报*, 1992, 12(1): 8-15.
- [16] 赵伟华, 刘学勤. 西藏雅鲁藏布江雄村河段及其支流底栖动物初步研究. *长江流域资源与环境*, 2010, 19(3): 281-286.
- [17] 马宝珊, 谢从新, 杨学峰, 霍斌. 雅鲁藏布江谢通门江段着生生物和底栖动物资源初步研究. *长江流域资源与环境*, 2012, 21(8): 942-950.
- [18] 李斌, 徐丹丹, 刘绍平, 王志坚. 怒江西藏段大型底栖动物群落结构及多样性研究. *淡水渔业*, 2015, 45(2): 43-48.
- [19] 徐梦珍, 王兆印, 潘保柱, 巩同梁, 刘乐. 雅鲁藏布江流域底栖动物多样性及生态评价. *生态学报*, 2012, 32(8): 2351-2360.
- [20] Dudgeon D. Responses of benthic macroinvertebrate communities to altitude and geology in tributaries of the Sepik River (Papua New Guinea): the influence of taxonomic resolution on the detection of environmental gradients. *Freshwater Biology*, 2012, 57(9): 1794-1812.
- [21] 渠晓东, 曹明, 邵美玲, 黎道丰, 蔡庆华. 雅鲁江(锦屏段)及其主要支流的大型底栖动物. *应用生态学报*, 2007, 18(1): 158-162.
- [22] 曹艳霞, 蔡德所, 张杰, 赵湘桂, 王备新. 漓江水系大型无脊椎底栖动物多样性现状调查. *广西师范大学学报: 自然科学版*, 2009, 27(2): 118-123.
- [23] Jacobsen D, Schultz R, Encalada A. Structure and diversity of stream invertebrate assemblages: the influence of temperature with altitude and latitude. *Freshwater Biology*, 1997, 38(2): 247-261.
- [24] 李宁, 陈阿兰, 杨春江, 马琪, 马国良, 孙瑜珣, 白露超. 湟水河上游大型底栖动物多样性及水体理化因子调查分析. *中国农学通报*, 2016, 32(23): 43-48.
- [25] 张莹, 吕振波, 徐宗法, 刘义豪, 靳洋. 山东半岛南部海湾底栖动物群落生态特征及其与水环境的关系. *生态学报*, 2011, 31(15): 4455-4467.
- [26] 吴东浩, 于海燕, 吴海燕, 周斌, 王备新. 基于大型底栖无脊椎动物确定河流营养盐浓度阈值——以西苕溪上游流域为例. *应用生态学报*, 2010, 21(2): 483-488.
- [27] 谢旭, 俞存根, 郑基, 夏陆军, 毕昶瑶, 张平, 邓小艳, 苗露. 鱼山渔场披山海域虾类群落结构及其与环境因子的关系. *大连海洋大学学报*, 2017, 32(6): 713-723.
- [28] 张又, 程龙, 尹洪斌, 高俊峰, 张志明, 蔡永久. 巢湖流域不同水系大型底栖动物群落结构及影响因素. *湖泊科学*, 2017, 29(1): 200-215.
- [29] de Jonge M, Dreesen F, de Paepe J, Blust R, Bervoets L. Do acid volatile sulfides (AVS) influence the accumulation of sediment-bound metals to benthic invertebrates under natural field conditions? *Environmental Science & Technology*, 2009, 43(12): 4510-4516.