DOI: 10.5846/stxb202101070073

施秀珍, 王建青, 黄志群, 贺纪正. 树种多样性对土壤微生物群落结构和元素生物地球化学循环的影响研究进展. 生态学报, 2022, 42(15): 6092-6102.

Shi X Z, Wang J Q, Huang Z Q, He J Z. Research progresses in the effects of tree species diversity on soil microbial communities and biogeochemical cycling of elements. Acta Ecologica Sinica, 2022, 42(15): 6092-6102.

树种多样性对土壤微生物群落结构和元素生物地球化学循环的影响研究进展

施秀珍^{1,2}, 王建青^{1,2}, 黄志群^{1,2,*}, 贺纪正^{1,2}

1 福建师范大学地理科学学院, 福州 350007

2 福建师范大学湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地, 福州 350007

摘要: 森林是陆地生态系统的重要组成部分, 其巨大的生产力和生态服务功能对人类的生存和发展至关重要。森林树种多样性增加能够显著提高森林生产力, 关于树种多样性如何影响地下生物多样性及生态功能逐渐受到国内外学者的广泛关注。从土壤微生物及其介导的元素生物地球化学循环这一视角出发, 综述了树种多样性对土壤细菌和真菌多样性、群落结构及功能的影响, 提出需要进一步深入研究的方向。总体来说, 树种多样性有利于增加土壤细菌生物量和多样性, 是预测病原性真菌和菌根真菌多样性及群落结构的重要生物因子。树种多样性能增加土壤有机碳储量, 增强森林土壤的甲烷氧化能力, 并提高土壤磷周转速率及有效磷含量。关于树种多样性对森林土壤氮循环的影响需考虑多样性假说和质量比假说的相对贡献。今后应加强树种多样性对多个营养级之间相互作用的研究; 关注树种多样性对生态系统多功能的影响; 加强学科交叉, 引入微生物种群动态模型和气候模型等模型预测方法, 研究树种多样性对全球气候变化的应对机制, 以期促进地上植物多样性与地下生态系统功能关系的研究, 增强森林生态系统应对未来全球环境变化的能力。

关键词: 树种多样性; 细菌; 真菌; 功能微生物; 生物地球化学循环; 全球环境变化

Research progresses in the effects of tree species diversity on soil microbial communities and biogeochemical cycling of elements

SHI Xiuzhen^{1,2}, WANG Jianqing^{1,2}, HUANG Zhiqun^{1,2,*}, HE Jizheng^{1,2}

1 School of Geographical Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China

2 Cultivation Base of State Key Laboratory of Humid Subtropical Mountain Ecology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China

Abstract: Forest is an important component of terrestrial ecosystems. Its high productivity and ecosystem services play a key role in anthropogenic survival and development. The increases in forest tree species diversity can significantly increase forest productivity. It has been widely concerned about how tree species diversity influences the belowground biodiversity and ecosystem functioning. From the perspective of soil microorganisms and their mediated biogeochemical cycling of elements, we reviewed the effects of tree species diversity on soil bacterial and fungal diversity, community structure and ecosystem functioning, and further proposed future research directions. In general, tree species diversity is beneficial to increase soil bacterial biomass and diversity. Tree species diversity is an important bio-indicator of the diversity and community structure of pathogenic fungi and mycorrhizal fungi. Tree species diversity can increase soil organic carbon storage, and enhance soil methane oxidation capacity, as well as facilitate soil phosphorus turnover and bioavailability. The relative contribution of

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(32071631); 国家自然科学基金青年基金项目(41907022); 福建省自然科学基金面上基金项目(2020J01138)

收稿日期: 2021-10-10; **网络出版日期:** 2022-04-07

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: zhiqunhuang@hotmail.com

diversity hypothesis and mass ratio hypothesis should be taken into consideration in terms of the effects of tree species diversity on the nitrogen cycling. In the future, we should devote great efforts to the influence of tree species diversity on interactions among multiple trophic levels. Meanwhile, more attention should be paid to the effects of tree species diversity on ecosystem multifunctionality. Interdisciplinary research and modelling prediction methods, such as microbial population dynamics model and climate model, should be incorporated to explore the mechanisms of tree species diversity in response to global environmental change. This aims to promote the study on the relationship between aboveground plant diversity and belowground ecosystem functioning, and thus enhance the capacity of forest ecosystem for dealing with future global environmental change.

Key Words: tree species diversity; bacteria; fungi; functional microbial guilds; biogeochemical cycling; global environmental change

森林生态系统是全球生物多样性的重要聚集地^[1]。生物多样性在维持生态系统功能和稳定性等方面发挥重要作用^[2]。森林生态系统包括地上和地下两大组成部分,二者相互作用,共同发挥森林生态系统功能^[3]。关于树种多样性对森林生态系统功能影响的研究主要集中在地上部分^[4-5],而较少关注到地下土壤微生物。近年来森林生物多样性研究取得系列重大进展,证实树种多样性增加能显著提高森林生态系统生产力^[6-8]。生态位互补效应(Niche complementarity effects)是解释树种多样性促进森林生产力提高的一个最常用的生态机制,即当生态系统的生态位被不同树种占用时,生态系统中的资源(如空间、光照、养分等)能够被更有效地获取和利用,从而促进森林生产力的提高^[9-10]。但研究发现,去除土壤微生物后,植物多样性对生产力的促进作用显著下降^[11],这预示土壤微生物在调控树种多样性与生态系统功能中发挥关键性作用。

森林土壤微生物群落结构和功能受到生物与非生物因素的共同影响。目前,有关非生物因素,如火烧、氮沉降等对森林土壤微生物的影响已开展较多的研究^[12-14]。然而,森林树种多样性作为森林生态系统最重要的生物因子,其对地下土壤微生物及其介导的元素生物地球化学循环的影响研究较少。近些年来,随着微生物免培养技术即分子生物学技术的迅速发展和广泛应用,极大地推动了作为“黑箱”的森林土壤微生物的发展^[15],森林树种多样性对地下土壤微生物及生态功能的影响研究备受关注。本文首先介绍树种多样性对土壤主要微生物类群,细菌和真菌群落结构和多样性的影响;在此基础上,深入分析由功能微生物群介导的碳、氮和磷元素生物地球化学循环对树种多样性的响应机制;最后提出需要进一步深入研究的方向,以期阐明森林生态系统地上地下联系及其对生态系统功能的影响提供新思路。

1 树种多样性对土壤细菌的影响

土壤微生物包括细菌、真菌、病毒、原生动物和显微藻类等多个类群。鉴于细菌和真菌是土壤微生物中数量及生物量最高的类群,且目前关于树种多样性与土壤微生物关系的研究主要涉及土壤细菌和真菌。因此,本文着重综述树种多样性对土壤细菌和真菌多样性和群落结构的影响。目前研究表明,树种多样性有利于促进土壤细菌生物量和多样性增加。树种多样性水平不同的森林生态系统在凋落物数量、质量和根系分泌物输入等方面存在较大差异,成为影响土壤细菌多样性和群落结构的重要因素^[16-17]。Zhang 等^[18]通过对亚热带森林五个单一树种纯林和三个混交林(两个树种)土壤中细菌系统多样性的分析指出,混交林显著提高了土壤细菌系统发育多样性和细菌群落稳定性(表 1)。

细菌系统发育多样性(Phylogenetic diversity)旨在描述一个群落中不同种细菌进化和系统发育距离,可用于评估树种多样性对生态系统功能和稳定性的影响^[25]。系统发育多样性增加意味着细菌群落具有更多的生态位分化和资源互补利用能力,对外界环境变化具备更高的抵御能力。树种多样性对土壤细菌系统发育多样性的促进作用源于具有高度养分异质性的凋落物混合物,其能为土壤细菌提供更加多样化的生态位^[19]。Wardle^[26]指出混交林中不同树种叶片功能性状(比叶片面积、叶干物质含量等)多样化水平越高,其凋落物混

合效应越强。鉴于树木地上叶片和地下根系的功能特性通常具有协调一致性,叶片功能性状的多样性通常代表根系结构和分泌物的多样性^[27],后者可为根际微生物生态位分化提供空间和物质基础。研究者通过分析土壤微生物磷脂脂肪酸(PLFA)发现,树种(凋落物)多样性增加能促进土壤细菌生物量的增加^[19-20]。近期,Rivest 等^[17]和 Wu 等^[21]对细菌 16S 核糖体 RNA 高通量测序分析表明,温带和亚热带森林树种丰富度增加均显著提高土壤细菌香农指数多样性。

表 1 树种多样性对细菌多样性及群落结构的影响

Table 1 Effects of tree species diversity on bacterial diversity and community structure

树种多样性水平 Tree species diversity levels	研究结果 Results	研究方法 Methods	森林类型 Forest types	参考文献 References
1 (12); 2 (14); 4 (10); 12 (1)	树种丰富度对细菌群落结构无显著影响	PLFA	温带森林	[4]
1 (12); 2 (14); 4 (10); 12 (1)	树种多样性增加土壤细菌多样性,改变土壤细菌群落结构	16S rRNA 高通量测序	温带森林	[17]
1 (5); 2 (3)	树种多样性增加细菌系统发育多样性和细菌群落稳定性	16S rRNA 高通量测序	亚热带森林	[18]
1 (4); 2 (6); 4 (1)	凋落叶多样性增加细菌生物量和多样性,改变细菌群落结构	PLFA	温带森林	[19]
—	树种多样性增加细菌生物量	Meta 分析	多个气候带森林	[20]
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	树种丰富度增加细菌多样性	16S rRNA 高通量测序	亚热带森林	[21]
4; 10; 19	凋落叶丰富度对细菌群落结构无显著影响	PCR-DGGE	热带森林	[22]
1; 2; 3; 4	树种多样性改变细菌群落结构(酸杆菌门相对丰度降低;变形菌门和放线菌门相对丰度升高)	16S rRNA 高通量测序	亚热带森林	[23]
1 (19); 2 (14); 4 (18); 12 (3)	树种丰富度和和功能群多样性是影响叶际细菌多样性和群落结构的主要因子	16S rRNA 高通量测序	温带森林	[24]

括号外数字表示树种多样性水平,括号内数字为相同多样性水平时树种组合数,“—”表示无相关数据;PLFA: 磷脂脂肪酸 Phospholipid Fatty acid; DGGE: 变性梯度凝胶电泳 Denaturing gradient gel electrophoresis

细菌群落结构是表征细菌群落动态及生态功能的另一个重要指标。目前关于土壤细菌群落结构对树种多样性的响应仍没有定论。一部分研究显示树种多样性对土壤细菌群落结构没有显著影响。如吴艺雪^[22]研究表明,热带森林凋落叶多样性对土壤细菌群落结构(PCR-DGGE)无显著影响。在加拿大的温带树种多样性同质园试验中,Khlifa 等^[4]发现树种丰富度对土壤细菌群落结构(PLFA)没有显著差异。但是更多的试验研究发现树种多样性对细菌群落结构具有显著影响。陈琴^[23]通过对亚热带森林研究发现,随树种丰富度增加,酸杆菌门 Acidobacteria 相对丰度降低;而变形菌门 Proteobacteria 和放线菌门 Actinobacteria 相对丰度增加。这可能归因于树种丰富度增加时,提高了凋落物的输入量,有利于富营养型细菌,如变形菌门和放线菌门成为优势菌群,而不利于寡营养型细菌如酸杆菌门的生长^[28]。通过对已建立七年的温带森林树种多样性样地研究,Rivest 等^[17]发现树种多样性显著影响土壤细菌的群落结构。研究还显示树种丰富度和功能群多样性是影响叶际细菌多样性和群落结构的重要因子^[24]。不一致的研究结果除了归因于树种、林龄及分析微生物群落结构所采用方法的差异,还需考虑到土壤微生物本身对树种多样性响应的时滞性(Time lag)^[17,29]。例如,Eisenhauer 等^[2]设计了一个连续六年的野外试验研究土壤微生物对植物多样性的响应,结果发现植物多样性样地建立初期,土壤微生物量和呼吸速率在不同植物多样性水平间无显著差异,但在多样性样地建立四年后随植物多样性增加。这种时滞性是由于大多数土壤微生物为异养型,需要依靠植物源养分的输入而获取生长所需要的养分和能量^[3]。

2 树种多样性对土壤真菌的影响

真菌是土壤中一类重要的真核微生物。自然界中绝大多数植物能够与菌根真菌(Mycorrhiza)形成共生关

系,包括内生菌根和外生菌根真菌两种类型^[30]。其中,丛枝菌根是最为常见的内生菌根真菌,能够与 80% 的陆地植物形成共生关系^[31]。研究表明,土壤菌根真菌是调控和维持树种多样性的重要生物因子^[30, 32-33]。这主要由于当更多的树种与不同类型/物种的菌根真菌共生时,有利于增加资源利用互补性,减少树种之间的竞争。例如,外生菌根能产生胞外酶来降解土壤中复杂的有机氮,从而为植物提供氨基酸作为氮源;丛枝菌根主要协助植物获取土壤无机氮^[34]。Jansa 等^[35]报道丛枝菌根的不同物种对无机磷具有不同的亲和力及获取策略,较高的丛枝菌根丰富度可以促进不同树种对磷的吸收。菌根真菌多样性增加有助于提高生态系统生产力^[30, 36]。这种促进效应,一方面归因于菌根真菌生命活动中产生的代谢产物,如有机酸能促进土壤中矿质元素的释放,进而增强植物对矿质养分的吸收^[37];另一方面是菌根真菌能增强植物对病原性真菌的抵抗能力^[38]。

不同于菌根真菌,病原性真菌则可引发寄主树木组织坏死、幼苗死亡等^[32]。研究发现树种多样性增加可以显著降低病原性真菌的数量及丰富度,对森林生态系统功能产生积极影响^[39-40]。主要由于土壤病原性真菌大多为专性寄生,传播孢子能力有限,对同种寄生植物具有距离和密度依赖性^[33]。增加树种多样性能够降低寄主植物的密度(稀释作用),而且局部微环境可能发生改变,均不利于病原性真菌孢子的传播和萌发^[39]。

鉴于树种与真菌广泛存在的共生或寄生关系,树种与真菌之间的相互作用能促进二者协同进化。因此,不同的树种在其系统发育过程中与土壤真菌群落建立了密切联系^[41]。Wang 等^[33]研究发现亚热带森林树种系统发育特性对土壤菌根真菌和病原性真菌的丰富度和群落结构变化的解释度高达 77%,而环境和空间因素的解释度均低于 4%。Nguyen 等^[42]通过研究也发现,温带森林树种系统发育多样性与外生菌根真菌物种丰富度呈显著正相关,树种组成对外生菌根真菌群落结构具有显著影响。Schroeder 等^[32]也提出,热带森林树种系统发育多样性可用于预测病原性真菌和菌根真菌的多样性及群落结构(表 2)。

表 2 树种多样性对真菌多样性及群落结构的影响

Table 2 Effects of tree species diversity on fungal diversity and community structure

树种多样性水平 Tree species diversity levels	研究结果 Results	研究方法 Methods	森林类型 Forest types	参考文献 References
1 (12); 2 (14); 4 (10); 12 (1)	树种多样性改变真菌群落结构	ITS 高通量 测序	温带森林	[4]
1 (4); 2 (6); 4 (1)	凋落叶多样性增加真菌生物量	PLFA	温带森林	[19]
—	树种多样性增加真菌生物量	Meta 分析	不同气候带 森林	[20]
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	树种丰富度增加真菌多样性	ITS 高通量测序	亚热带森林	[21]
—	树种系统发育多样性降低病原性真菌数量及丰富度	ITS 高通量测序	热带雨林	[32]
1 (6); 2 (15); 3 (20); 5 (5); 6 (1)	树种多样性降低病原性真菌丰富度	形态学分类	温带森林	[39]
1; 3; 4; 5	树种丰富度降低病原性真菌数量及丰富度	形态学分类	温带森林	[40]
1; 6 (4)	树种多样性增加外生菌根真菌物种丰富度,树种组成改变外生菌根真菌群落结构	ITS 高通量测序	温带森林	[42]

括号外数字表示树种多样性水平,括号内数字为相同多样性水平时树种组合数,“—”表示无相关数据;ITS: 内转录间隔区 Internal Transcribed Spacer; PLFA: 磷脂脂肪酸 Phospholipid Fatty acid

3 树种多样性对碳、氮和磷生物地球化学循环的影响

若将上述土壤微生物的多样性和群落结构作为对微生物群落动态的‘定量描述’,那么接下来元素生物地球化学循环则是对微生物群落的‘定性分析’。其中,土壤功能微生物群(Functional microbial guilds)是推动碳素、氮素和磷素生物地球化学循环的引擎^[15](图 1)。伴随着越来越多的土壤功能微生物被用作物质循

环转化速率的生物指标(Bio-indicator),揭示土壤功能微生物对树种多样性的响应,有助于深入理解森林生态系统地上地下相互作用及其对生态系统物质循环的影响。

3.1 树种多样性对碳素生物地球化学循环的影响

森林生态系统植被和土壤中碳储量占陆地有机碳总量的 39%,将森林作为全球碳平衡管理的杠杆潜力巨大^[43]。了解树种多样性对森林有机碳储存的影响机制有利于准确评估森林生态系统应对全球气候变化的潜力^[44]。当树种多样性增加时,树木以凋落物、根系分泌物和细根周转的形式向土壤中输送的有机质增加^[45]。土壤微生物在调控新输入的植物源有机质向土壤有机碳转化过程中发挥重要作用。不同气候带森林生态系统研究均表明树种多样性增加能促进土壤有机碳储量积累^[8, 10, 21, 46]。主要由于植物多样性增加时,植物性碳源输入(如凋落物和根系生物量)增加,能够为土壤中以有机碳作为碳源的大量异养型微生物提供营养和能量,促进其生长繁殖和生物量的积累^[47]。当微生物死亡后,微生物残体转化为新增的土壤有机碳^[48]。据 Liang 等^[49]统计,经微生物合成代谢所固定的有机碳占土壤有机碳总量一半以上。其次,树种多样性增加有利于维持适宜的土壤含水量,从而减轻干旱或全球气候变暖对土壤微生物生长的不利影响^[50]。值得注意的是微生物生物量增加的同时也将加强微生物呼吸作用(土壤异养呼吸)。近期,通过对全球包括森林在内的多个陆地生态系统类型植物多样性的整合分析指出,土壤异养呼吸作用随植物多样性增加而加强^[20],但呼吸作用引起的碳释放远低于由微生物合成代谢而固定的碳^[20, 48]。因此,土壤微生物生物量增加是树种多样性提高森林生态系统土壤碳储量的一个重要途径。

森林是陆地生态系统最大的甲烷(CH_4)汇,维持树种多样性有利于增强森林生态系统 CH_4 氧化能力^[51]。相比于在分类学和系统学上分布广泛的介导呼吸作用和分解作用的微生物类群,甲烷氧化菌是一类专性好氧的自养型微生物,能通过氧化大气中甲烷而获得生命代谢能量,并将甲烷同化为自身生物量(图 1)。因此,甲烷氧化菌不仅是一类重要的生物碳汇,而且对减少 CH_4 排放发挥关键作用,是森林生态系统碳循环研究中的重要功能微生物^[5]。东南亚热带地区近几十年来大规模的天然林向橡胶 *Hevea brasiliensis* 纯林的转变严重降低了树种多样性,近期研究报道天然林对 CH_4 的氧化能力是橡胶纯林的 2.4 倍,林龄较大的橡胶纯林在雨

图 1 树种多样性对碳、氮和磷生物地球化学循环的影响

Fig. 1 Effects of tree species diversity on the biogeochemical cycling of carbon, nitrogen and phosphorus

季甚至从 CH_4 的汇变为源^[52]。相似的研究结果发现,天然林转变为牧场、咖啡或棕榈种植园后,土壤对 CH_4 的氧化能力均显示出下降趋势^[53-55]。关于树种多样性增加时,森林 CH_4 氧化能力提高存在以下几种机制: 1) 维持适宜的土壤含水量,热带森林地区水热条件充足,单一树种纯林导致土壤含水量偏高,土壤厌氧环境促进产甲烷细菌的生长,而对专性好氧的甲烷氧化菌产生抑制作用,因此森林土壤 CH_4 的排放增加^[52]。Krämer 等^[56] 对德国中部 12 个温带落叶林树种多样性梯度样地的土壤水分动态研究发现,树种多样性与表层土壤水分在夏季干燥期呈显著正相关,而在非干燥期不同树种多样性水平样地土壤水分动态格局相似。因此,当树种多样性水平增加时,不同树种水分利用策略的差异可能有助于促进对土壤水分的充分利用,从而维持土壤适宜的含水量。即当环境中水分充足时,树种多样性水平高的森林系统能降低对深层土壤水分的提取,而当生境中缺水时,则以更高的速率提取深层土壤水分,且本身较高的叶面积指数也有利于保持较高的表层土壤水分^[57]。这种水力策略可能是不同树种多样性水平下森林土壤 CH_4 氧化能力差异的驱动性因素。2) 土壤细菌多样性增加促进甲烷氧化菌对甲烷的氧化。据 Schnyder 等^[5] 研究报道,土壤微生物多样性增加对甲烷氧化菌的功能基因 *pmoA* (编码甲烷单加氧酶) 丰度有促进效应,进而增强对甲烷的氧化能力。因此,树种多样性可能通过增加土壤细菌多样性^[6, 17, 21], 间接增强土壤甲烷氧化菌对甲烷的氧化潜力。3) 一些研究表明树种多样性增加能提高土壤中氮素的有效性^[58-60], 因此间接促进土壤对 CH_4 的氧化。氮素可利用性增加促进甲烷氧化菌对甲烷的氧化。早期研究表明当氮素成为限制甲烷氧化菌生长的营养元素时,环境中氮素的提高能够促进甲烷氧化菌的生长,从而促进对 CH_4 的氧化^[61]。Yan 等^[62] 研究也指出,在温带森林中氮添加处理能显著增加土壤对 CH_4 的氧化能力。

3.2 树种多样性对氮素生物地球化学循环的影响

关于森林生态系统树种对土壤氮素生物地球化学循环的影响,多样性假说 (Diversity hypothesis) 提出当森林生态系统中树种丰富度增加时,不同树种凋落物形状、大小、结构和颜色的差异,有助于提高微环境的丰富度与斑块性,为土壤微生物和动物提供更多的生境;而且不同树种凋落物的分解速率不同,能提供持续的氮素来源,从而加快土壤氮循环的转化速率^[63]。例如, Bengtson 等^[64] 研究指出,随温带森林混交林中树种丰富度的增加,土壤有机氮净矿化速率和净硝化速率均提高。Reverchon 等^[58] 报道与单一树种的纯林相比,所罗门群岛的热带森林中混合种植柚木 *Tectona grandis* 和白饭树 *Flueggea flexuosa* 混交林显著提高土壤的速效氮含量,混合林土壤反硝化细菌功能基因 *narG*, *nirS* 和 *nosZ* (依次编码硝态氮还原酶、亚硝态氮还原酶和氧化亚氮还原酶) 的丰度显著升高。在刚果和巴西的热带森林中, Tchichelle 等^[59] 和 Voigtlaender 等^[60] 发现相比于纯林,尾叶桉 *Eucalypt urophylla* 与马占相思 *Acacia mangium* 等比例混交林显著提高土壤速效氮含量和树木生物量的积累。Chang 等^[65] 通过研究亚热带人工湿地也发现,随植物物种丰富度的增加,土壤净硝化速率、硝酸还原酶活性和土壤氨氧化菌的丰度均显著增加。

也有不同于多样性假说结果的研究报道。例如,吴艺雪^[22] 通过分析热带森林凋落叶丰富度对土壤有机氮矿化的影响指出,当凋落叶丰富度较高时(十种以上),土壤净氮矿化速率显著增加,而当凋落叶丰富度较低时(低于四种),土壤净氮矿化速率急剧降低。Isobe 等^[66] 研究我国亚热带针叶纯林和阔叶林发现,其土壤净硝化速率分别是混交林的 10 和 2.4 倍,氨氧化古菌的功能基因 *amoA* (编码氨单加氧酶) 丰度分别是混交林的 3.8 和 2.9 倍。针对上述差异性的结果,研究者指出相比于树种丰富度,森林生态系统中优势树种的性状对土壤氮循环可能发挥决定性的作用,即质量比假说 (Mass ratio hypothesis)^[67]。例如,热带雨林中以美洲椴 *Tilia Americana* 和美洲糖槭 *Acer saccharum* 为优势树种时,其土壤有机氮净矿化速率和净硝化速率均显著高于以东方铁杉 *Tsuga Canadensis* 为优势树种,主要由于美洲椴和美洲糖槭的凋落物木质素与氮素的比值及碳氮比值均低于东方铁杉,所以凋落物质量高,加快了土壤有机氮矿化和硝化作用。通过遥感图像光谱学研究报道,相比于热带雨林冠层含氮量低的树种组合,冠层含氮量高的树种组合显著提高土壤净硝化速率及土壤硝态氮含量,氨氧化古菌的 *amoA* 基因丰度显著提高,反硝化细菌的 *nirS*, *nirK* 和 *nosZ* 基因丰度没有差异^[68]。近期, Laffite 等^[69] 发现高加索冷杉 *Abies nordmanniana*、欧洲云杉 *Picea abies* 和以欧洲山毛榉 *Fagus sylvatica* 为

优势树种的温带天然林能通过凋落物和根系分泌物,抑制硝化杆菌属的生长,进而降低土壤硝化速率。综上所述,针对树种多样性对氮素生物地球化学循环的影响需要考虑多样性假说和质量比假说的相对贡献。

3.3 树种多样性对磷素生物地球化学循环的影响

磷是生物遗传信息载体 DNA、生物膜以及生物能量转换和贮存物质组成中不可缺少的大量元素,因此磷是生物的核心元素^[21,70]。不同于碳、氮元素,磷元素及其化合物没有气态形式,土壤中有效磷主要来源于成土母质中不溶性磷化物,如磷酸钙和磷灰石的风化,因此磷被广泛认为是天然生态系统,如森林生态系统中限制植物生长的“瓶颈”元素^[46],近些年来持续增加的氮沉降加剧了森林生态系统的磷限制^[57]。因此,有研究提出土壤速效磷的增加是植物多样性与生态系统功能正相关的潜在作用机制^[21]。

已有研究指出树种多样性增加有利于提高土壤磷周转速率及有效磷含量。例如, Talkner 等^[46]和 de A. Pereira 等^[71]通过分析表明,相比于欧洲山毛榉 *Fagus sylvatica* 和巨尾桉 *Eucalyptus grandis* 纯林,混交林能显著提高凋落物和土壤有效磷含量及土壤磷的周转速率。一方面,由于树种多样性增加时,能通过凋落物分解向土壤中输入更多的磷;同时,能够缓解土壤酸化,减少土壤铝和铁离子对可溶性磷的吸附作用^[21]。其次,树种多样性水平较高的森林生态系统,根系结构及根系分泌物更加多样化,能为菌根真菌提供更多的生存空间和营养^[72]。菌根真菌能分泌胞外磷酸酶,将磷酸单酯和磷酸二酯分解为无机磷,并具备对无机磷具有高亲和力的转运蛋白^[70],增强土壤磷的生物有效性^[73]。最新的网络分析指出,树种丰富度增加显著加强了真菌与磷循环的联系^[71]。除菌根真菌之外,溶磷细菌产生的磷酸酶也能将不溶性磷酸盐转化为有效磷^[74]。Hacker 等^[75]通过分析指出,植物丰富度增加能促进土壤磷酸酶活性升高。Sorkau 等^[57]研究表明,随着植物多样性增加,土壤微生物量磷显著提高。土壤微生物量磷是土壤磷循环的中转站,既能通过矿化为植物生长提供无机磷 ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$),也能作为有机磷的储备库^[76]。这种促进作用得益于植物源有机质输入的增加和适宜的土壤含水量^[57,76]。最新研究指出,土壤微生物功能基因 *phoC* 和 *phoD* (分别编码酸性和碱性磷酸酶) 丰度与土壤磷酸酶活性及土壤无机磷含量呈显著正相关^[77]。伴随着更多磷酸酶编码基因被测序,通过研究磷循环相关功能微生物,开展树种多样性对磷素生物地球化学循环的研究必将成为未来的发展趋势。

4 展望

近期欧洲大数据分析发现,森林生态系统树种多样性对于维持鸟类、昆虫和林下植被等生物多样性具有重大生态效益^[1]。树种多样性在维持森林生态系统功能稳定性及增强对全球气候变化应对能力等方面发挥重要功能^[25]。建议今后从以下几方面加强森林树种多样性对土壤微生物影响的研究。

(1) 加强树种多样性对多个营养级之间相互作用(营养网络)的研究。目前关于树种多样性与生态系统功能关系的研究多集中于同一个营养级水平,但生态系统的功能在很大程度上取决于多个营养级之间复杂的相互作用。例如,当植物多样性增加时,土壤中动物分解者,如蚯蚓可以通过加快地表凋落物分解(增加营养有效性)和增加地下栖息地空间,为土壤微生物提供更多异质性的生境^[35]。因此,今后的研究需要考虑多个营养级生物的相互作用,如土壤微生物和土壤动物互作对森林树种多样性的响应及对生态系统功能的影响。

(2) 关注树种多样性对生态系统多功能(Ecosystem multifunctionality)的影响。目前关于树种多样性的研究多注重于对单一生态功能的影响,严重制约对树种多样性与生态系统功能关系的客观评价。例如,树种多样性能增强甲烷氧化菌对土壤 CH_4 的氧化能力,但同时也可能导致 N_2O 排放增加,因此需要综合评估树种多样性对温室气体排放的影响。由于生态系统多功能可以同时考虑不同生态系统功能之间的权衡(Trade-offs),其提出被认为是生态学研究的一个重要进展^[78]。今后应加强树种多样性对生态系统多功能和服务能力的研究,如从不同元素生物地球化学循环耦合角度探讨树种多样性对森林生态系统多功能的影响。

(3) 加强学科交叉,引入种群动态模型和气候模型等模型预测方法,研究树种多样性对全球气候变化的应对机制。目前,全球面临的气候变暖、淡水资源短缺、环境污染和极端气候频发等问题日益突出,严重威胁着人类的生存和发展。Hisano 等^[44]提出“生物多样性—减缓概念”(Biodiversity-Mitigation concept),即生物多

样性可能减缓全球环境变化对生态系统造成的负面影响,值得借鉴。近期,Fichtner 等^[79]研究亚热带森林树种多样性对于干旱的响应指出,树种多样性能减缓干旱对幼龄期树木生长的不利影响。今后应在此基础上,加强学科交叉和新兴技术的应用,引入微生物种群动态模型预测的方法,进一步深入地研究树种多样性适应和缓解全球环境变化的生物机制。

参考文献 (References):

- [1] Ampoorter E, Barbaro L, Jactel H, Baeten L, Boberg J, Carnol M, Castagneyrol B, Charbonnier Y, Dawud S M, Deconchat M, De Smedt P, De Wandeler H, Guyot V, Hättenschwiler S, Joly F X, Koricheva J, Milligan H, Muys B, Nguyen D, Ratchiffe S, Raulund-Rasmussen K, Scherer-Lorenzen M, van der Plas F, Van Keer J, Verheyen K, Vesterdal L, Allan E. Tree diversity is key for promoting the diversity and abundance of forest-associated taxa in Europe. *Oikos*, 2020, 129(2): 133-146.
- [2] Eisenhauer N, Beßler H, Engels C, Gleixner G, Habekost M, Milcu A, Partsch S, Sabais A C W, Scherber C, Steinbeiss S, Weigelt A, Weisser W W, Scheu S. Plant diversity effects on soil microorganisms support the singular hypothesis. *Ecology*, 2010, 91(2): 485-496.
- [3] Wardle D A, Bardgett R D, Klironomos J N, Setälä H, van der Putten W H, Wall D H. Ecological linkages between aboveground and belowground biota. *Science*, 2004, 304(5677): 1629-1633.
- [4] Khelifa R, Paquette A, Messier C, Reich P B, Munson A D. Do temperate tree species diversity and identity influence soil microbial community function and composition?. *Ecology and Evolution*, 2017, 7(19): 7965-7974.
- [5] Schnyder E, Bodelier P L E, Hartmann M, Henneberger R, Niklaus P A. Positive diversity-functioning relationships in model communities of methanotrophic bacteria. *Ecology*, 2018, 99(3): 714-723.
- [6] Zhang Y, Chen H Y H, Reich P B. Forest productivity increases with evenness, species richness and trait variation: a global meta-analysis. *Journal of Ecology*, 2012, 100(3): 742-749.
- [7] Liang J J, Crowther T W, Picard N, Wiser S, Zhou M, Alberti G, Schulze E D, McGuire A D, Bozzato F, Pretzsch H, de-Miguel S, Paquette A, Hérault B, Scherer-Lorenzen M, Barrett C B, Glick H B, Hengeveld G M, Nabuurs G J, Pfautsch S, Viana H, Vibrans A C, Ammer C, Schall P, Verbyla D, Tchebakova N, Fischer M, Watson J V, Chen H Y H, Lei X D, Schelhaas M J, Lu H C, Gianelle D, Parfenova E I, Salas C, Lee E, Lee B, Kim H S, Bruelheide H, Coomes D A, Piotto D, Sunderland T, Schmid B, Gourlet-Fleury S, Sonké B, Tavani R, Zhu J, Brandl S, Vayreda J, Kitahara F, Searle E B, Neldner V J, Ngugi M R, Baraloto C, Frizzera L, Bałazy R, Oleksyn J, Zawila-Niedzwiecki T, Bouriaud O, Bussotti F, Finér L, Jaroszewicz B, Jucker T, Valladares F, Jagodzinski A M, Peri P L, Gonmadje C, Marthy W, O'Brien T, Martin E H, Marshall A R, Rovero F, Bitariho R, Niklaus P A, Alvarez-Loayza P, Chamuya N, Valencia R, Mortier F, Wortel V, Engone-Obiang N L, Ferreira L V, Odeke D E, Vasquez R M, Lewis S L, Reich P B. Positive biodiversity-productivity relationship predominant in global forests. *Science*, 2016, 354(6309): aaf8957.
- [8] Huang Y Y, Chen Y X, Castro-Izagirre N, Baruffol M, Brezzi M, Lang A N, Li Y, Härdtle W, von Oheimb G, Yang X F, Liu X J, Pei K Q, Both S, Yang B, Eichenberg D, Assmann T, Bauhus J, Behrens T, Buscot F, Chen X Y, Chesters D, Ding B Y, Durka W, Erfmeier A, Fang J Y, Fischer M, Guo L D, Guo D L, Gutknecht J L M, He J S, He C L, Hector A, Hönig L, Hu R Y, Klein A M, Kühn P, Liang Y, Li S, Michalski S, Scherer-Lorenzen M, Schmidt K, Scholten T, Schuldt A, Shi X Z, Tan M Z, Tang Z Y, Trogisch S, Wang Z W, Welk E, Wirth C, Wubet T, Xiang W H, Yu M J, Yu X D, Zhang J Y, Zhang S R, Zhang N L, Zhou H Z, Zhu C D, Zhu L, Bruelheide H, Ma K P, Niklaus P A, Schmid B. Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment. *Science*, 2018, 362(6410): 80-83.
- [9] Williams L J, Paquette A, Cavender-Bares J, Messier C, Reich P B. Spatial complementarity in tree crowns explains overyielding in species mixtures. *Nature Ecology & Evolution*, 2017, 1(4): 0063.
- [10] Zheng L T, Chen H Y H, Yan E R. Tree species diversity promotes litterfall productivity through crown complementarity in subtropical forests. *Journal of Ecology*, 2019, 107(4): 1852-1861.
- [11] Schnitzer S A, Klironomos J N, HilleRisLambers J, Kinkel L L, Reich P B, Xiao K, Rillig M C, Sikes B A, Callaway R M, Mangan S A, van Nes E H, Scheffer M. Soil microbes drive the classic plant diversity-productivity pattern. *Ecology*, 2011, 92(2): 296-303.
- [12] Jaatinen K, Knief C, Dunfield P F, Yrjölä K, Fritze H. Methanotrophic bacteria in boreal forest soil after fire. *FEMS Microbiology Ecology*, 2004, 50(3): 195-202.
- [13] Sullivan B W, Kolb T E, Hart S C, Kaye J P, Hungate B A, Dore S, Montes-Helu M. Wildfire reduces carbon dioxide efflux and increases methane uptake in ponderosa pine forest soils of the southwestern USA. *Biogeochemistry*, 2011, 104(1/3): 251-265.
- [14] Wang J Q, Shi X Z, Zheng C Y, Suter H, Huang Z Q. Different responses of soil bacterial and fungal communities to nitrogen deposition in a subtropical forest. *Science of the Total Environment*, 2021, 755: 142449.
- [15] 沈菊培, 贺纪正. 微生物介导的碳氮循环过程对全球气候变化的响应. *生态学报*, 2011, 31(11): 2957-2967.

- [16] Yarwood S A, Myrold D D, Högborg M N. Termination of belowground C allocation by trees alters soil fungal and bacterial communities in a boreal forest. *FEMS Microbiology Ecology*, 2009, 70(1): 151-162.
- [17] Rivest M, Whalen J K, Rivest D. Tree diversity is not always a strong driver of soil microbial diversity: a 7-yr-old diversity experiment with trees. *Ecosphere*, 2019, 10(4): e02685.
- [18] Zhang X, Huang Y T, Liu S R, Fu S L, Ming A G, Li X Z, Yao M J, Li H, Tian C. Mixture of tree species enhances stability of the soil bacterial community through phylogenetic diversity. *European Journal of Soil Science*, 2019, 70(3): 644-654.
- [19] Chapman S K, Newman G S. Biodiversity at the plant-soil interface: microbial abundance and community structure respond to litter mixing. *Oecologia*, 2010, 162(3): 763-769.
- [20] Chen C, Chen H Y H, Chen X L, Huang Z Q. Meta-analysis shows positive effects of plant diversity on microbial biomass and respiration. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 1332.
- [21] Wu H L, Xiang W H, Ouyang S, Forrester D I, Zhou B, Chen L X, Ge T D, Lei P F, Chen L, Zeng Y L, Song X Z, Peñuelas J, Peng C H. Linkage between tree species richness and soil microbial diversity improves phosphorus bioavailability. *Functional Ecology*, 2019, 33(8): 1549-1560.
- [22] 吴艺雪. 热带森林凋落叶质量和多样性对土壤动物群落结构及其 N 矿化作用的调控[D]. 西双版纳: 中国科学院西双版纳热带植物园, 2009.
- [23] 陈琴. 树种多样性对土壤酶活性与微生物多样性的影响[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2019.
- [24] Laforest-Lapointe I, Paquette A, Messier C, Kembel S W. Leaf bacterial diversity mediates plant diversity and ecosystem function relationships. *Nature*, 2017, 546(7656): 145-147.
- [25] Cadotte M W, Dinnage R, Tilman D. Phylogenetic diversity promotes ecosystem stability. *Ecology*, 2012, 93(88): S223-S233.
- [26] Wardle D A, Nilsson M C, Zackrisson O, Gallet C. Determinants of litter mixing effects in a Swedish boreal forest. *Soil Biology and Biochemistry*, 2003, 35(6): 827-835.
- [27] Valverde-Barrantes O J, Freschet G T, Roumet C, Blackwood C B. A worldview of root traits: the influence of ancestry, growth form, climate and mycorrhizal association on the functional trait variation of fine-root tissues in seed plants. *New Phytologist*, 2017, 215(4): 1562-1573.
- [28] Fierer N, Lauber C L, Ramirez K S, Zaneveld J, Bradford M A, Knight R. Comparative metagenomic, phylogenetic and physiological analyses of soil microbial communities across nitrogen gradients. *The ISME Journal*, 2012, 6(5): 1007-1017.
- [29] Hiiesalu I, Bahram M, Tedersoo L. Plant species richness and productivity determine the diversity of soil fungal guilds in temperate coniferous forest and bog habitats. *Molecular Ecology*, 2017, 26(18): 4846-4858.
- [30] Ferlian O, Cesarz S, Craven D, Hines J, Barry K E, Bruehlheide H, Buscot F, Haider S, Heklau H, Herrmann S, Kühn P, Pruschitzki U, Schädler M, Wagg C, Weigelt A, Wubet T, Eisenhauer N. Mycorrhiza in tree diversity-ecosystem function relationships: conceptual framework and experimental implementation. *Ecosphere*, 2018, 9(5): e02226.
- [31] Brundrett M C. Mycorrhizal associations and other means of nutrition of vascular plants: understanding the global diversity of host plants by resolving conflicting information and developing reliable means of diagnosis. *Plant and Soil*, 2009, 320(1/2): 37-77.
- [32] Schroeder J W, Martin J T, Angulo D F, Razo I A D, Barbosa J M, Perea R, Sebastián-González E, Dirzo R. Host plant phylogeny and abundance predict root-associated fungal community composition and diversity of mutualists and pathogens. *Journal of Ecology*, 2019, 107(4): 1557-1566.
- [33] Wang Z H, Jiang Y, Deane D C, He F L, Shu W S, Liu Y. Effects of host phylogeny, habitat and spatial proximity on host specificity and diversity of pathogenic and mycorrhizal fungi in a subtropical forest. *New Phytologist*, 2019, 223(1): 462-474.
- [34] Liu M, Li C C, Xu X L, Wanek W, Jiang N, Wang H M, Yang X D. Organic and inorganic nitrogen uptake by 21 dominant tree species in temperate and tropical forests. *Tree Physiology*, 2017, 37(11): 1515-1526.
- [35] Jansa J, Smith F A, Smith S E. Are there benefits of simultaneous root colonization by different arbuscular mycorrhizal fungi?. *New Phytologist*, 2008, 177(3): 779-789.
- [36] Eisenhauer N, Reich P B, Isbell F. Decomposer diversity and identity influence plant diversity effects on ecosystem functioning. *Ecology*, 2012, 93(10): 2227-2240.
- [37] van der Heijden M G A, Martin F M, Selosse M A, Sanders I R. Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future. *New Phytologist*, 2015, 205(4): 1406-1423.
- [38] Liang M X, Liu X B, Etienne R S, Huang F M, Wang Y F, Yu S X. Arbuscular mycorrhizal fungi counteract the Janzen-Connell effect of soil pathogens. *Ecology*, 2015, 96(2): 562-574.
- [39] Hantsch L, Bien S, Radatz S, Braun U, Auge H, Bruehlheide H. Tree diversity and the role of non-host neighbour tree species in reducing fungal pathogen infestation. *Journal of Ecology*, 2014, 102(6): 1673-1687.

- [40] Nguyen D, Castagnyrol B, Bruelheide H, Bussotti F, Guyot V, Jactel H, Jaroszewicz B, Valladares F, Stenlid J, Boberg J. Fungal disease incidence along tree diversity gradients depends on latitude in European forests. *Ecology and Evolution*, 2016, 6(8): 2426-2438.
- [41] Liu X B, Liang M X, Etienne R S, Gilbert G S, Yu S X. Phylogenetic congruence between subtropical trees and their associated fungi. *Ecology and Evolution*, 2016, 6(23): 8412-8422.
- [42] Nguyen N H, Williams L J, Vincent J B, Stefanski A, Cavender-Bares J, Messier C, Paquette A, Gravel D, Reich P B, Kennedy P G. Ectomycorrhizal fungal diversity and saprotrophic fungal diversity are linked to different tree community attributes in a field-based tree experiment. *Molecular Ecology*, 2016, 25(16): 4032-4046.
- [43] Menyailo O V, Hungate B A, Abraham W R, Conrad R. Changing land use reduces soil CH₄ uptake by altering biomass and activity but not composition of high-affinity methanotrophs. *Global Change Biology*, 2008, 14(10): 2405-2419.
- [44] Hisano M, Searle E B, Chen H Y H. Biodiversity as a solution to mitigate climate change impacts on the functioning of forest ecosystems. *Biological Reviews*, 2018, 93(1): 439-456.
- [45] Chen X L, Chen H Y H. Plant diversity loss reduces soil respiration across terrestrial ecosystems. *Global Chang Biology*, 2019, 25(4): 1482-1492.
- [46] Talkner U, Jansen M, Beese F O. Soil phosphorus status and turnover in central-European beech forest ecosystems with differing tree species diversity. *European Journal of Soil Science*, 2009, 60(3): 338-346.
- [47] Santonja M, Rancon A, Fromin N, Baldy V, Hättenschwiler S, Fernandez C, Montès N, Mirleau P. Plant litter diversity increases microbial abundance, fungal diversity, and carbon and nitrogen cycling in a Mediterranean shrubland. *Soil Biology and Biochemistry*, 2017, 111: 124-134.
- [48] Prommer J, Walker T W N, Wanek W, Braun J, Zezula D, Hu Y T, Hofhansl F, Richter A. Increased microbial growth, biomass, and turnover drive soil organic carbon accumulation at higher plant diversity. *Global Chang Biology*, 2020, 26(2): 669-681.
- [49] Liang C, Amelung W, Lehmann J, Kästner M. Quantitative assessment of microbial necromass contribution to soil organic matter. *Global Chang Biology*, 2019, 25(11): 3578-3590.
- [50] Serna-Chavez H M, Fierer N, van Bodegom P M. Global drivers and patterns of microbial abundance in soil. *Global Ecology and Biogeography*, 2013, 22(10): 1162-1172.
- [51] Borken W, Beese F. Methane and nitrous oxide fluxes of soils in pure and mixed stands of European beech and Norway spruce. *European Journal of Soil Science*, 2006, 57(5): 617-625.
- [52] Lang R, Goldberg S, Blagodatsky S, Piepho H P, Harrison R D, Xu J C, Cadisch G. Converting forests into rubber plantations weakened the soil CH₄ sink in tropical uplands. *Land Degradation & Development*, 2019, 30(18): 2311-2322.
- [53] Pendall E, Schwendenmann L, Rahn T, Miller J B, Tans P P, White J W C. Land use and season affect fluxes of CO₂, CH₄, CO, N₂O, H₂ and isotopic source signatures in Panama: evidence from nocturnal boundary layer profiles. *Global Change Biology*, 2010, 16(10): 2721-2736.
- [54] Hassler E, Corre M D, Tjoa A, Damris M, Utami S R, Veldkamp E. Soil fertility controls soil-atmosphere carbon dioxide and methane fluxes in a tropical landscape converted from lowland forest to rubber and oil palm plantations. *Biogeosciences*, 2015, 12(19): 5831-5852.
- [55] Gütlein A, Gerschlauser F, Kikoti I, Kiese R. Impacts of climate and land use on N₂O and CH₄ fluxes from tropical ecosystems in the Mt. Kilimanjaro region, Tanzania. *Global Change Biology*, 2018, 24(3): 1239-1255.
- [56] Krämer I, Hölscher D. Soil water dynamics along a tree diversity gradient in a deciduous forest in Central Germany. *Ecohydrology*, 2010, 3(3): 262-271.
- [57] Sorkau E, Boch S, Boeddinghaus R S, Bonkowski M, Fischer M, Kandeler E, Klaus V H, Kleinebecker T, Marhan S, Müller J, Prati D, Schöning I, Schrumpp M, Weinert J, Oelmann Y. The role of soil chemical properties, land use and plant diversity for microbial phosphorus in forest and grassland soils. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 2018, 181(2): 185-197.
- [58] Reverchon F, Bai S H, Liu X, Blumfield T J. Tree plantation systems influence nitrogen retention and the abundance of nitrogen functional genes in the Solomon Islands. *Frontiers in Microbiology*, 2015, 6: 1439.
- [59] Tchichelle S V, Epron D, Mialoundama F, Koutika L S, Harmand J M, Bouillet J P, Mareschal L. Differences in nitrogen cycling and soil mineralisation between a eucalypt plantation and a mixed eucalypt and *Acacia mangium* plantation on a sandy tropical soil. *Southern Forests: a Journal of Forest Science*, 2017, 79(1): 1-8.
- [60] Voigtlaender M, Brandani C B, Caldeira D R M, Tardy F, Bouillet J P, Gonçalves J L M, Moreira M Z, Leite F P, Brunet D, Paula R R, Laclau J P. Nitrogen cycling in monospecific and mixed-species plantations of *Acacia mangium* and *Eucalyptus* at 4 sites in Brazil. *Forest Ecology and Management*, 2019, 436: 56-67.
- [61] Bodelier P L E, Laanbroek H J. Nitrogen as a regulatory factor of methane oxidation in soils and sediments. *FEMS Microbiology Ecology*, 2004, 47(3): 265-277.
- [62] Yan G Y, Xing Y J, Lü X T, Xu L J, Zhang J H, Dai G H, Luo W, Liu G C, Dong X D, Wang Q G. Effects of artificial nitrogen addition and

- reduction in precipitation on soil CO₂ and CH₄ effluxes and composition of the microbial biomass in a temperate forest. *European Journal of Soil Science*, 2019, 70(6): 1197-1211.
- [63] Laughlin D C. Nitrification is linked to dominant leaf traits rather than functional diversity. *Journal of Ecology*, 2011, 99(5): 1091-1099.
- [64] Bengtson P, Falkengren-Grerup U, Bengtsson G. Spatial distributions of plants and gross N transformation rates in a forest soil. *Journal of Ecology*, 2006, 94(4): 754-764.
- [65] Chang J, Fan X, Sun H Y, Zhang C B, Song C C, Chang S X, Gu B J, Liu Y, Li D, Wang Y, Ge Y. Plant species richness enhances nitrous oxide emissions in microcosms of constructed wetlands. *Ecological Engineering*, 2014, 64: 108-115.
- [66] Isobe K, Koba K, Suwa Y, Ikutani J, Fang Y T, Yoh M, Mo J M, Otsuka S, Senoo K. High abundance of ammonia-oxidizing archaea in acidified subtropical forest soils in southern China after long-term N deposition. *FEMS Microbiology Ecology*, 2012, 80(1): 193-203.
- [67] Laughlin D C, Leppert J J, Moore M M, Sieg C H. A multi-trait test of the leaf-height-seed plant strategy scheme with 133 species from a pine forest flora. *Functional Ecology*, 2010, 24(3): 493-501.
- [68] Soper F M, Sullivan B W, Nasto M K, Osborne B B, Bru D, Balzotti C S, Taylor P G, Asner G P, Townsend A R, Philippot L, Porder S, Cleveland C C. Remotely sensed canopy nitrogen correlates with nitrous oxide emissions in a lowland tropical rainforest. *Ecology*, 2018, 99(9): 2080-2089.
- [69] Laffite A, Florio A, Andrianarisoa K S, des Chatelliers C C, Schloter-Hai B, Ndaw S M, Periot C, Schloter M, Zeller B, Poly F, Roux X L. Biological inhibition of soil nitrification by forest tree species affects *Nitrobacter* populations. *Environmental Microbiology*, 2020, 22(3): 1141-1153.
- [70] Bergkemper F, Schöler A, Engel M, Lang F, Krüger J, Schloter M, Schulz S. Phosphorus depletion in forest soils shapes bacterial communities towards phosphorus recycling systems. *Environmental Microbiology*, 2016, 18(6): 1988-2000.
- [71] de A. Pereira A P, Santana M C, Zagatto M R G, Brandani C B, Wang J T, Verma J P, Singh B K, Cardoso E J B N. Nitrogen-fixing trees in mixed forest systems regulate the ecology of fungal community and phosphorus cycling. *Science of the Total Environment*, 2021, 758: 143711.
- [72] DeLuca T H, Glanville H C, Harris M, Emmett B A, Pingree M R A, de Sosa L L, Cerdá-Moreno C, Jones D L. A novel biologically-based approach to evaluating soil phosphorus availability across complex landscapes. *Soil Biology and Biochemistry*, 2015, 88: 110-119.
- [73] Ezawa T, Saito K. How do arbuscular mycorrhizal fungi handle phosphate? New insight into fine-tuning of phosphate metabolism. *New Phytologist*, 2018, 220(4): 1116-1121.
- [74] Goswami D, Thakker J N, Dhandhukia P C, Moral M T. Portraying mechanics of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): a review. *Cogent Food & Agriculture*, 2016, 2(1): 1127500.
- [75] Hacker N, Ebeling A, Gessler A, Gleixner G, Macé O G, de Kroon H, Lange M, Mommer L, Eisenhauer N, Ravenek J, Scheu S, Weigelt A, Wagg C, Wilcke W, Oelmann Y. Plant diversity shapes microbe-rhizosphere effects on P mobilisation from organic matter in soil. *Ecology Letters*, 2015, 18(12): 1356-1365.
- [76] Achat D L, Morel C, Bakker M R, Augusto L, Pellerin S, Gallet-Budynek A, Gonzalez M. Assessing turnover of microbial biomass phosphorus: combination of an isotopic dilution method with a mass balance model. *Soil Biology and Biochemistry*, 2010, 42(12): 2231-2240.
- [77] Wang C Q, Xue L, Jiao R Z. Soil phosphorus fractions, phosphatase activity, and the abundance of *phoC* and *phoD* genes vary with planting density in subtropical Chinese fir plantations. *Soil and Tillage Research*, 2021, 209: 104946.
- [78] Shi X Z, Wang J Q, Lucas-Borja M E, Wang Z Y, Li X, Huang Z Q. Microbial diversity regulates ecosystem multifunctionality during natural secondary succession. *Journal of Applied Ecology*, 2021, 58(12): 2833-2842.
- [79] Fichtner A, Schnabel F, Bruelheide H, Kunz M, Mausolf K, Schuldt A, Härdtle W, von Oheimb G. Neighbourhood diversity mitigates drought impacts on tree growth. *Journal of Ecology*, 2020, 108(3): 865-875.